

CAROLI  
CLVSII  
ATREBATIS

*Rariorum aliquot Stirpium,*  
per Pannoniam, Austriam, & vicinas  
quasdam Prouincias obseruatarum

*Historia,*

QUATVOR LIBRIS

*Sib. Sec. Coll.* expressa: *Com. Soc. Jesu*

AD

RVDOLPHVM II. IMP.  
ERNESTVM,  
MATTHIAM,  
MAXIMILIANVM,  
AVSTRIÆ ARCHIDVCEs, &c.



ANTVERPIÆ,  
Ex officina Christophori Plantini,

M. D. LXXXIII.

CAROL  
CLVSI

ATREBATES

For the purpose of the  
General Assembly of the  
Province of Carolina

1734

OF THE

LIBRARY

OF THE

LIBRARY

OF THE

LIBRARY

OF THE



OF THE  
LIBRARY  
OF THE  
LIBRARY



IMP. CÆS. RVDOLPHO. II.  
AVGVSTO, GERMANICO,  
PANNONICO, BOHEMICO,

SERENISS. PRINCIPIBVS

ERNESTO,

MATTHIÆ,

MAXIMILIANO,

D. MAXIMILIANI. II. F. F. F. F.

D. FERDINANDI. I. N. N. N. N.

ARCHIDVCIBVS AVSTRIÆ,

DVCIBVS BVRGYNDIÆ,

COMITIBVS TIROLIS, &c.

HANC SVAM RARIORVM STIRPIVM,

PER PANNONIAM, AVSTRIAM, ET

VICINAS QVASDAM PROVINCIAS

OBSERVATARVM, HISTORIAM

CAROLVS CLVSIVS ATREBAS

DED. CONSECRATO.

CAROLVS CLVSIVS  
OMNIBVS REI HERBA-  
RIÆ STUDIO SIS.



Nunc tandem, quàm in Hispani-  
carum stirpium historia vobis ob-  
strinxeram fidē, libero, serius haud  
dubiè quàm multi exoptassent, &  
quàm ipse constitueram. Sed mul-  
ta subinde præter spem incidunt,  
quibus nostra consilia perturbari, atque iis moram  
iniici contingit. Sic mihi variis & longis peregrina-  
tionibus ab anno M. D. LXXIX. occupato, Pan-  
onicarum stirpium, quas anno septuagesimo quar-  
to supra millesimū observare incepi, historiam ha-  
ctenus absolvere non licuit: vt taceam aduersas &  
pluuias tempestates, quæ saepenumero in eos cona-  
tus interturbarunt, & ad Alpium aliorumque præ-  
celforum montium radices progressum, à summo-  
rum iugorum (in quibus perquirendæ erant, quas  
observare animus erat, plantæ) consensu repule-  
runt. Qua ad eò de causa totam superiorem astatem  
in perlustrandis aliquot montiū summis iugis (quan-  
tum per serenam aëris temperiem licuisset) impen-  
dere decreueram, vt meam historiam absolutiorem  
vobis traderem: sed ab amicis admonitus, istam  
diutinam moram plerosq. iniquius ferre, eam qua-  
lis qualis est in publicum proferre malui, quàm vos  
vestra expectatione diutius frustrari.

MAXIMA verò earū quas hac Historia com-  
plexus sum partem, à nemine (cuius quidem lue-  
brationes

brationes legerim) haëtenus esse obseruatam certus sum: ingenuè vicissim profiteor, nonnullas me inspersisse, quæ ab aliis obseruatæ quidem fuerint, sed quarum vel descriptio mutila sit, vel natales non respondeant, vel in quibus necessariæ quædam notæ sint prætermissæ.

QVONIAM porro in istis meis peregrinationibus nonnullas obseruaui, quarundam etiam icones & descriptiones ab amicis accepi, quæ nostro argumento deserviebant, eas in suas classes inferre, & commodis locis inferere libuit, vt tanto absolutior fieret nostra historia.

INSUPER multarum aliarum, quarum historia ab aliis iam pridem est prodita, obiter mentionem facio, quòd vicinis his prouinciis eas nascentesprehenderim, licet pleræque aliæ regiones iis etiam abundant.

EARVM præterea stirpium, quarum historia in Appendice ad Hispanicas obseruationes fuit tractata, descriptiones retexui, auctiores feci, atque passim quibus oportebat locis insertas, in secundum librum retuli, quoniam pleræque quæ ad illarum historiam pertinebant, interea temporis exactius me obseruare contigit.

CETERVM meum hunc laborem, tamen si vestræ forsitan expectationi non respondentem, boni consulturos, & candidè, sicubi lapsus sum, interpretaturos confido. Quod si feceritis, reliquâ quam mihi Deus opt. max. concedet vitam, ad vestra studia, pro meo modulo promouenda, impendendam esse scitote. Valete, Viennæ Austriæ Cal. Decembris, anno reparatæ Salutis humanæ CIO IO LXXXII.

# I V S T I L I P S I

de hoc libro Eulogium.

**Q**uæ solus veterem nouamque Floram,  
Et solus veterem nouamque Hygëiam  
Pernouisti, & ad intimos recessus  
Naturæ penetraſti, amice CLVS I:  
Qui quod noſter habet quod alter Orbis,  
Solus mente capis, ſtilo recludis:  
Quam nos Pannonici tui labores  
Iuuant! Pannonicas quibus per oras  
Herbarum agmina mille, mille florum  
Sedulus legis; & legenda nobis,  
Nec legenda modo, ſed & videnda,  
Iſtoc porrigis in breui libello,  
Daſto, Iupiter, & bono libello!  
Quem qui non amat æſtimatque Lector:  
Non amat veterem nouamque Floram,  
Non amat veterem nouamque Hygëiam.

Ad Cluſij nomen luſus.

**O**mnia Naturæ diuinæ Cluſi, arcana recludis:  
CLVSIVS haud ultra ſis ſed APERTA mihi.

\* Quo no-  
mine Apol-  
lo priſcis di-  
ctus, ab ape-  
ciendo.

IN CAROLI CLVSII  
OBSERVATIONES  
PLANTARVM.

**T**VRBA frequens hominum longinqua per  
æquora currunt,  
Rarus at inde redit doctior & melior:  
Turaros inter numerandus es, optime Clusi,  
Testatum præsens quod liber iste facit.  
Namque peregrinis longo quæ tempore in oris  
Indagare tibi cura laborq; fuit,  
Haud legere hîc tantû calamo descripta fideli,  
Verûm etiam ad viuum picta videre licet.  
Iamq; innotescunt totum diffusa per orbem,  
Vix norant ipsi quæ prius indigenæ.

Ioan. Posthius Germersh.  
Medicus & P. L.

IN OBSERVATIONES  
PANNONICAS C. V.  
CAROLI CLVSII  
ATREBATIS.

**P**OSTquam Pannonias intrasset Clusius oras  
Auspiciis, CÆSAR MAXIMILIANE, tuis:  
Lustravit montes celsos, vallésque profundas,  
Munera nativi ut disceret alma soli:

Cuius

*Cuius in aduentu fama est saltasse Napeas,  
Et qua praterea Numina terra colit.  
Præ reliquis vario redimita hunc tēpora flore  
Talibus affata est florida Flora virum:  
Salve Paonia decus immortale coronæ,  
Inuia virtutis quem via nulla latet.  
Te sine Naturæ miracula clausa manerent,  
Te sine Telluris pignora tecta forent.  
Non tibi sat fuerat Gades peragrasse remotas?  
Quin animus terras addere Pannonias?  
Accipe nunc igitur meritū Virtutis honorem,  
Accipe de nostra,serta parata, manu:  
His tu clarus eris venturo tempore Clusi,  
Extinguentq; tuum sæcula nulla decus.*

Achilles Cromerus Nissen: Silcſius.

# CAROLI CLVSII RARIORVM STIRPIVM

PER PANNONIAS

obseruatorum Historiæ

LIBER PRIMVS.



VEMADMODVM Priore Hispa-  
nicarum mearum obseruationum li-  
bro, arbores & frutices cõplexus sum:  
eundem etiam ordinem in his Panno-  
nicis obseruationibus sequi animus est,  
& ab exotica rarissimaque arbore, si-  
militer illas aspicari.

DE LAVROCERASO.

CAP. I.

A Nemine, quod sciam, huius arboris historia pro-  
dita est: imò ne Herbariis quidem nostra ætatis, ut ar-  
bitror, cognita. Cùm autem ex earum sit genere, quæ  
perpetua coma virent, elegantissimæque sit aspectu, me-  
rito primum locum in nostris hisce Commentariis sibi  
vindicare videtur.

EST verò *Laurocerasus* (sic enim appellare libet, Laurocerasi  
historia.) iuxta ma-  
gnitudinis arbor, caudice recto, multis ramis donato,  
qui cortice ex viridi nigricante obducti sunt, nouelli ta-  
men omnino virent. Folia alternatim ramos ambiunt,  
non decidua, Lauri latifolia, siue potius mali *Citræ* fo-  
liorum emula, per ambitum nonnihil dentata, nervis

A

aliquot







aliquot ex media costa in latera excurrentibus, supernè splendens, infernè nequaquam: color in vetustis ex atro virescens, in novellis verò ex viridi pallefcens: sapor amarus, nucleorum mali Persica, aut amygdalarum amararum amulus. Flos nunquam mihi conspectus est, neque etiam ipse fructus ex arbore recens decerptus: sed qui Constantinopoli missus fuit sub initium anni 1574. & anno deinde 1581. forma ovali fuit, exigui pruni magnitudine, Sebesten fructui proximus, foris niger, rugosus, pulpam continens dulcem & edulem ceratiorum pulpa modo, in qua latent bina aut terna semina plana spadicei coloris, plurimum accedentia ad Loti africana vulgo Guaiacana nuncupata semina: ut testes esse possent amici, quibus hoc anno misi in Belgium, atque etiam ante septennium, cum Galatensibus siue Peranis pruneolis, albis, oblongiusculis, acidis.

Porro biennio post, sub initium Januarij 1576. ab Ill<sup>ri</sup> Domino Davide Ungnad, Cesareo apud Turcarum Imperatorè Oratore, eius arbusculam accepi humanam altitudinem excedentem, brachiali crassitudine, cum aliquot aliis rarioribus fruticibus. Verùm cum asperissima esset hiems, & negligenter ab eo qui eos aduexit, curati fuissent: omnes in itinere radicitus perierunt, præter hanc & Castaneam equinam, de qua proximo capite: imò parum absuit, quin & hæc perires. In spinicem autem cum eodem doliolo in quo aduecta fuerat, eademque terra, intuli: unde cum Aprili exemissem, eiusque ramos omnino siccos deprehendissem, illos ad vinum refeci, & vasculum loco umbroso reposui, ne à solis radiis nimium exsiccaretur, atque facilius repullularet. Cæpit tandem Autumno secundum radicem aliquot germina proferre, quæ cum ea trunci parte cui inhærebant, (resecta inutili & sicca parte) in aliud

vas transtuli, diligentérque deinde alui, ut nunc elegantem habeam arbusculam: reliqua etiam germina, ubi paulo altius excreuissent, in terram inflexa radices egerunt, aliásque arbusculas mihi dederunt, quas & Principibus viris & amicis communicavi.

Longior paulo in his recitandis, & fortè Lectori molestus fui: non potui tamen ea silentio praterire, ut intelligent studiosi, quibus difficultatibus ad huius rarissimæ stirpis possessionem peruenerim.

Trabison cur-  
mali Dacty-  
lus Trape-  
zuntin.

CÆTERVM missa fuit hæc arbuscula Trabison curmali nomine, quod Trapezuntinum dactylum interpretati sunt. Sed quandoquidem nihil cum Palma commune habeat: non admodum propriè hoc nomen illi inditum fuisse arbitror.

Bellonius lib. 1. Observationum cap. 44. inter arbores perpetuò virentes recenset Trapezuntinam quandam ferentem cerasa: meminit & eo libello, cui de Ratione cicurandi siluestres arbores titulum fecit, cap. 20. & Laurocerasum appellat: illius tamen historiam minimè describit, nisi quod eodem capite illius ramum, mali Citria ramo aequalem facit, & eius prægrandem arborẽ Genue in horto Principis d'Orià se postea vidisse asserit. Cùm verò huius nostra folia maximam similitudinem cum mali Citria foliis habeant, neque illi defluant, & Trapezunte Constantinopolim, ut nomen indicat, primum allatam fuisse verisimile sit, eam esse omnino existimo, quam Bellonius observauit.

Laurocerasus.

Laurocerasi autem nomen, quantum coniectura assequi possum, illi imposuit à foliorum cum laurinis similitudine, & fructu cerasis aequali: tametsi postremo loco ex Pliniana historia id inuenisse affirmet. Verùm nusquam apud Plinium Laurocerasi vocem legere memini: is quidem lib. 15. cap. 25. ubi Cerasi genera enumerat,

merat, de cerasis lauro insitis agit. Minus quinquen-  
nium est, inquit, quod prodire qua vocant laurea, non  
ingrata amaritudinis, insita in lauro. Hanc autem quam  
proponimus arborem, ipsum intelligere, vix mihi per-  
suadere queo.

Sed cum aptiore appellatione careamus: neque sine  
iudicio Bellonius ea usus esse videatur, *Laurocerasum*  
cum ipso nuncupabimus, donec ex Veterum monumētis  
commodius aliquod inveniamus. Si cui tamen *Palma*  
*trapezuntina* vocabulum, quod Constantinopoli adepta  
est, aut *Cerasi trapezuntina*, ut Bellonius etiam galli-  
cè usurpat, magis arridet, co'utatur, per me licet.

Cerasus lau-  
rea.

Cerasus trape-  
zuntina.

## DE CASTANEA EQVINA.

## CAP. II.

*EQVINAM* Castaneam Cl. V. Matthiolus com-  
mentarius in 1. lib. Dioscoridis descripsit: quoniam ta-  
men nondum apud nostros homines, aut certe rarissime  
conspēcta est, & cum superiore mihi egregie adoleuit, il-  
lius etiam historiam proximè illam adicere libuit.

*FRIGORIS* patientissima est hac arbor, umbrā  
& aqua, ut Platanus, delectari videtur. Autumno quā-  
tem, cum folia amisit, protinus amentaceam quiddam  
extremis ramulis gerit, et turgidā, quasi parturiat, pin-  
gui ac lento humore cōspersum, in quo culices & huius-  
modi insecta harent, totaque hieme ita perdurat, donec  
ineunte vere, & prematurè admodum, gemma in fo-  
lia sese explicent, qua palmata sunt, & plerunq. septe-  
na numero, uni eidemque pediculo inhaerentia, tenella  
initio & dilutiorē virore prädita, deinde venosa, rugo-  
sa, longa, ab infima parte sensim in latum excrescentia,  
& per oras crenata, mucronata cuspidē, superne viren-  
tia, inferne candicantia, amariuscule sapore: pediculi

Castanea-  
quinque histo-  
ria.



quibus inhaerent oblongi, bini semper aequali situ, opposi-  
to tamen, alternatim ramos amplectuntur: nouelli ra-  
mi virent, adulti cinereo cortice obducti sunt, sub quo  
latet alius succulentus, viridis, lignum ambiens, ut in  
Sambuco, vel Acere latifolio, cui huius arboris (quan-  
tum quidem ex ea quam unicam alo deprehēderelicet)  
materies persimilis est. Eius flos aut recens fructus non-  
dum mihi conspecti sunt: at qui Constantinopoli anno  
1581. hoc nomine allatus est, vulgari castanea aequalis  
fuit, non in mucronem desinens ut illa, sed planior, &  
orbiculari aliqui forma, tuberculo quodam superiore  
parte eminente, quod sensim gracilescens, ad pronam  
vsque partem extenditur, germen (quod istic originem  
ducit) amplectens: coriaceo cortice integitur uti vulga-  
ris, qui supernè spadicei coloris etiam est, sed infima;  
qua suo echinato calyci adheret, ex albidus, similem pro-  
pemodum notam impressam habet, qualis in vesicaria  
repentis seu peregrina semine conspicitur, sed longè ma-  
iorem, nec ita candidam: singularis est hic cortex, nec  
aliam tunicam aut lanuginem intra se occulit, quem-  
admodum nostrates castanea: firma & solida constat  
carne, candida ut vulgares, at non adeo grati saporis,  
sed amaricantis potius, praesertim si vetustior & sicca  
sit, qualem ego degustavi.

VETERIBVS ignotam fuisse hanc arborem cēscō,  
quādoquidem nullius earum quae ab illis descriptae sunt,  
historiam legere memini, quae huic arbori convenire de-  
prehendatur.

Turcae at cestanesi, vel ad castanesi, id est equina  
castanea nomine insigniunt, quoniam eius fructum deno-  
ratum, anhelosis & tussientibus equis plurimum auxiliij  
adferre comperiant.

At cestanesi.  
Ad castanesi.

## DE PLATANO, ACERE, ET SORBI GENERIBVS, CAP. III.

Platanus:

TAMETSI Platanus in his regionibus sponte non nascatur: quoniam tamen eam cum duabus superioribus Constantinopoli accepimus, mihiq̃ue & aliis quibusdam egregiè prouenit, illius mentionem hic obiter facere libuit, cuius historiam apud alios videre licet.

Acer.

SIMILITER & Aceris, quod foliorum similitudine proximè ad eam accedit: cuius in Viennensi saltu, & aliis vicinis siluis duo obseruantur illa genera. à plerisque iam descripta.

Latifolium.

Latifolium oblongiore florum vua, candidiore & latiore materie, quod ab imperitis Platani nomine donatum est: id Gallis Plane dicitur, Vngaris Iauor fa.

minus.

Alterum minore folio, firmiore materia, crassiore cortice, ab imperitis in Gallia Sycomorus nuncupatum: id Gallis Erable, Vngaris Ihar fa appellatur.

Torminalis  
Sorb.

SORBUS item torminalis cognominata Viennensi saltui, & plerisque aliis Austria & Pannonia siluis familiaris est, cuius fructus Octobri Viennam venalis in forum adfertur, à tenuioris fortuna hominibus, & pueris admodum expetitus: Vngari Barkocza fa vocant, Germani Adlasber.

Ariacogno,  
minata.

FREQVENS est & iisdem locis, præsertim verò inter saxa & rupes, id Sorbi genus quod nonnulli Ariam Theophrasti esse censent, folio corili aut alni fere, sed prona parte omnino incano, fructum ferens torminali proximum, sed colore differentem, qui ruber est, minimè edulem, & à nullo animantium quàm ab anibus expetitur.

Aucuparia  
sorb.

AUCUPARIA etiam cognominata Sorbus, à baccharum usu, quòd iis hieme Aucupes turdis & merulis insidiari



insidiari soleant, foliis fraxini: Ungaris vörös berkinnye, Germanis Vogelber dicitur.

At legitima Sorbus foliis superiori proxima, mollioribus tamen & nonnihil pubescentibus, satis etiam vulgaris est, fructumque fert plerisque expetitur, praesertim verò mulierculis & pueris: ea Ungaris Berkinnye fa dicitur, Austriacis Äschritzn.

Legitima Sorbus.

## DE ROBORE ET QUERCV.

## CAP. IIII.

VARIA alunt Pannonia & Austria Roboris & Quercus genera, quorum cum pleraque aliis provinciis communia, iam descripta habeamus, minime opera precium est eius historias hic retexere.

Dvo verò hic Roboris genera inueniuntur, in montanis & saxis satis frequentia.

Unum Quercus fere magnitudine crescens, sed strigosius, ligno duriore, folio minus amplo, & altera parte nonnihil incano, exiguam glandem & magnam gallam ferens, minus tamè frequentè quàm Hispanicum robur, mihi in Hispanicis observationib. descriptum, cui aliqui proxime respödet: id à duritie Austriaci & Styriae incole Stainaichel appellant, Ungari Kemëni cher fa.

Robur latifolium.

Alterum humile est, nec humanam altitudinem excedit, fruticis potiùs, quàm arboris nomine donadum: tenuibus & lentis ramis, foliis alteri fere similibus, sed minoribus, nec adeò sinuosis, minorum gallarum, quae plerumque binae, terna aut plures simul nascuntur, admodum ferax: eius nullum vulgare nomen intellexi.

Robur humile.

QUERCVS porro genus non modò in Viennensi saltu, sed etiam in plerisque Pannonia siluis frequens est, eadem altitudine qua vulgaris quercus, atq. etià celsiore assurgens, candice erectiore, corticèque crassiore

Certissima historia.

& magis scabro: folia frequentioribus incisuris sed minus altis diuisa habet quam quercus, & longioribus tenuioribusque pediculis inherencia: ramulos breuiore, frequentioribus nodis obsitos, gemmas minores, & aliquot gracilibus foliolis ceu staminibus aut villis septas: calyces breui crassoque pediculo annorinis ramulis adnatos, non in foliorum alis, omnino hispides & molliter echinatos, in quibus glans est querna paulo breuior, & obtusiore mucrone praedita, quae autumnino maturitatem consequitur: adherent interdum inter folia, multis veluti squammis constantia capita.

Rustici & materia caesores optimè eam à quercu vulgari distinguere norunt, illius materiem candidiorem, laxioremque, & ad opera minus aptam censentes.

PLINIVS Naturalis historiae lib. 16. cap. 5. Cerrum vocat, Theophrasto Plantarum historiae lib. 3. cap. 9. ἀργύρεον dicitur: Germanis Cerraichel/ Ungaris verò chér fa.

Cerrus  
ἀργύρεον.

Lithoxyla.

HIVIS Cerri crassiorum atque etiam tenuiorum ramorum libralia interdum aut maiora fragmenta in lapides commutata, ipsaque adeò matrice in nigrum sili- licem conuersa (superficie tamen candida & friabili remanente) atque naturales ipsius ligni venas, orbes, reliquàmque formam etiamnum retinentia, non modò eruta conspexi, & Ill. Herois Dn. Balthasaris de Balthyan (cuius in hac historia mentio saepe fiet) munere habui: sed ipse etiam legi in montis Eysenberg vulgo nuncupati & Pinka flumio Pannoniae imminentis acclini, qua ad vallem Pinka thalab eiusdem fluij eam perluentis nomine nuncupatam, descensus est, atque ad Austrum & λογοτόπος spectat.

Mons ferreus.

Obsitus olim is mons fuit (quemadmodum adhuc vicini) Quercus & Cerri arborum siluis: nunc verò vici-  
netis





netis generosissimi vini feracibus, quibus variis locis in-  
 spersa sunt diuersi generis praestantissimorum maximo-  
 rumque persicorum malorum arbores. Est autem hic  
 mons cum vicinis aliquot pagis iam memorati Jll. Dn.  
 de Batthian.

Latifolia  
 quercus exo-  
 tica.

AT in eodem Viennensi saltu, Latifolia amplissimas  
 arbores inueni anno 1578. cuius omnes glandes è longis  
 pediculis dependentes, maxima ex parte non modo ob-  
 sita, sed quasi inclusa erant viridi quadam excrescen-  
 tia multis inaequalibus angulis praedita & scabra, quae  
 resiccata, gallarum modo dura & firma erat, quarum  
 etiam vicem explere potuisset. An id vitium illi pecu-  
 liare sit, & singulis annis recurrat, me latet, qui semel  
 dumtaxat per eam saltus partem iter fecerim.

Viscum quer-  
 cinum.

CETERVM latifolia Quercus per multas Pan-  
 nonia siluas, visci feracissima est: id Vngari fay gyöngy  
 vocant; ipsam verò arborem, Töly fa, flicem esse exi-  
 stimantes.

## DE ILICE.

### CAP. V.

NON incommode forsitan hoc loco meminisse licebit  
 duarum flicis maioris arborum, quas anno 1581. Lon-  
 dini Trenobantum in Anglia nō sine admiratione vidi.

Ilex maior.

PRIOR longè amplissima & celsissima, latissimaq;  
 I. in orbem diffusa coma, qua vix maiorem in Hispaniis  
 cōspexi, alitur in suburbano quodam horto ad dextram  
 Tamesis fluij ripam, supra pontem qui utramque vr-  
 bem coniungit, multis & frequentibus praedita ramis,  
 admodum fragilibus, in quibus confuso ordine & sparsim  
 nascuntur folia Hispanica foliis similia, supina parte  
 viridia, prona verò incana, densa siue crassa, in ambitu  
 serrata & aculeata dum annotina & recentia sunt, at  
 vetusta



vetusta sine spinis, paulòq. rotundiora & minora: multos in extremis ramulis fert florum iulos, uti Hispanica, qui in flosculos flavos & muscosos explicantur, polline & tenui pulvere perfusos: glandes non ex floribus oriuntur (nam sunt inutiles) verum ex aliis quibusdam separatis pediculis, quæ an maturitatem consequantur me fugit, ego duntaxat. primum emergentes conspexi sub finem mensis Maij, quo tempore plurimis floribus abundabat.

- II. ALTERA etiam vastæ magnitudinis, in arcis regie ad Westmonasterium horto nata est, magnitudine tamen cum superiore non cõferenda, licet adco crasso sit caudice, ut nemo amplecti queat. Hæc à superiore nonnihil differre mihi visa est foliis, quæ minora & magis orbiculata habet, buxeis interdum non ampliora, neque ullis aculeis horrentia, alioqui subtus incana, & superne eodem modo virentia, & inæqualiter in ramis confusoque ordine nascentia: nullos in ista flores observant, & an fructum ferat, nemo indicare potuit.

Prioris ramum suis floribus onustum, quoniam in Hispanicis observationibus Ilicem cum fructu solummodo exhibui, in studiosorum gratiam hic adiecimus.

DE PINASTRO ALPINO PYMILIONE, ET  
ALIIS CONIFERIS. CAP. VI.

Pinastrel py-  
milionis hi-  
storia.

HUMANAM non superat altitudinem hic Pinaster: sed statim à radice in lentos & obsequentes, tamen si crassos, atque rugoso & denso cortice tectos ramos dividitur, inque latitudinem diffunditur, quos per singulas squammas bina semper ex eodem tubulo simul produntia & iuncta folia ambiunt, quemadmodum in Pino & vulgari Pinastro, magis tamen carnosæ sunt, crassiora, breviora, & obtusiore mucrone prædita, coloreq. saturatius



ratius virente: strobili unciales squammatim compacti lariceos conos magnitudine non superant, sed magis turbinati sunt, rectique, non deorsum pediculo inflexo, ut in vulgari, nucleus alatus, vulgaris modo, & inter compactiles squammas latens: radix crassa, lignosa, in diuersa tendens.

Crescit in summorum Austria & Styria alpium superciliis inter saxa & rupes plerumque, ubi nulla alia arbores nascuntur.

Pinaster

Pin<sup>o</sup> siluestris

πείνη ἀγρία.

prior.

alter.

PINASTRI porro vulgaris (ita enim Pinum siluestrem appello, Plinium sequutus, qui, quæ Theoph. Plantar. histor. lib. 3. cap. 10. de πείνη ἀγρία scribit, ad Pinum siluestrem transtulit) duo hic observantur genera, adeo sanè inter se similia, ut pauci, nisi materia cafores, discernere queant: alterum latiore & erectiore arbore, lenioreque cortice Weisse ferent/ alterum contorta & tristiore arbore, magisq. scabro cortice Schwartz e ferent nuncupantes.


Tenuia & oblonga habet utrumque genus folia, pungentia, bina semper coniunctim ex eodem tubulo prodeuntia, & circa ramos in orbem quasi nascètia. Maio mense in extremis ramis quasi botros siue uas quasdam fert tenuibus squammis obsitas, qui sponte aperientibus se squammis iulos ostendunt virentes aut pallescentes, plenos tenui polline luteo siue farina quæ levis aura afflatu dispergitur. Ex mediis deinde botris noua germina prodeunt suis nouellis foliis tenui quodam & membraneo pericarpio inclusis onusta eodem mense, quæ extrema sui parte, antequam folia succrescant & explicentur, fructus rudimentum dant, grandiore iam firmiterque ad germinum basim inhirente superioris autumnus immaturo fructu, & viridi, sursum spectante & reflexo. Utrumq. hoc genus Vngari vad fenyö appellat.

SED



B

PINASTER





SED tertium quoddam genus ad nonnullorum Au-  
stria motium radices in scopulis, & supra thermas Ba-  
denses in motium crepidine tenui gramine obsita crescit  
admodum contorto caudice, diuaticatis ramis, quorum  
ramuli multo tenuiores lentioresque sunt quam in supe-  
rioribus duobus generibus: folia habet illis multo breuiora  
& tenuiora, tametsi bina semper coniunctim ex eodem  
tubulo in ramorum circuitu nascētia: extremis ramu-  
lis botrus siue vna exiguorum iulorum veluti nucamento  
tenuiorum squamarum inclusa adnascitur, qui non  
virescunt aut flauent, ut in superioribus, sed purpuras-  
cunt, deinde in tenuissimum puluerem abeunt, succres-  
cente ex eorum medio nouo germine, suis nouellis foliis  
membrana vel vesicula inclusis onusto: huius conus alitis  
minor est.

Quæ verò pītus, quam Gaza piceam vertit, apud Theophrastum sit, difficulter iudicari posse existimo: quandoquidem eius materiam operibus ineptam esse, & magnitudine pino minorem minusque erectam assurgere scribat.

At quæ Plinio picea dicitur, quæque etiam id nomen apud huius ætatis rei herbarie scriptores retinet, mea opinione nihil aliud est, quam Theophrasti loco ἡ δὲ τοῦ λατὶ ἀρπύρις, id est, abies mascula, arbor procera, & in meta modum crescens, foliis breuibus & pungentibus, undiquaque ramos singulatim cingentibus, qui cruciformiter & decussatim in arbore nascuntur, quam ob causam Vngari keröz:ös fenyő, hoc est cruciatam abietem nuncupant: Germani feuchteit appellant. Fert verò ea Maio mense in extremis ramis singulares iulos palleſcente farina plenos, deinde strobilos siue conos molli-  
bus squammis imbricatim compositis constantes, purpu-  
rascentes dum nouelli sunt & primum nati, deinde pau-  
latim



latum in longitudinem excrecentes, quæ in maturis interdum septem aut octo unciarum est, sub quibus exiguum alarum semen superioris simile fouetur.


Illius autem genus reperitur, quod pumilum manet, Picea pumila. fertq; quadam nucamenta, nucis pontica sine auellana magnitudine, è squammulis imbricatis compositis, sed in pungens foliolum desinētib; cōpacta, quæ maturitate dehiscētia, cocanas inanitates & veluti cellulas ostendūt: à summis & extremis nucamentis ramuli nonnunquā enascuntur, frequētib; breuib; & pungētib; foliis obsitis: sed & tota arbuscula breuiorib; & pallidiorib; foliis quàm vulgaris pradita est. In hac neq. florem, neque fructum obseruauit: & haud scio an ferat.

ABIES autem Pliny, Abies. ἰλιάκη θάμνα. exatn θάμνα, hoc est, abies femina Theophrasti est, arbor celsissima & formosissima, cortice laui, & candidiore quàm in picea, ramis etiam decussatim crescentibus, & in latera velut alæ expansis, quos ambiunt folia plana in iunioribus & bifido mucrone conspiciua, supernè viridia, infernè cinerea, & utrimq; veluti pectinatim disposita, quæ deinde in vetustis arboribus, istum ordinem (nisi in tenellis ramis) non seruant, & rigidiora magisque obruso mucrone redduntur. Adultæ arbores circa maiorum ramorum extremos quasi ramulos prona parte in singulorum foliorum alis exigua quædam nucamēta interdum ferunt, è quibus singulares breuēsque iuli emergunt, qui deinde in flosculos explicantur: perdurantq; nonnunquam in alterum annum ea nucamenta. Tenuiores ramos solent Viennenses, quando venale vinum habent, ante suas edes suspensos proponere, quoniam illis hedera vicem præbent. Germani Thannen nominant; Ungari fenyő fá buk aleueley ég felöl.

SED celsissima etiam est Larix, quam à Theophrasto Larix.

B 3

nequa-





nequaquam describi puto: nam quæ larix Gazæ dicitur, nihil aliud quam pītus est, quam prioribus libris perpetuo piceam interpretatus est, interdū autē eodem pītus vocabulo & piceam & laricem simul expressit.

CETERVM Plinius de Larice agens, omnia illi  
adscribit quae Theophrastus τρυγαν tribuit, ut ex multis  
locis inter se collatis videre licet, quorum aliquot in me-  
dium proferemus.

Theophrastus Plantar. histor. lib. 3. cap. 4. ἰδία δὲ τοιαῖα τῶν ὀρεινῶν, ἃ ἐν τοῖς πεδίοις ἐφύεται. περίτε μακα-  
ρονίαν, ἐλάτην, πεύκην, πίτυν ἀγρίαν, εἰλυρά &c. Plinius  
Histor. naturalis lib. 16. cap. 18. Montes amant ce-  
drus, larix, teda. Rursus eodem cap. Theophr. αἰετὺλ-  
λα μὲν οὖν ἐστὶ τῶν ἀγρίων, ἃ ὑπὸ τερφον ἐλέχθη, πεύκη, πί-  
τυς ἀγρία, πύξος, ἀνδράχην. Plin. eiusdem libri cap. 21.  
Siluestrium generis folia non decidunt abieti, larici, pi-  
nastro, innipero, cedro, terebintho, buxo &c. Theoph.  
prater ea eiusdem lib. cap. 10. διαφορὰν δὲ ἔχει μεγάλην  
πρὸς τὴν πεύκην. πεύκην μὲν γὰρ ἐπικαυθεῖσιν τῶν ῥιζῶν ἐκ  
ἀναβλασάνην. τὴν πίτυν δὲ φασὶ τινες ἀναβλασάνειν ὡς περ  
καὶ ἐκ λέσων ἐκτραπέντος τοῦ πυρραίου ὄρους τῇ πίτυσίδους.  
Plin. eiusd. lib. cap. 10. Larix iustis radicibus non  
repullulat, picca repullulat, ut in Lesbo accidit, incen-  
so nemore Pyrrhaeo.

Hinc factum esse arbitror, ut perpetuam Larici comam tribuat, cum tamen ipsa experientia aliud nos doceat; etenim folia quæ vicena, & plura nonnunquam simul ab eodem exortu è turbiculis ramos confuso ordine ambientibus nascuntur penicilli modo, tenuia, mollia, viridia, iis fere similia quæ Corridam tertiam in Hispanicis observationibus habere dixi, perennia non sunt, sed ineunte hieme decidunt, & novo vere alia ex eisdem tuberculis renascuntur: rami longi sunt & graciles, deorsum

Larix Plinij  
est ~~arbor~~  
Theoph.

L'arici folla  
hieme deci-  
dunt.

deorsum propendentes, in quibus unciales coni è molli-  
bus squammis imbricatim sibi inuicem incumbentibus  
compositi, dum nouelli & recentes sunt, ex rubro pul-  
cherrimè purpurascences, ex isdem tuberculis, è qui-  
bus folia nascuntur, breui & crasso firmoque pediculo  
& sursum reflexo nitentes, ut mucrone calum spectent,  
qui paucula alata semina continent. Germanis hac  
Aerpaum; Vngaris vörös fenyő kibol terebintina  
lezőn. Illud autem animaduertendum Vngaros omni-  
bus arboribus coniferis iam memoratis fenyő nomen,  
quod propriè apud eos funiperum significat, adscribe-  
re, quoniam folium spina simile, & quasi iuniperinum  
habeant.

OMNES porro hæc arbores maxima copia crescunt  
cum in Viennensi saltu, tum aliis montibus, Alpibus vi-  
cinis, atq. etiam in ipsis Alpibus, exceptis earum sum-  
mis iugis & supercilis, ubi nulla præter pumilam pri-  
mo loco descriptam permanere possunt.

Vinetorum pedamenta & pali Viennensi agro ex a-  
biete sunt: circa Neapolim verò, & supra Badenses  
thermas, totiq. illo tractu ex larice (nam ea abundant)  
utpote corruptioni minus obnoxia.

Fiunt item istic ex larice longissimi canales, tectis  
supponendi & aptandi, ad pluias & imbres ex iis de-  
cidentes excipiendum, sunt enim commodissimi: nam  
cum firma & solida materie constent, diutissime solis  
ardoribus, & aliis æris iniuriis resistere possunt, nec  
finduntur aut vicium contrahunt, eaque de causa, nec  
picis, alteriusve rei inductione egent. Horum magna  
copia Viennam aduehitur quinquaginta pedum aut am-  
pliore longitudine.

Hæc habui quæ de coniferis arboribus in his provin-  
ciis nascentibus dicerem: de quibus qui plura cognoscere  
volet,





volet, Petri Bellonii latinum libellum, cui titulum fecit De confaris arboribus, legat, eumq. cum iis quæ Matthioli in primum librum Dioscoridis cap. de Pinu & Picea commentatus est, conferat.

## DE JUNIPERO ALPINO.

## CAP. VII.

Juniperi alpi-  
ni historia. 4.

ELEGANS est hoc Juniperi genus, nec antea mihi observatum. Cubitalem autem non excedit altitudinem, sed depressum est, & quasi humi spargitur: multo tamen crassioribus brevioribusque constat ramis quam vulgaris, lentis etiam, fractu contumacibus & contortis: tenellos ramos ambiunt terna folia, aequaliter semper nascentia, ut in vulgari, verum latiora, breviora, crassioraque, nec minus quam illa pungentia, colore interius ex caruleo candicante, exterius viridi: florem non observavi: fructum vero in ramulis gestat vulgari similem, paulo tamen (ut mihi quidem videtur) longiorem, antequam plenam maturitatem consequatur: deinde, ubi maturuit, nigrum, eiusdemque cum illo saporis.

Crescit in scopulis Durrestein & Escheri, quibus duntaxat locis inveni Augusto mense pauculas stirpes fructu maturo & immaturo onustas.

Quantum ex gustu deprehendere licet, facultates à vulgari non absimiles possidebit.


## DE MYRICA PANNONICA.

## CAP. VIII.

Myrica hispo-  
nia.

MAGNUS frutex est, Gallica aut Hispanica Tamarice non multo minor, sed nunquam ut illa arborescit, brumam tamen etiam ferens, & riguis ut illa gaudens: virgæ huic sunt crassiores, folia crassiora, & latiora: singulis





singulis annis novos surculos producit cubitales, virides, omnes plerumque in quandam sp. cam palmaris aut semipedalis longitudinis desinētes, è floribus ex albo purpureascentibus confertam, quinque foliis constantibus, gallica flosculis maioribus: quibus succedunt calyculi oblongi & mucronati, qui dehiscentes papposum semen salicis modo ostendunt: ex maiusculorum foliorum surculos ambientium alis enascuntur alij ramuli ex:guis foliolis onusti.

Copiosè ad flumen Drasen iuxta D. Hippolyti phanum, vulgo Sante Delcken nūcupatum, quod octo ab urbe Vienna miliaribus abest, nascitur: atque etiam ad flumen Rhwartze oppidum Neukirche alluens binis supra Neapolim Austria miliaribus: præsertim iis arenosis locis, quæ hieme ab iis fluminibus inundantur. Floret Maio & Junio, ac deinceps tota fere æstate flores & semen proferre non desinit.

Similem huic quibusdam locis Germania ad Rhenum fluvium, & in Tyrolensi comitatu nasci intelligo. Sed & superiore anno Londini in plerisque hortis satis frequentem vidi.

Ad siluestrem Myricam hac etiam referenda est, ut in Hispanicis observationibus obiter annotari.

Non dubium est, quin iisdem facultatibus prædita sit, eadēque præstare possit, quæ Tamarix à veteribus descripta.

## DE ERICA.

### CAP. IX.

Erica coris  
folio.

ALIT etiam hac Provincia peculiaris Erica generis, quæ in aliis observare non memini.

Erica baccifera.

1. HUMI diffusa est prior Erica, & latas occupat arcas, multis ramis lignosis, flexilibus tamen constans,  
ex atro



ex atro rufescente cortice rectis, qui interdum fibras agunt, ut latius serpere possint, alimentumque sufficiens melius attrahere: assurgentes ramulos numerosa ambiunt foliola, ternis, interdum quaternis versibus disposita, crassa & carnosae, Erica baccifera Lusitanica fere similia, sapore primum linguam exsiccante, deinde acri & linguam vellicante: flosculi ad foliorum exortus pusilli, tribus foliolis constantes, colore herbaceo; his succedunt bacca rotunda iuniperis haud minores, primum virides, per maturitatem verò nigra, & purpureo succo, uti mora, plena, in quibus multa grana inaequalia & veluti triangula: radix lignosa & dura.


Hanc florentem & viridibus baccis onustam, multasque adhuc superioris anni maturas baccas retinentem inueni in scopulis praecelsi montis, vulgo Wechsel appellati, quinto supra Neapolim Austriae urbem miliari, mense Junio, atque etiam postea Augusto, fructu immatura & maturo plenâ in Sneberg & Snealben/celsissimarum Austria & Styria alpinum iugis.

II. MULTOS teretes humique procumbentes ramos

Erica altera.

Altera habet, pedales, aut cubitales interdum, ex atro purpurascens. Hos plurima exigua oblongaque ambiunt foliola, Erica tertiae hispanica fere similia, paulo tamen longiora, quaternis plerumque, interdum etiam quinis versibus ordine disposita, adstringente gustu: flosculi in summis ramulis oblongi, concavi, purpurei diluvioris coloris, ex quatuor foliolis eiusdem fere coloris prodeuntes, qui exsiccati & maturi, nigricans & minutum semen continent: radix dura, lignosa, in diversa tendens: ipsi tamen procumbentes rami, humique diffusi tenues nonnunquam capillaresque fibras agunt.

Copiose admodum crescit supra Seehof in ascensu Berren alben supra secundum lacum: inueni etiam inter saxa &





saxa et scopulos in ipsis praaltis iugis Durrestein, Sno-alben, atque aliarum alpium: similiter & in iis quae ad alpes excurrunt montium iugis; ubi Maio floret, in alius verò solummodo Junio, semen autem Iulio maturescit.

TERTIA minor est, pedatèmq; altitudinem raro superat, & magna ex parte humi procumbit, foliis quaternis, ramulos, contrariis inter se pediculis, semper ambientibus: flores secundum ramulorum summam longitudinem inter folia dependent, cani, pusilli, in quatuor angulos desinentes, herbaceo colore pradi: deinde semen: radix etiam dura & lignosa.

III.

Erica tertia.

Maxima copia nascitur in ascensu montis illius qui superandus est iis qui Gaminga ad Seehof vicinæque loca proficisci cupiunt, quo loco & florentem, & foliacea capitula proferentem Augusto mense collegi: neque usquam alibi conspexi.

ÆQUALI cum superiore hac excrescit altitudine, tenuibusque virgulis pradita est humi etiam diffusis, ex purpura nigricantibus, quæ summa parte in multos plerumque ramulos desinere solent: folia in ordines & versus digesta, ut in reliquis, tenuia admodum, Erica sexta Hispanica similia, ternæque semper quemadmodum in illa, æquali inter se situ virgulas ambientia: summi ramuli onusti sunt coccineis & oblongis flosculis, per extremum in quatuor angulos sectis, colore cum quatuor illis foliolis unde enascuntur, carneo, octonis staminulis nigricantibus, stiloque purpurascente è medio flosculo emergentibus: semen per maturitatem nigricans exiguum: radix aliis similis lignosa. Adnascuntur interdum huius etiam ramulis viridia capitula, è latioribus foliolis compacta, capitulorum Thymi modo.

IIII.

Erica quarta.

Invenitur hac apud arcem Stuchstain in silva illi  
C imminenti





imminenti, alia item proxima ad sinistram oppidi Neu-  
kirche silua, aliisque montanis Pannonia siluis. Floret  
Aprili & Maio, quo tempore aspectu venustissima est.

CERTUM est priorem eam esse quam Matthiolus  
in montibus qui Boemiam à Silesia determinat inuen-  
tam, bacciferam cognominat, ac describit, tametsi pul-  
pam subiuvescentem sua fructui tribuat, qua in mea ni-  
gricat, & purpureo succo manus inficit: sed forte cum  
eam obseruauit, bacca nondum plenam maturitatem  
erant consequuta. Multum autem differt ab Oxycocco  
Cordi, siue Vacciniis palustribus Dodonæ. Erica enim  
non nisi in præcelsum montium iugis & scopulis inue-  
nitur: illa verò duntaxat in palustribus, cum in Belgi-  
ca, tum plerisque Germania locis: huius præterea folia  
crassa, ut dixi, & carnosæ, acria sunt & linguam velli-  
cant: illius verò latiuscula sunt, & prona parte cana,  
refrigerantque & adstringunt.

AD ΕΡΕΙΧΝΥ Græcorum, Ericam aut Ericen Latino-<sup>ἑρείχνη.</sup>  
rum referendas esse has omnes plantas, præsertim ad  
eam quæ est Coris folio, censeo. Nullum harum erica-  
rum prima, tertia, & quarta vulgare nomen intellexi,  
sunt enim montanis pastoribus innominata: sed secunda  
ab illis Zinneke appellatur.

Alia verò Erica folio Myrica passim in multarum  
Prouinciæ solitudinibus obuia, frequētissima etiam  
per Pannonias nascitur: ea ab Ungaris teli zöd, id est  
hiemale viride nuncupatur.

Erica folio  
Myrica.

## DE CYTISO.

### CAP. X.

CYTISI aliquot genera elegantia per Pannonias  
nascuntur, quorum nonnulla alibi nusquam mihi obser-  
uata memini.




PRIMUM cubitales, maioresque interdum habet I. Cytisus prior.  
 virgas, lentas, vimineas, in multas alas diuisas, quas  
 sparsim, & sine ordine ambiunt terna perpetuo folia uni  
 pediculo inhaerentia, viridia, dorso eminentiore, ama-  
 riusculo sapore: summa virga in oblongam spicam flo-  
 rum desinunt, quatuor foliolis constantium, pisique flo-  
 rum formam emulantium, multo tamen minorum, co-  
 lorisque lutei, suavis odoris melleumque quiddam spi-  
 rantis: siliqua deinde succedunt plana, oblonga, semen  
 flauescens exiguum continentes: radix dura, lignosa,  
 oblonga, fibrisque rarioribus donata est.

Copiose nascitur non modo in omnib. siluis Viennensis  
 agri, & ad vias; sed plerisque etiam Pannonia locis,  
 atq. in ea Austriae inferioris parte, qua veteri circum-  
 scriptione Pannonia non continetur.

Crescit & in Hercinia silua quae Boëmiam undique  
 cingit: ubi florere incipit sub finem Junij, & Augusto  
 plerumque desinere solet: at in Pannonia maturius.

CVBITALES nonnunquam sunt Alteri virga, re- II. Cytisus alter.  
 eta, tenues, viminea, & lenta: quas ab infimo ad sum-  
 mum usque exornant folia, terna uni pediculo inhaeren-  
 tia, superiori fere similia, sed omnino incana, angustio-  
 ra, gustu amaro, quae trita, pingua esse videntur:  
 ex singulis interdum foliorum sinubus ramuli prodeunt,  
 similibus foliis, sed minoribus obsiti, ferentes in summo  
 quinos aut senos flores, loti pratensis herba, quam à præ-  
 grandibus siliquis nonnulli siliquosam cognominant, flo-  
 ribus persimiles, coloris aurei, odoris non expertes: &  
 ex folliculis deinde siliquas planas, oblongiusculas, hir-  
 sutas omnino, atque in his semen subruffum, planum,  
 nonnunquam tumidiusculum & rotundiusculum, durum,  
 quod maturitate dehiscentibus siliquis excidit: radix  
 dura est & lignosa, nigricans, & summa tellure sparsa.





*Frequens est toto agro Viennensi, praesertim supra Phasianorum, & multis aliis cum Austria superioris & inferioris, tum Pannonia locis aridis propter vias.*

*Floret Iulio, & subinde usque in Autumnum, semen sub Augusti finem, & Septembri maturescit.*

*Integras saepenumero huius fruticis plantas cuscuta vulgari, quam legitimam Dioscoridis androsacen esse plerique existimant, obsitas inueni.*

2.

*Cytisi secundae species altera.*

*Eius aliud genus est multo maius, crassioribus virgis, admodum hirsutis, erectis, foliis duplo amplioribus, floribus & siliquis maioribus: ipsi etiam flores colore magis aurco rutilant: iuxta sepes nascitur, rarius tamen & minus obuium superiore.*

III.

*Cytisus tertius.*

*ALIQUOT ramis praeclitus est Tertius Cytisus sparsis & humi fuscis, tenuibus, lentis, & fractu contumacibus, qui nullis aut rarissimis foliis sunt obsiti, multos autem ex lateribus ramulos proferunt tenellos, hirsutos, in quibus folia longis pediculis innitentia, terno semper numero, superioribus breuiora, elato dorso, superne viridia, inferne incana lanugine pubescentia, gustu amariuscule, herbaceo odore: ex alarum in extremis ramulis, nonnunquam et per totos ramulos prodeunt terni aut quaterni flores simul iuncti, superiori forma similes, colore luteo, qui tamen, dum marcescere incipiunt, aureum colorem adeo saturum contrahunt, ut purpurascere videantur: folliculi, unde flores emergunt, pallent & lanugine pubescunt: siliqua superioribus paulo planiores, non minus tamen hirsuta, semen continent exiguum subfuscum: radix dura, lignosa, iuxta quam rami per terram sparsi subinde fibras agunt.*

*Sponte prouenit siluula quadam ad Lachen primo ab urbe Vienna miliari, & plerisque aliis locis urbi vicinis: tum etiam in utriusque Pannonia siluis atque etiam in Interamni*





teramni ultra Drauum flumen. Maturius floret superioribus, Maio videlicet, interdum etiam Aprili, & nonos interdum ex ramulis flores per totam deinde aestatem profert.

Cytisi tertij  
species altera.

Sed & huius generis alius inuenitur pedalis virgis, tenuibus, viridibus, supinis & humisusis, quas ambiunt folia superioribus similia: flores etiam similes extremis virgis quini, seni, aut plures simul congesti innascentur, nulli autem per virgas sparsi ut in superiore: siliqua & semina non differunt: virga, foliorum pars prona & siliqua molli hirsutiae pubescunt.

Inuenitur in Pannonia siluis, florétque Maio.

INTER ΚΥΤΙΑΣ Cytisi generat referendos esse hos frutices certissimum est: iisdemque cum illo facultatibus praeditos verisimile. Prioris historiam nostrum Lobelium in aduersariis prodidisse existimo: reliqua Herbariis nostra aetatis prorsus ignota.

De Colutea scorpioide cognominata.

#### CAP. XI.

CYTISO cognata sunt haec stirpes, ideoque proxima illius generibus collocanda.

I.

Colutea scorpioide clatior.

MULTAS Prior ex una radice fert virgas bicubitales interdum & tricubitales, graciles, satis tamen firmas, in frequentes ramos diuisas: folia septem aut nouem uni costa inhaerentia & alata, bina semper ex aduerso sita, vno, quod imparitatem facit extremam alam occupante, Colutea foliis similia, sed minora, Polygala Valentinorum fruticantis in Hispanicis observationibus descripta fere paria, saturatius tamen virentia, gustu ingrato admodum & amaro: è singulis ramulorum alis praerent tennes pediculi sustinentes plerumque binos flores, Colutea similes cum forma tum colore, sed minores & nonni-



& nonnihil odoratos : siliqua non sunt crassa & vento turgida, uti in illa, sed oblonga, teretes, & quodammodo articulata, uti in *Valentinorum polygala*, longiores tamen, semina laevia, oblonga subfusi coloris, & ingrati saporis, singula in singulis articulis continentes : radix lignosa, longè latèque dispersa.

*Colutea scorpioides humilior.*

Est & alia humilior, humique se diffundens, qua neque folius quinis aut septenis uni costæ plerumque inhaerentibus, neque floribus, qui pisiformes bini semper extremis oblongis pediculis innascuntur, à superiore differt: sed huius virga palmares duntaxat aut pedales hieme marcescere magna ex parte solent, & novo vere denovo ex radice germinare: siliqua & semina paria : radix similiter dura & lignosa latè se spargit, nonnullisque fibris donata est.

Sponse nascuntur & ad Calenberg vicinisque *Vienna* montibus abundè, tum etiam in nonnullis *Pannonia* montanis locis. Priorem in Belgicis hortis antè videram: cuius *Pena* & *Lobelius* in *Adversariis* etiam meminerunt, qui in *Valena* silva agri *Mompelliani* nasci asserunt: Ea in hortis culta longè maior evadit. Posteriores nunquam antea observare memini. Florèt Maio.

II.  
*Colutea scorpioides altera.*

ALTERA nititur radice crassa & lignosa, lenta tamen & flavescente cortice obducta, multisque fibris firmata: ex qua multas singulis annis producit virgas pedales, nonnunquam etiam cubitales, lentas, vimineas, laeves, virides, & in his temerè sparsa folia, quina, septena, etiam novena uni costæ inhaerentia *Polygala* *hispanica* maiori similima, saporis primùm exsiccantis, deinde nonnihil acrimonia in summis labris relinquentis: flores in alis foliorum oblongis virgulis inhaerentes, copiosi, leguminacei, in coronam dispositi, lutei, *Hispanica* floribus persimiles, nullo grato odore commendati:  
semen





*femen deinde in filiquis articulatim distinctis hispanice simile.*

*Crescit in montium qui à Danubio & Calenberg illi ad dextram imminenti ad Alpes extenduntur radicibus, inter vepres & ad vinctorum margines. Floret Iunio, nonnunquam etiam Maio.*

## DE ANONYMO PRIORE.

### CAP. XII.

*POLYGALÆ vocabulum, & nonnulla alie nota faciunt, ut hanc ἀνώνυμον quidem, sed elegantem, & nemini adhuc, ut arbitror, cognitam plantam superioribus subiungam.*

*Ex radice longè latèque summa tellure serpente, lig-nosa, flexili, & subinde capillares fibras agente, multi prodeunt lenti & obsequiosi ramuli, dodrantes, qua terra integuntur ad eorum exortum plerumque fibras agentes: folia in his buxi amula fere, carnosa, viridia, paulo tamen magis mucronata, confuso plerumque ordine disposita, gustatibus ingrata primum, deinde amara & feruida: flores inter folia in extremis ramulis oblongi, terni aut quaterni, odoris expertes, nonnullis verò locis odoratissimi & narcissinam quandam fragrantiam emulantes, tribus foliolis constantes, quorum duo alba sunt, & alarum modo sursum expansa, galeola exalbida illorum exortum integente, tertium folium in oblongum veluti tubulum conuolutum est, sursum per longitudinem apertum, per extremitatem braccia modo efformatum atque luteum, & vetustate interdum omnino purpurascens aut rubescens: floribus succedunt late & compressa filiqua, Thlaspi latifolij filiquis paulo minores, virides, quæ bina plerumque (nonnunquam verò unicam tantum) continent grana, exigui crui magnitudine,*

*ἀνώνυμος Κο-  
luteæ flore.*





tudine, colore ex cinereo nigricante, hirsuta, & veluti quoddam animalculum ementita, *Polygala vulgaris maioris rubra* (de qua secundo libro) semini haud absimilia, sed minora, qua aperientibus sese per latera loculis, sponte excidunt.

Frequens est non modò in montibus *Medeling*, & *Badensibus thermis imminetibus*, sed & in aliis ad *Alpes excurretibus*, qui omni resiniferarum genere integuntur, inter saxa: atque plurimis *Pannonia locis*, uti supra *Posonium*, *Sopronium* & *Zolonock*. Floret *Aprili* & *Maio*, semē funio maturitatem adipiscitur.

NULLVM nomen huic suffrutici imposui, quòd non succurreret an à veteribus fuerit observatus: atque ut ansam studiosis praberem, diligentius illos excutienti, si fortè appellationem aliquam aptam inuenire possint, ne perpetuò avórvuos maneat. Rusticis sanè neglectus est, eaque de causa nullo illum nomine vulgo dignantur: attamen nonnulli, quòd perpetuò vireat, *Wintergruen* appellari mihi dixerunt.

## DE CHAMÆGENISTA.

### CAP. XIII.

GENISTÆ illius, qua per uniuersam fere Germaniam, Galliam, atque Angliam vulgatissima est, cuiusque flores *Belgæ muria* condiunt, & capparum loco edunt, sponte nascentis per *Pannonias* aut *Bohemiam* nulla vestigia observare potui. *Chamægenista* verò duo genera plerisque locis sese obtulerunt.

PRIMUM multis palmaribus interdum etiam pedalis aut maioribus virgulis humi diffunditur, teretibus, lentis, striatis, virentibus, & in aliquot ramos diuisis: per quos confusò ordine & quasi temerè sparsa sunt foliola, bina, terna aut quaterna, ab eodem exortu &

D                      tuberculo

1.  
Chamægent-  
is historia:



tuberculo prodeuntia, Genista vulgaris germanica foliis similia, dorso eminentiore, & quasi complicata, superne viridia, inferne nonnihil canentia, gustu amarinsculo, & inter illa singuli aut bini flores lutei, quatuor foliolis constantes, Genista germanica floribus forma similes, sed minores, nullo interdum, aut certe per exiguo odore præditi; nonnunquam satis odorati: siliquæ succedunt planæ, hirsutæ, exiguum flavescentes semen Cytisi generibus simile continentes: radix est dura, lignosa, aliquot fibris donata: sed et virgula secundum radicem, qua terra integuntur, plerumque fibras agunt.

Nascitur multis Pannonia locis ad viarum & silvarum margines, editis & siccis locis, desertisque nonnunquam agris. In cultis atque inter vepres interdum magis luxuriat & amplior fit. Floret Maio, nonnunquam etiam Aprili.

ALTERIVS historiam, cum ab aliis sit prodita, 11. hic rētexendam minimè duxi.

In sola verò Pannonia nunc (nam olim apud Helvetios & quibusdam Germania locis colligere memini) sponte & copiosè nascentem hanc stirpem observavi in silva Nemethwywar 7<sup>ll<sup>ia</sup></sup> Dn. de Baithyan arcem munitissimæ proxima, atque supra Sopronium, sed omnium abundantissimè inter Sakturnya 7<sup>ll<sup>ia</sup></sup> Comitibus de Zrinio munitissimam arcem, & Fridaw Mag<sup>us</sup> Dn. Michaëlis de Zck arcem, in collibus.

Chama-genista altera.

AUSTRIACI Ungaris vicini Priorem Gelbekler, hoc est, trifolium luteum appellant: Alterā Germani Erdepfrimmen/ id est, terrestrem genistam nuncupant: nonnulli Genistam sagittalem.

Genista sagittalis.

CETERVM per Pannonias vulgarissima etiam est ea Genista species, spinis & aculeis horrens, quam nonnulli Genistellam spinosam nominant, Ungari Iglicze,

Genistella spinosa.



hoc est, aculeatam, Germani *Ätichend pfeimmen*. Et suffrutex ille qui à tingendi usu Floris tinctorij nomen vulgo obtinuit, quique Vngaris *Festő verág* dicitur.

Flos tinctorius.

## DE ANONIDE NON SPINOSA.

## CAP. XIIII.

ALUNT Silesiaca prata Anonidis quoddam genus à vulgari diversum, quod ab aliis minimè observatum existimo.

MULTOS annuatim ex radice dura, lignosa & perenni fert surculos cubitales, & bicubitales, rotundos, lentos & vimineos, firmos tamen & admodum ramosos, molliq. lanugine obductos: multa folia alternatim caulem lata basi amplectentia, interdum singularia, plerunque autem terna ex eodem pediculo prodeuntia, molliora & ampliora quàm vulgaris: summa virga & rami desinunt in oblongam spicam florum vulgari quidem similium, sed colore magis sanguineo: siliquas deinde persimiles vulgari, quemadmodum & semen fert. Tota planta lento quodam humore graniter & hircinum olète obfusa est, Fraxinella fere odore, & nullo aculeorum vallo munita.

I.  
Anonis mitior  
prima flore  
purpureo.

EST & aliud genus huic adeo simile (praesertim si utrumque in hortis colatur) ut, ante quàm flores explicentur, nisi diligenter inter se conferantur, vix discerni queant: pinguius tamen paululū deprehenditur, nec adeo graniter odoratum: praeterea ubi sponte nascitur paulo candidius est: eius item flores, qui sunt lutei, breviori spica nascuntur.

II.  
Anonis mitior  
flore luteo.

Prioris semen è Silesia nobis missum est Trifolij maioris & foetidi nomine, & planta nata. Alterum frequens nascitur cum in Gallia Narbonensi, tum Hispania & Lusitania. Floret utrumque Junio & Julio.

Trifolium  
foetidum.

Natrix Plinij.

CVM tota quasi facie Anonidem vulgarem, exceptis spinis, referant haec planta, licebit eas Anonides non spinosas siue mitiores nominare. Posteriores nonnulli Hispani ciceris genus esse autumabāt. Pena et Lobelius Plinij Natricem esse censent, cuius lib. 27. cap. 12. meminit: sed in Plinij natrice radix duntaxat hircum olet recens eruta, non tota planta. Cúmque aliter eam non describat, difficile esse existimo posse indicare quam illa sit.

Fraxinella.

Olet & hircum quae vulgo Fraxinella appellatur, cuiusque radix Dictami albi nomine in officinis nota est. Illius passim in Pannonicis silvis Viennensibusque saltibus inveniuntur duo genera: Vnum elatius, oblongiore florum spica, floribusque saturationibus & foliis nigrioribus: alterum humilius, breuiore spica, floribus & foliis dilutioribus: Vngari Dictamus vocant,

## DE CNEORO MATTHIOLI.

## CAP. XV.

Cneori Matthioli historia.

MULTOS habet ramos graciles, flexibiles, lentos & surculosos, qui ab ipsa protinus tellure emergunt & humi diffunduntur: folia sine ordine circum surculos disposita, viridia, cutanea, Thymelea vera proxima, ingrati primùm, deinde amari saporis, nulla (quantum quidem gustanti deprehendere licuit) acrimonia praedita: flores in surcularum cacuminibus, sex, septem, aut plures, conferti, quatuor foliolis constantes, purpurei, Centaurij minoris florum fere amuli, ingrati etiam & amari saporis, aspectu tamen pulcherrimi, atque odorati, & caput (si diutius naribus admoneantur) tentantes: iis succedit fructus exiguus Thymelea fructui haud dissimilis, sed oblongior & candidus, non ruber, semen





semen continens membrana cinerea tectum, rotundum, Thymelea granopar: radix oblonga, digiti minimi ut plurimum crassitudine, nigricans, lenta, superiore parte interdum gracilior, unde rami flexiles & humi diffusi emergentes, subinde secundum alarum caua satis crassas fibras agunt.

Prouenit in multis montibus Vienna vicinis tanta copia, ut rustica mulieres, dum floribus abundat, multos eius manipulos in forum venales adferant, cum varij generis aliis floribus, exornandorum tricliniorum gratia. Nasctur & in Pannonia siluis editiore loco sitis ultra flumen Rabam.

Aprili plerumque florere solet, atque etiam Maio: fructus maturitatem consequitur Junio. Adeo autem fecundus est hic suffrutex, ut ter sepe numero eodẽ anno floreat, nonis floribus semen semper consequentibus, quod probè maturum bis eodem anno de iisdem plantis colligere memini.

Cneorum al-  
bũ Theophras-  
ti.

MATTHIOLVS commentariis in Diosc. cap. De Cinamomo hũc suffruticem pro Cneoro albo Theophrasti proponit. Cum verò doctissimorum quorumque iudicio Cneorum Theophrasti à Thymelea et Chamelea Dioscoridis non differat: cur potius huic id nomen accommodare malit, quàm illis, multis mirum videtur. Postrema autem editione cap. de Thymelea lib. 4. aliud nobis Cneoron Theophrasti adfert, nullis, ut ipsius verbis utar, deficientibus notis. Sed cùm nudam imaginem addito Cneori duntaxat nomine nostris oculis subiiciat, è planta sicca sibi Roma missa expressam, illiusque hystoriam plane subdiceat: ne agre ferat, si parum fidei ipsius assertioni adhibeamus.

Ceterum nisi in hac planta, acrimonia, quæ quidem sensu percipi possit, abesset, ad Thymelea genera, aut ipsi  
congene-

congeneres stirpes (quales multas inueniri in nostris Hispanicis observationibus monuimus) hunc suffruticem referendum esse censerem. Vulgare autē nomen cur apud rusticas mulierculas nullum inuenerit, satis mirarinequeo, quandoquidem illius flores ipsis adeo sint familiares & in deliciis. Inueniuntur tamen nonnulli rustici, qui *Stein roselin* / hoc est, *petraam rosulam* appellent.

EIVS porro facultates sunt nobis incompertae.

## DE ANONYMO ALTERO.

### CAP. XVI.

MEDIAM quandam inter superiorem, & Cisti humilis genera naturam adeptā videtur hęc planta: ideoque mediam inter utriusque historiā collocauimus.

OBLONGIS verò, interdum dodrantalibus tantum, serpit ramis, humi diffusis, nigricantibus, in multos alios breuesque ramulos diuisis: folia frequentia & conferta sunt, bina semper inter se opposita, exigua, Serpillo minora, Thymi durioris foliis: laud multo maiora, crassa, superiore parte viridia, infernè candicantia, gustu amaro: extremis ramulis innascuntur bini aut quaterni flosculi simul iuncti, perpusilli, ex quinque foliolis compositi, colore quasi carneo: his succedunt capitula, quę per maturitatem in quinque crenas dehiscunt, semēque exile admodum ostendunt: radix dura & ligrosa est, aliquot fibris donata: quinetiam rami subinde tenues fibras agunt.

ἀνώνυμος  
foliis Thymi.

Nascitur tenui solo inter saxa, in summis Sneberg & aliarum Alpium iugis. Floret Junio, interdū etiam paulo maturius, atque ut arbitror statim post solutas nives. Exsiccata planta non iniucundo spirat odore.

NONDUM mihi constat quò istam plantam referre  
D 5 debeam,



debeam, eam ob causam ἀρώματα etiam reliqui, liberum cuique faciens, quo potissimum nomine eam appellare libeat: nisi forte ea sit, quam Pena & Lobelius in *Aduersariis Alpinis* alteram vocant, & statim post *Chamerhododendron* odorem collocant.

## DE CHAMÆCISTO.

## CAP. XVII.

IN *Hispanicis* meis observationibus, ad *Cisti* semina tertiam classem retuli eas plantas, quas nonnulli *Helianthemum* Plinii appellant, alij *Panacen cheironium* Dioscoridis esse censent, planè diuersas à *Cisto* folio *Sampsuci*, quem in secunda classe reposui.

Illis congeneres aliquot in *Pannonicis Noricisque* montibus inueni, quarum historiam hoc capite describemus, quoniam ab aliis minimè esse obseruatas video.

*RAMULOS* habet prior humi fusos, dodrantes aut maiores, multis oblongis angustisque foliis, nullo, ut plurimum, certo, sed confuso ordine dispositis septos, præter vulgarem in omnibus *Cisti* generibus foliorum situm, sapore primum veluti gummoso, deinde amaricante: bini aut terni extremis ramulis inter folia insident flores, quinis foliis constantes, colore luteo cum suis in medio staminulis: quibus succedunt trigona capitula satis magna, minusculum & inaequale semen continentia: radix lignosa, dura, vixax, foris nigro cortice obducta, & in aliquot ramos sparsa.

Rarior est, nec nisi in monte *Badensibus thermis* imminenti, atque in *Hamburgensi* pauculas plantas inueni florentes mense Junio, quo tempore semen etiam perficit.

*DODRANTALIBVS* est etiam Altera ramulis, humi similiter diffusis, quos bina semper contrario inter se

I.

*Chamæcistus*  
1. angustifolius.

II.

*Chamæcistus*  
folio cano.







inter se sita sepiunt folia, *Myrti tarentina* foliorum magnitudine, aut angustiora, supernè cinerea quadam lanugine obducta, infernè verò omnino incana, sapore adstringente, & nonnihil deinde amaro: pediculos postea exerit duarum aut trium unciarum longitudine, quibus insident quini aut seni flores superiori cum formato colore similes, capitula etiam trigona, minora quam in superiore, semine inaequali, minuto, ruffo plena: radix superiori similis & *vinax*: pediculi flores sustinentes maturo & deciduo semine exsiccari plerumq. & confringi solent: qui in iconè à sculptore corrupti fuere.

Abundantissimè nascitur in omnibus illis montibus qui à Calenberg ad Alpes continua serie perducuntur: tum etiam in *Hamburgenfi*, & aliis *Pannonia* locis, agris editioribus desertis siccisque, gramineis tamen. Floret Maio, semen maturum est Iunio.


## III.

*Chamaecistus*  
*Serpilli folio.*

MULTOS promit Tertia ramulos ex eadem radice, tenues, oblongos, summa tellure sparsos, subrubentes, in quibus exigua folia, ordine quodam & duplici serie, quemadmodum in reliquis *Cisti* generibus disposita, serpilli fere similia, nigricantia & hirsuta, crassaque: sub florum verò partum, in nouellis ramis longiora & candidiora: flores in extremis iisdem nouellis ramulis terni aut quaterni, oblongis & hirsutis pedicillis inhaerentes, quinis foliis, ut superiorum flores constantes, illisque magnitudine pares, sed aurei planè coloris, & odorati: semen observare non licuit: radix multifida, aliquot fibris latè sparsis capillata.

Nusquam nisi in summis *Austria* & *Styria* Alpibus inueni, semel mense Augusto florentem: in hortum verò translata Maio mihi floruit, sed flores cum suis pedicillis nimium caduci, omnem observandi seminis occasionem planè ademerunt.

PAL-





PALMARIS aut paulo amplior est. hac supero-  
ribus tamen firmiter, multisque ramulis, ligiosis, rectis  
& nigricantibus prædita, quos numerosa & adeo con-  
ferta ambiunt folia, ut gemino ordine digesta videan-  
tur. Myrti tenuifolia foliis non dissimilia, minora  
tamen, & hirsuta, licet atro virore supernè splendeant,  
sapor adstringens suis unicuique, interdum aliter extremis  
ramulis exit satis crasso pediculo subnixus, unico qui-  
dem constans folio, sed quinque profundis crenis, usdem-  
que velut circinatis diuiso, ut quinque foliis constare  
quis putet, eadem qua superiores magnitudine, colore ex  
albo purpurascens, & quasi carneo dulciore, decem  
scilicet. n. b. is extrema parte nigris, & stilo oblongo purpu-  
rascens medium florem occupantibus: floribus excussis  
apparent pentagona capitula, qualia in nonnullis Cisti  
generibus videre est, obtuso quodammodo mucrone, quæ  
maturitate aperiantur, semenque continere deprehen-  
duntur admodum exile, colore fluo.

Rarissima est hac, & dumtaxat provenire depre-  
hensa est in scopulis iugi Snealben florens sub mensis Iu-  
ni finem: semine verò prægnans Augusto in Veyzal-  
ben duobus supra Neuberg miliaribus. Eam in horto  
cicurare volui semel atque iterum ex iis iugis cum suo  
cessu desumptam: sed operam lusi.

NULLVM nomē vulgare obtinent hæc planta, quod  
intellegerim, præter Secundam, quam nonnulli Rustici  
Hepl aller welt krait, appellant, à præstanti videlicet  
curandorum vulnerum facultate: quo etiam nomine  
donari audio Helianthemum illud; cuius auersa in his  
quoque Prouinciis inueniuntur genera.

Omnes autem etiam hieme folia retinent.

E

DE MYR-

## DE MYRTO-CISTO PENNÆI.

## CAP. XVIII.

ELEGANS porrò ea est planta, cuius iconem Cl. V. Thomas Pennæus Londinensis medicus anno 1580. ad me misit, & subsequente anno Londini in Anglia siccam ostendit; quam ille ex Balearium insularum maiore, vulgo Maiorica nuncupata erutam propterea appellauit.

Myrtocistus  
balearica.

TRICVBITALIS interdum frutex est, scabro admodum cortice, & veluti quibusdam tuberculis ob-  
sito, qui in vetustis ramulis facile abscedit & sponte  
decidit: folius Myrti fere, dorso non minus scabro quam  
ramuli, supernè autem lauibus, coniugatim ut in reli-  
quis Cisti generibus circa ramulos nascentibus: flores  
summis virgis insident lutei, quinque oblongis foliis con-  
stantes, & multis intus longiusculis staminibus præditi:  
his succedit oblongiusculum & pentagonum capitulum  
semine plenum.

Tota stirps odorata est, & gummi siue resinam  
[lentorem potius & pinguem quendam succum quali  
Ledi genera madent.] effundere videtur.

## DE LEDO



## DE LEDO SILESIACO.

## CAP. XIX.

**CISTI** Led generibus ad unum audire esse hunc non minus elegantem & rariū fruticem non est dubium, quibus odori jucunditate proximum emanat.

Ledi Silesiaci  
historia.

**CVBITALIBVS** autem interdum est virgula firmi lignis, cortice cinereo elucta, quæ in summo in plures alios tenuiores & quodammodo purpureascentes, easque etiam nudas diuiduntur in a virgula in alios quadrantales ramulos, virentes quidem, sed tomento quodam rubiginis coloris obfuso, quos nuda fric ducta sed confusa ambiunt filia. Libanotis coronaria foliis fere similia, sed longiora, supina parte virida, adterque in pronam partem reflexa & conuoluta, ut eius nihil conspici possit præter uernum secundam folij longitudinem excurrentem simili tomento, cum pediculo cui inhaeret, pubescentem, grati & suauis odoris, acris autem saporis summi istis ramis insident capita ex multis brevibus quam squamis ferrugineis compacta, è quibus deinde sese explicat corymbacea quadam comul-torum florum, oblonga, tenellis, atque virentibus nonnihil tamen lanuginosis pedicellis inhaerentium, grato odore nares ferientium, quinis foliolis albis constantium, non subluteorum (ut temere quidam, qui siccam fortassis plantam duntaxat conspexit, asserit) decem candidis staminulis cum stilo medio flore occupantibus: his demum succedunt capitula oblongiuscula, pentagona, officulis fructus cornu nonnunquam magnitudine haud cedentia, quæ, dum adhuc virent, argenteis punctis distincta esse videntur, sed maturitatem ad-  
epta, rubiginis sunt coloris, seménque continent oblon-  
gum,





gum flavesceat, adeoque exile, ut scobis e lignis a ver-  
mibus erosus sponte decidens instar sit. Verum peculia-  
re est in istis capitulis, ut per maturitatem deorsum  
inflexantur, terramque mucrone spectent, magna Na-  
tura providentia, ne semen temere effluat: etenim, præ-  
ter reliquorum consuetudinem, a pediculo, non ab ex-  
trema cuspide aperiiri & dehiscere solent. maturo semi-  
ne, terni aut quaterni atque ramuli rubigineo tomento ob-  
diti, cum suis foliis in coma lateribus enascuntur, spem  
florum insequentem annum pollicentes: radix lignosa,  
& brevibus fibris donata.

Tota planta odora est, præsertim cum floribus onu-  
sta est, & aromaticum quiddam spirat: itaque mirum  
non est, si, ut testis est Matthiolus, vestibulis inuciat, ad præservandas eas à tineis.

Nascitur in plerisque Silesiæ locis, unde non modò  
aliquot stirpes erutas, sed etiam recentes ramos floribus  
elegantissimis & suo fructu onustos ad nos misit anno  
1578. Doctiss. Vir Achilles Cromerus Nissenus, rei  
herbariæ studiosissimus & nunc R<sup>mo</sup> ac Ill<sup>mo</sup> Episcopo  
Vratislaviensi à secretis: qui nos etiam pro nostra ami-  
citiæ peramanter admonuit, ad montium radices se ali-  
quot plantas inuenisse, quæ flores sex folius constantes  
duodenisque staminibus præditos proferrent. Insuper  
addidit, qui illi dux via fuisset, Venatorem adfirmare,  
similem plantam in summis montium iugis conspexisse,  
iam suis floribus ornatam, quæ digitalem longitudinem  
non excederet: nominatam autem ab eo Heptdnisch bin-  
kraut, hoc est peregrinam apiariam, quòd apes eius vi-  
delicet floribus delectentur.

Floret sub finem Iunii & Iulio, maturescit Augusto  
et Septembri: inharrentq; interdum insequentem usquo  
annum

annum capitula, sic ut recenti flore, & fructus superioris anni vestigiis onusti rami nonnunquam conspici possint.

ROSMARINVM silvestre vocatur hic frutex à Rosmarinum  
fil. Matthioli. Matthiolo: sed, ut dixi, ad Ledì genera potius referendus videtur, in qua sententia est doctiss. noster Lobelius: ideoq; Ledum Silesiacum nuncupavi. Si quis Boëmicum (quod in Boëmia etiam nascatur teste Matthiolo) aut foliis Rosmarini cognominare malit, à filiorum cum illo similitudine, per me licet. Arbitror Cor- Chamaepeuce  
Cordi. do haudquaquam ignotum fuisse, & Plantarum historia lib. 1. Chamaepencen ab eo appellari.

Non dubium est, quin, si quis periculum faceret, ad pleraque magni usus futurus sit hic frutex. Atque adeo Ledi Silesiaci  
facultates. Silesij, teste Cromero, aduersus articulorum contractiones felicissimum eius usum compererunt, totius planta decocto in solum infuso, cui egri insideant, & subindè id repetant. Idem me huius oleo stillatio, Nisseni pharmacopœi opera et diligentia vitreis organis extracto, superiore mense, hoc est Octobri huius anni 1582. donavit, quod sanè fragrans admodum cum sit, & stirpis florumque nativum odorem retineat, easdem proculdubio facultates etiam obtinebit. Nondum tamen quisquam periculum fecit: sed non de futuro arbitramur qui brevi experientur.

II SDEM porrò locis quibus id Ledum crescit, nonnunquam inuenitur frutex quidam pedalis altitudinis, raro amplior, tenuibus subrubentibus virgis preditus, quæ deinde in tenuiores candicantesque ramulos dividuntur, angustis oblongisque foliis temerè & confuso ordine eos vestientibus onustos, supernè virentibus, infer-



nè verò careſcentibus, & Salicis pumila a nguſtiſolia  
(quæ infra deſcribetur) foliis ad nodum mul-  
tis, quibus valde cæſcante, & nullo grato odore, ſummis etiam  
ramis inſident capitula ex multis breuibus ſquam-  
mâ compoſita, è quibus ſeſe expleant aliquot floſculi tenui-  
bus oblongiſque pedicellis inbarentes, quinque foliolis  
conſtantes ut ſuperioris, ſed diuerſi coloris, nimirum  
rubri dilutioris ſive quodammodo carnei, quibus excuſ-  
ſis pentagona conſpiciuntur capitula breuia & obtuſo  
mucrone, exili & pallescente ſemine plena.

Eodem quo ſuperior tempore floret, & maturam ſe-  
men profert.

Hunc nobis ſub ſuperioris Autumni initium è Si-  
leſia miſit C. V. Fridericus Sebiſius medicus hac in-  
ſcriptione, Roſmarinus ſilueſtris ἀόσμος. Similem ve-  
rò ante multos annos Machlinia in horto aluiſmus, &  
florentem non procul Loon arce inter Campania Bra-  
bantina ericeta erutum accepimus.

Rosmarinus  
fil. ἀόσμος.

## DE LEDO ALPINO.

### CAP. XX.

LEDO Sileſiaco non ineptè ſubiungetur odoratus  
hic atque elegans frutex, multis cubitalibus, lignoſis,  
duris, humi diſſuſis cinereoque cortice rectis ramis præ-  
ditus: quorum extremi ramuli conſuſè naſcentibus foliis  
ſunt obſiti, Chamælea italica hand abſimilibus, duris, ſu-  
perne virētibz & ſplendētibz, inferne dilutiore viro-  
re conſpiciuis, apice interdum rotundo aut obtuſius mu-  
cronato, guſtū adſtringente, atque in ambitu villoſis  
hirsutiſque, uti ſunt & noua germina, quorum extre-  
mis coma ſlorum inſidet deorſum inflexorum & propen-

Ledon alpi-  
num, & eius  
hiſtoria.

E 5 dentium,



dentium, concanorum campanula modo, qui summa labra quinque diuisuris secta habentes, foris intensius rubent & argenteis veluti guttis (cum ipsis unde dependent pediculis) conspersi sunt, interiore vero parte dilutius rubere conspiciuntur, aliquot intus staminalis lateant huius suauitatis odore: iis succedunt exigua capitula, quinque cellulis constantia, in quibus semen fulvum, minutissimum scobis modo: capitula viridia trita, suo odore veluti capitis grauedinem inducunt: radix dura, lignosa, oblonga, tametsi etiam rami per terram sparsi interdum fibras agant.

Inuenitur in summis Sneberg, Snealben, Wechfelen, Durrestein aliarumque vicinarum Alpium iugis inter saxa, ad deuexa plerumque eorum latera, & supra Garingam.

Aliud eius genus inuenitur in Snealben supra Neu-  
 berg, foliis rarioribus, neque ita confertis, maioribus, <sup>2.</sup> durioribus, admodum venosis, longiore cuspide, <sup>1. ed. alpini</sup> minime in ambitu hirsutis, & prona plerumque parte flavescentibus, aut ferrea rubigine nigricantibus: flores illi superiori similes, sed paulo dilutiores: capitula & semen similia. Huius foliis & ramis adnata aliquando reperiuntur tubercula, nunc nucis pontica, modo pisi magnitudine, inaequalia, foris rutilante aut pallecente nonnunquam colore, intus fungosa, alba, gustuque adstringente, pulpa plena, quae gallarum vicem prestare possint.

Floret utrumque genus Iunio & Julio, sub finem Augusti semen maturescit.

NERION alpinum Doctissimus Vlysses Aldrouandus hunc fruticem appellat teste Cl. V. Conrado Gesnero in descriptione Montis fracti. Alpini pastores Al-  
 rosen

Nerion alpinum.



rosen & Bergrosen nominant, ut ipsi eodem loco, & in epistolis, & Simlerus ad calcem commentarii de alpi-  
bus referunt, quidam Warenblust, Mannli, & Uet-  
laub vocant. Primum genus non in crenis exitum ha-  
rem a Pena & Lobelio V. C. in Acturis, sub Al-  
pigena Chamaerhododendri odora nomine, nisi patulus  
asparagi vel taxi pares illi induerent, quas in caetero  
non reperias: sed capitula pentagona tantum, ut ex eius  
descriptione satis liquet. Alierum plurimum convenit  
cum eorum montana Chamaleæfolia sine Ledi foliis a  
Chamaerhododendro minus odora. In observatu huius  
prioris iconem exhibet Lobelius Balsami alpini nomen:  
pictor tamen flores hand quaquā fideliter expressit, quos  
in quinque crenas, non in quatuor, diuisi esse comperi-  
set, si ramos suis floribus onustos, quos anno 1574. Vi-  
cis Machliniam misi (è quibus illam etiam expressit)  
diligentius considerasset: licet non negem interdum fieri  
posse, ut quatuor tantum crenis diuidantur, ludente  
nonnunquam sic in floribus natura: at omnes in eodem  
ramo tales natos esse, non est credibile.

Balsamum  
alpinum.

Ego cum Gesnero, loco supra memorato, & in Epi-  
stolis Ledi potius genus esse, quàm Nery arbitror, mul-  
tum me impellente, ut ita censeam, huius stirpis odore  
& temperamento. Rustici & pastores eorum mon-  
tium ubi observavi, utrumque genus Mausch appel-  
lant, eoque Tinctorum qui vicina loca inhabitant, utun-  
tur ad lineas penulas nigro colore insciendas. Nul-  
lum præterea usum apud eos obtinere intellexi.

## DE VITE IDÆA.

### CAP. XXI.


VITIS Idæa nomen à Rei herbarie peritis diver-  
sis stirpibus tribui video: sed maxima pars, Myrtillum  
germa-

germanicarum officinarum hac appellatione Theophrastum intelligere, vult. Nonnulli verò, alium futurum ab ipso descriptum esse arbitrantur. Nos utriusque perit. Surpes hoc capite describemus, a priore initium facientes, quod plurimum opinione id nomen adeptum est cuiusq. species (præter vulgarem nigris bacca, aliam vixens foliis nec deculis, baccisque rubris, & certam palustribus locis nascentem) àvis ab aliis minime descriptas observasse puto.

PRIOR ramis est flexibilibus, & humi diffusis, non admodum crassis, multis germinibus vix è musco <sup>I.</sup> <sup>Vitis Idæa</sup> <sup>Prior.</sup> (qui rano cultantur) prominentibus, in quibus nullo ordine digesta sunt folia, prioris Ledi alpini foliis fere similia, paulo tamen longiora, angustiora, teneriora, minusque crassa, admodum venosa, supernè virentia, inferè dilatata, leuiter per oras crenata, & mollibus quibusdam pilis hirsuta, longo pediculo inhaerentia, sæpe valde adstringente: in summis germinibus præcedenti nam baccas fert (florem non observavi rotundas, ceras, interdum magnitudine, oblongis & tenuibus pediculis dependentes, colore primùm viridi, deinde rubro, postremo nigro, succulentas, gustu non ingrato, nulla stipula continentes, sed plana duntaxat semina alba, quæque numero ut plurimum: radix est lignosa, fibris quibusdam donata, quales etiam rami per terram sparsi nonnunquam agunt.

Maturis & immaturis baccis onustum hunc fruticem, iuxta Ericam bacciferam nascentem in vniuersa Snealben iugi supra Newberg scopulis mense Augusto crui.

VICINIOR est vulgari Altera, quæ ramos etiam <sup>II.</sup> <sup>Vitis Idæa</sup> <sup>altera.</sup> habet





habet humi diffusis interdū, teretes, & ob-  
 nunquam firmos & erectos, cortice modo canereo, modo  
 rubescente obductas, in multas alas brachiatas, & in his  
 folia, illi quæ rubro est fructu forma similia, sed tenerio-  
 ra, venosa, subius exalbida, sapore adstringente et nonni-  
 hil acido: flos vulgari similis ex candido purpurascens,  
 concavus, labris in quinque crenas diuisis, & exterius  
 reflexis, fœtus staminulis: fructus vulgari similis,  
 per maturitatem niger, saporisque gratia non minus  
 quam vulgaris officinarum myrtillus commendabilis,  
 plurima grana in se continens: radix est dura, lignosa,  
 multis fibris capillata: sarmenta siue rami procumben-  
 tes subinde radices agunt.

Inuenitur in Veltz alben ingo duobus supra Neu-  
 berg miliaribus: postea et a obseruati in descensu Her-  
 renalben supra Zeehof multo fructu onustam, atque in  
 Eschero. In Silesiacis etiam montibus proxime in-  
 telligo. Sed & deinde anno 1579. reperi in silua Nori-  
 bergensi urbi proxima ad latomias, ubi & vulgares ni-  
 gris & rubris baccis maxima copia nascuntur, duce &  
 comite C. V. Ioachimo I. F. Camerario.

- III. FORMA & amplitudine hæc a superioribus dif-  
 fert: etenim multis stolonibus statim à radice fruticat,  
 ternos, quaternos, & quinos interdum cubitos altis,  
 crassis, admodum ramosis, cortice magna ex parte ni-  
 gricante obductis: primo vere folia ex gemmis in ra-  
 mulorum lateribus nascentibus promit subius omnino  
 incana, & multo tomento obsita, supernè autem viren-  
 tia, ex quorum medio veluti corymbacea florum co-  
 ma emergit, quinis foliolis candidis constantium, sine  
 odore: folia d'inde paulatim sese explicant, tomento-  
 samq. illam lanuginem abiciunt, et per ambitū serrata  
 conspi-

Vitis tæx  
 genus alterū.



conspiciuntur: fructus floribus succedit rotundus, niger, umbilico quinque alis aut laciniis septo, oxyacantha fructu maior, succulentus, subdulci melleoque sapore, quali fere Ceratia, continens dena aut plura grana oblongiuscula, plana, subnigra.

Abundantissime nascitur montibus Vienna vicinis, uti ad Brunnam, Medeling, Gumpostkirche, Baden, Fischau, atque etiam ad radices Styriacarum alpium. Floret, ut dixi, ineunte vere, fructus Augusto maturus est.

AN priorem rectè in hanc classsem retulerim, aliis indicandum relinquo: nec enim mihi ipsi in illius nomenclatura satisfacio. Si cui videbitur Ledi alpini generibus potius adscribenda, non refragabor: tamen si bacca quibus pradita est, & alia quadam nota non satis conveniant. Vulgare nomen non intellexi. Simlerus ad calcem commentarii De alpinis eius meminisse videtur & Carlobstuden appellare: etenim parum à Rosa montana frutice differre asserit. Hac sanè, folia satis ad illam, ut diximus, accedentia obtinet.

Altera ab alpinis Venatoribus Jagerber nuncupatur; eius autem baccis libenter vescuntur Venatores, ut ipsi mihi retulerunt, unde nomen inditum puto. In Silesia vocatur Gausch cum altera qua rubro fructu pradita est, & palustri: similèmq; apud illos usum obtinent, qualem Ledon alpinum Inspectoribus alpinis prestare dixi.

Vitis idæa  
Theophrasti.

Tertia ab Italica Vitis Idæa Theophrasti censetur: Rustici mōtani Austriaci Fliegenber vocāt, aut quòd musca eius fructum ob dulcedinem appetant, aut quòd neglecta ab auibus, muscis in pabulum cedat. Pena & Lobelius Amelancher nomine describere videntur in doctissimis Aduersariis. Iosias Simlerus verò Flubertlin hoc



lin/ hoc est, pyrū petraam loco supra memorato (ni fallor) appellat. Doctissimus Gesnerus in epistolis varia (si modo hanc intelligit) tribuit nomina, Myrtomalidis, Petromelidis, Pyri ceruina, Pyrastris idae. Nam quam Cotonastrum, vel Cydonaginem & Diospyron, & Wilbkuttē eodem loco appellat, ab hac omnino distinguere videtur, cum illius baccas rutilas esse ait, siccas, carne & succo nullas, seminibus intus quaternis, triangulis.

Pyrus petra.

Myrtomalis,  
Petromelis,  
Pyrus ceruina,  
Pyrastris idae,  
Cydonago,  
Diospyros.

EVM fruticem legisse arbitror in Snealben ingis Innio florentem, & fructus rudimentum efformantem, cubitalibus ramis, obsequiosis, nigricante cortice tectis, nudis, quorum summitates desinebant in breuia germina incana, quinis aut senis foliis praedita malo similibus, supernè virentibus, infernè nonnihil candicantibus, in ambitu ferratis, gustu amaricante: inter quae veluti umbella flosculorum occultatur quinque foliis constantium colore purpurascēte, quorum deinde sedes in exigua mala extuberat.

Cotonastris  
Gesneri.

## DE CHAMÆMESPILO GESNERI.

## CAP. XXII.

FREQVENS etiam est hic frutex in omnibus non modò Alpibus, sed montibus etiam quibusdam Vienna vicinis, virgultis bicubitalibus, & cubitalibus, interdum verò longè breuioribus, pro locorum in quibus crescit natura, obsequiosis, cortice nigro tectis, sic tamen ut tenelli rami canescant: folia alterius generis *Idae* vitis haud multum dissimilia, magis tamen ad cotoneorum similitudinem accedentia, sed minora, & crassiora, supernè virentia, infernè verò cana lanugine pubescentia, impariter & alternatim nascentia. Inueniuntur verè è singulis nodis flosculos profert herbacei coloris, concauos,

Chamaemespilus  
historia.



ternos aut quaternos, in unam quasi congestos, qui deinde in fructum extuberant rotundum, magnitudine baccarum myrti, aut oxyacanthæ potius, colore foris rubro, carne intus pallida, fungosa; oxyacantha fere sapore, quina officula siue semina continere.

Augusto maturus est,

GESNERO Chamænespitem appellare placuit: quem alij Recentiores sequuti sunt. Verum in epistolis satis aperte docet à Coronastro differre, cui maiora folia, baccas non adeo rubras, nec adeo rotundas tribuit.

## DE PERICLYMENO RECTO.


### CAP. XXIV.

OMNES Periclymeni varietates in Hispanicis observationibus persequutus hec arbitrabar: adeo autem infinita herbaria res est, ut nonis subinde, nec unius dumtaxat, sed plurimorum observationibus indigeat: proferunt enim singula promincia quasdam peculiares stirpes, aliis haud communes. Nam præter duo illa genera prima, præterque varias eorum species istic nobis explicatas: obtulit sese alia plane insolens, atque ob elegantiam minime silentio premissa.

HUMANAM vero interdum attingit altitudinem, uti Periclymenum rectum baccis rubris, satisque crasso stipite est, multos in ramos diuiso, nigricante cortice obductos, qui plerumque scaber est, & multis locis hiat, uti in alio Periclymeno: ramuli tenelli candicant, & incana lanugine pubescunt: folia contrario inter se situ disposita, quemadmodum in reliquis Periclymeni generibus, ei quod rubras fert baccas haud dissimilia, paulo tamen maiora, gustu exsiccante, & amariusculo: flos non est mihi conspectus, cum sub finem Iulij solummodo fuerit observatus hic fructus: iam maturo fructu onustus,

1.

Periclymenū  
rectum fructu  
caeruleo.



Bromelid  
 1811  
 1812

qui singularibus baccis, utrimque inter folia brevis pediculo dependentibus, constat, Chamamēspilo Gesneri magnitudine aequalibus, sed longioribus paulo, colore caruleo elegantissimo, quæ vinoso & acidiusculo succo plena, & manus rubro colore inficiente, multa plana grana continet: radix admodum lignosa, & latè se extendens.

Nascitur ad radices cuiusdam montis pago Málitz vocato contigui ad sinistram, viâ qua ad Taurum montem præcelsum ducit.

INCOLÆ Hundsber vocant, quemadmodum Periclymenum fructu nigro & fructum diligenter colligunt, atque in tinctorium usum reponunt.

Admonitum porro Lectorem volo, Periclymenum rectum primum, quod fructu rubro est, haudquaquam inaequales ferre baccas, cum in Pannonia ubi plurimum provenit, tum in Allobrogum, Helvetiorumque alpiibus & aliis locis in quibus sponte crescit: sed geminas semper easque perpetuo fere aequales. In Belgicis autem hortis cultum, vix unquam aequales ad maturitatem perducere deprehensum est: at, cum altera excrescat & turgida fiat, una semper exilis, plena tamen remanet, lagenulamque gestatoriam aut cucurbitulam referre quodammodo videtur.

Periclymenum nigro fructu aequalibus etiam perpetuo est baccis, & postquam Hispanicæ observationes evulgavi, variis in montibus huius Provinciae satis copiose à me repertum est.

AD Periclymeni etiam genera proculdubio referenda est elegans hæc planta, cuius iconem cum descriptione liberaliter pro mutua qua inter nos est amicitia, communicavit c. v. Thomas Pennæus Londinensis Medicus, cum aliis aliquot elegantissimis plantis, de quibus suo loco.

CAVLICVLIS vero dodrantalibus est, radicèq.

Periclymenū  
rect. fructu  
rubro.

Periclymenū  
rect. fructu  
nigro.

II.  
Chama-periclymenū prutenicum.



tenui, qua se propagat, et spatiosum satis locum occupat, hinc inde fibras spargit. Folia ex aduerso per intervalla cauli adherent, quatuor, sex, rarius octo, Philirea narbonensis (sive media) foliis similia, sed paulo maiora, magisque nervosa, in mucronem desinentia, nervis quinque ab ipso pediculo ad mucronem excurrentibus. E supremorum foliorum caulis duo veluti ramuli exeunt foliis binis eodem modo quo in caule dispositis pradi, qui cacumine quaternaria alia folia gestant. Ex istorum ramulorum medio pediculus nudus exit & sine foliis, in cuius summo (flores non fuere observati) rubra bacca racematim coherentes nascuntur, Prutenis rusticis circa Dantiscum expetita, atque etiam in Norwegia & Suecia, ubi in maritimis copiose nascitur.

Qui ad me mittebat, Chamapericlymeni nomē, nec immerito, indidit.

## DE CHAMÆCERASO.

## CAP. XXIII.

NEQUAquam mihi probatur eorum opinio, qui Periclymenum rectum, Plinianam Chamæcerasum esse existimant: cum eius fructus nulla saporis gratia commendetur, nullamque habeat tota stirps cum Ceraso affinitatem. Sed magis verisimile iudico, ipsius Chamæcerasum non esse diversam ab ea quæ plurimis Pannonia, & vicinarum quarundam Provinciarum locis sponte provenit. Nam lib. 15. cap. 25. postquam aliquot Cerasi genera enumeravit, addit: Sunt & Macedonica parva arboris, raroque tria cubita excedentis: & minore etiamnum frutice Chamæcerasi.

Periclymenū  
rectum non  
esse Chamæ-  
ceras Plinij.

VARIÆ porro altitudinis inveniuntur hic frutex: nam interdum in cubitalem, bicubitalem, aut ampliorē etiam longitudinē attollitur, locis nempe umbrosis

Chamæcerasī  
historia.





& tenui solo; nonnunquam verò pedalem haud superat magnitudinem, sicciorebus videlicet locis, & iuxta semitas. Tenuēs autem & lentos habet ramulos, seu virgas, nigricante & cinereo cortice obductas, quæ ex internallis tubercula quadam, & veluti gemmas profertur, unde veluti ex amento, aliquot exigua foliola, Myrti tarentina foliis æqualia prodeunt, simulque flores bini, terni, aut quaterni sese explicant, candidi, quinque foliolis constantes, cum multis in medio staminulis, Cerasi vulgaris floribus persimiles, minores tamen: infra hos flores, atque etiam in extremis virgis, ex aliis tuberculis exeunt sine floribus folia superioribus maiora, Cerasi vulgaris fructu acerbo foliis formā imitantia, per ambitum similiter crenata, sed longè minora, & atro virore splendentia, gustu amaricante: floribus succedit exiguus fructus, rotundus, carnosus, per maturitatem ruber, sapore exsiccante, minusque grato quam sint acida cerasa, ossæo intus nucleo: radix crassa, longa, & lignosa, paucisque admodum fibris prædita, sed profundum petens, & quæ difficulter erui possit.

Crescit passim in Pannonia, Austria inferiore, & Moravia, editioribus siccisque locis, ad vinearum etiam in collibus sitorum margines, & iuxta publicas vias. In Bohemia videre non memini.

Floret Aprili cum primum folia germinare incipiunt, & fructus Junio, interdum etiam Julio solummodo maturus est.

VOCATUR χαμαίκερας & Græcis, Chamacerasus Latinis, Germanis Erdt Weichsel / Ungaris Vadmegy, id est, silvestris merasus (merasum autem vocant serius maturescentem illam cerasum fructu austero & nigro) Gallis apud quos sponte non nascitur, Cerrifier nain nuncupari poterit.

Merasus.



CETERVM *Macedonica cerasus per Pannonias et Austriam in agrorum et vinetorum marginibus frequentissima est, raro ad trium cubitorum altitudinem accedens; nihil in reliquis à vulgari, quæ acerbum & rubrum fert fructum differens, cum & flores, fructum, atque folia similia habeat.*

*Cerasus macedonica.*

INVENIUNTUR porro in his regionibus alij frutices qui ad *Cerasi* genera referendi videntur: quemadmodum is qui à nonnullis *Mahaleb* vocatur, flore odorato, in scopulis & saxosis locis nascens Pannonia & collum urbi *Viennensi* vicinorum radicibus, à rusticis eam ob causam *Stein Weppel* appellatus. *Cerasus* item anium aut *Cerasus racemosa* vulgo herbariorum nuncupata in harum provinciarum silvis frequens: Germani *Elepen* oder *Elxen* dicunt, Ungari *Zelnice* fa.

*Mahaleb.*

*Cerasus anium.*

De *Pruno* vulgo *Myrobalano* nuncupata.

## CAP. XXV.

FACILE adolescit hæc arbor, & in vastam excrescit amplitudinem, maiorēque eius rami subinde in alios divisi, opacam admodum præbent umbram: caudex multo leniore latiorēque cortice præditus est, quàm reliqua prunorum genera: & tenuiores rami graciles admodum sunt, tenerrimoq; cortice vestiuntur: folia media quodammodo inter *Prunum* & *Cerasum*, tenera, per ambitum serrata: flos candidus, tenuior quàm in vulgari: fructus, cuius alternis præsertim annis feracissima est, rotundus, oblongo, tenuique pediculo inter folia propendens, aspectu incundus, per initia vires, cum maturefcere incipit rubet; maturitatem adeptus, purpure nigro intermixta nitet, carne succulenta, & palato grata, nucleis non admodum magnus.

*Prunus cognominata Myrobalanus.*

Floret cum aliis eius generis nouo vere: sub finem Iulij &

*Iulij & Augusti suam maturitatē fructus adipiscitur.*

NONDUM adhuc vulgaris est admodum; sed qui habent, ex Cæsarei Palatii horto habent, ubi omnium primas conspexi eius arbores tres ingētes, unde primum eò delatas, incertum: nonnulli ex Constantinopoli, alij ex Gallia genus duxisse arbitrantur.

## DE EUONYMO.

### CAP. XXVI.

NON minus familiaris est uniuersa Pannonia Euonymus vulgo dictus, quàm reliquis prouinciis: alit tamen etiam quadam alia eius genera nusquam alibi mihi obseruata.

Euonymus  
latifolius.

1. VIRGAS habet Primum cubitales, virides, fractu contumaces, rotundas, quas magna ambiunt folia, bina semper ex aduerso nascentia, leuiter per oras serrata, Euonymi vulgaris folijs forma haud absimilia, sed longè ampliora, Citria mali folijs magnitudine non cedentia, minus tamen longa, viridia, gustu ingrato & amaro: nec flores, nec fructum obseruare licuit: radix digitalis crassitudinis summa tellure in bicubitalem longitudinem excurrit, multisque flauescens fibris donata est, summo capite, interdum etiam è media sui parte virgas singulis annis proferens, quas hieme corrumpi & interire existimabamus: etenim non nisi nouellas virgas deprehendimus Maiomense 1579. in silua illa qua ex Grebén Ill<sup>re</sup> Dn. Balthasaris de Batthyán arce descensus est versus Warasdinum in ea Pannonia parte, qua olim Interamnis appellabatur, nunc autem Slauonia nomen obtinet, Germani Windischeland vocant, ultra Drauum flumen, quo solum loco obseruauimus. Postea tamen comperi eas virgas hieme non interire, sed exiguum admodum incrementum capeßere, folia sub finem

autumni



autumni cum reliquis eius generis abiicientes, & oblongam gemmam extrema cuspide (speciem proxima nouo vere germinationis) proferentes: duas enim quas tum temporis mecum detuli adhuc alii in cultissimo suo horto C. V. D. Ioan. Aicholzii Viennensis medicus, veteri amicitia mihi coniunctus.

I I.  
Euonymus  
alter.

RAMIS Alterum assurgit bicubitalibus aut maioribus, digitali vel etiam pollicari crassitie, lentis & obsequiosis, densò cortice obductis, viridi primum, deinde multis nigricantibus tuberculis aspero, qui in summo diuiduntur in plures ramulos ordine & serie quadam inter se oppositos, foliis similiter ex aduerso sitis exornatos, Myrti latifolia paribus, sed tenerioribus, leuiterq. in ambitu crenatis, gustu primum exsiccante, deinde amarinsculo & calido: ex quorum sinu in oblongis gracilibusque pedunculis flosculus vnus, bini, aut ad summum terni dependent splendentes, & purpurascentes, quatuor foliis constantes, umbilico quadrato, & staminulis luteis quatuor angulos occupantibus, Cotini vulgo crediti flori haud multum forma absimiles, licet maiores: fructus succedit in siliquis quadrangulis, alterius Euonymi similibus, spongiosus, aurei coloris, iis dehiscentibus tenui filo propendens, in quo grana non rubra, uti in alio, sed nigra, Fraxinella granorum amula, & splendentia, bina interdum & terna eodem loculo & pulpa comprehensa.

Copiosè nascitur in siluosis utriusque Pannoniæ montibus: sed qui Alpes attingunt, id alere desinunt. Inuenitur & in Moravia: nusquam verò abundantius quam in silua arcis Greytzenstein fll<sup>is</sup> Comitum Nicolai de Salmis vicina, secundo à Vienna miliari ad laeuam Danubij ripam. Floret Maio: fructus Augusto & Septembri maturescit.

ΕΥΩΝΥΜΟΣ



Εὐώνυμον Græcis, Euonymus etiam Latinis dicitur hic frutex: qui si in eam proceritatem assurgeret, quam illi tribuit Theophrastus, non minus fortè descriptioni conueniret quàm vulgaris.

PORRO vulgarem Euonymum in Pannonia à capris maximè appeti, & eius foliis auide sine noxa vesci didici, eamque ob causam ab Vngaris kechke rago fa, id est, capraria arbor nuncupatur: licet id Theophrasti opinioni repugnet, qui Euonymi folia capris præcipuè mortifera esse scribit.

Euonymus vulgaris.

CETERVM quoniam in Cotini mentionem incidimus, non abs re erit de eo nonnihil hoc loco differere: quandoquidem mōtibius quibusdam non procul Vienna dissitis familiaris est, eoque ad densanda coria, Rhois loco indigena utantur: quinetiam Rhois vulgare nomen indiderunt.

Cotinus.

Meminit breuiter Cotini Plinius lib. 16. cap. 18. his verbis: Est & in Apēnino frutex qui vocatur Cotinus, ad lineamenta modo, conchylij colore insignis. Ex quibus sanè nemo facile colligat, an ei stirpi que apud Herbariorum vulgus tale nomen obtinuit, Cotini appellatio rectè applicata sit.

Libro autem 13. cap. 23. Coggygriam describit in hunc modum: Similis & Coggygia folio [vnedoni videlicet] magnitudine minor. Proprietatem habet fructum amittendi lanugine (pappum vocant) quod nulli alij arborum generi euenit. Quæ sanè plurimas notas habet nostra huic stirpi conuenientes.

Coggygia Plinij.

Plinius autè eo loco ad verbum fere exprimit Theophrasti κοκκυμιλέαν lib. 3. cap. 16. descriptā. ὁμοιον δ' ἐστὶ τέτοις τὸ φύλλον καὶ τὸ κοκκυμιλέας. τὸ δ' ἐνδρον μικρόν. ἴδιον δ' ἔχει καὶ τὸ ἐκπαπποῦσθαι τὸν καρπὸν. τὴν γὰρ οὐδ' ἐφ' ἐνός

κοκκυμιλέας.

G

ἀκηκόεμιν



ἀκκὺν αὐτὸν ἀλλὰ δένδρον, ut vulgata habent exemplaria: at κοκκυρία legisse videtur, non κοκκυμνείας, quam Gaza prunum interpretatus est, cum tamen animaduvertere potuisset eundem Theophrastum aliam κοκκυμνείαν, hoc est prunum ab hac planè diversam lib. 4. cap. 3. describere.

Itaque libenter assentior doctissimo Ruellio, qui κοκκυμνείας vocem priore loco corruptam esse censet, & κοκομνείας legendum esse suspicatur: etenim νηλεία apud κοκομνείας Theophrastum etiam significat Uncdonem, cuius foliis, folia fruticis quem describit comparat. Aptius igitur meo iudicio hanc stirpem Cocconelesiam cum Ruellio, aut Coggygriam (si quis vulgatam Plinij lectionem sequi malit) appellabimus, quam Cotinum: cum κίτυν & Theophrasto & Dioscoridi oleaster sit.

BICUBITALIBVS verò aut tricubitalib. constat virgis digitalis crassitudinis, nigricantibus, in numerosos subrubentes ramos diuisis: folia firma densa, nervosa, terebinthinis foliis propemodum paria, latiora tamen & mucrone ferme orbiculato, oblongis subrubentibusque pediculis nitentia tenuiores ramulos ambiunt, odore quodammodo lentiscino, gustuque adstringente, non inuicundo tamen: ea sub finem aetatis rubescunt, elegantissimoque nitore oculos oblectant: emicat è summis ramulis quadam veluti vna multorum flosculorum ex herbido pallefcentium, exilibus, longisque, & punican-  
κοκομνείας  
hystoria.

Crescit sponte in monte Badenfibus thermis imminenti, paulo supra vineta, vicinisque quibusdam mon-

tanis locis, ubi interdum adeò pumilam erui, ut vix cubitalem amplitudinem attingeret. Olim etiam legere meminidum Auenione per Arausiorũ agrum & Boul-line ad Montelimar proficiscerer, Valentiam Allobrogum & Gratianopolim petiturus. Floret hĩc Maio. Fructus maturefcit Julio & Augufto.

DE SALICE ANGVSTIFOLIA PANNONICA. CAP. XXVII.

NON minus ferax eſt ſuperior Pannonia in Salicum, quàm variarum aliarum arborum generibus alendis: etenim omnes ea Salices in ipſa inveniuntur, quas in reliquis prouinciis videre memini.

salix angustifolia.

HABET verò peculiare quoddam genus, iuxta torrentes & vdis locis nascent crasso candice, & ramis in multo tenuiores frequentiorẽsque ramulos diuisis præditum quàm vulgaris ea salix quæ foliis aliqui angustis prona parte incanis eſt: eius præterea folia licet subtus canentia, supernè cum virore alba quadam lanugine pubescunt, angustiora sunt, in longiorem mucronem desinunt, frequentioraque in ramulis nascuntur: flores aliis generibus similes, pallidi, semènque minutissimum, nigrum, candida mollique lanugine exceptum, lenis aure arbitrio huc illuc fertur. Solet etiam hæc Salix alia quadam nota à ceteris distinguì, quòd plerunque tuberculis quibusdam subrubentibus baphico cocco fere similibus, folia onerata habere conspiciatur. Vienna torrentis, qui sub Vienna vrbe in Danubium influit, ea maxime abundat.

viscum salignum.

PORRO in insula Danubij quæ è regione Posonij eſt, altissimas & crassissimas salices videre memini maxima pragrantiũ Visci fruticum copia onustas. Audio etiam circa eandem urbem & in Castaneis arboribus,

& co-



& coryli rosarúmque fruticibus viscum nasci, referente ornatiss. viro Andrea Hemal cuius urbis pharmacopœo.

Ungari salicem latifoliam aquaticam Re köttye fa, vulgarem luteam sine pallidam Saâr fiz, rubram fiz fa, amerinam ex qua corbes fiunt, kötö fiz.

## DE SALICE PVMILA.

## CAP. XXVIII.


MONTIVM herbosa & aperta iuga pumilus alit, qua tribus generibus discernuntur. Nam

I. PRIMVM virgas habet minimi digiti crassitie, humi fusas, pedales, interdum etiam maiores, frequentibus ramulis pradtas, qui sursum attolluntur, & inter gramina emergunt uncialibus fere foliis obsiti, superne viridibus, & splendentibus, inferne subcinereis & quodammodo canescentibus, nõ multũ ab similibus Uitis idæa 11. foliis: ea in tenellis ramulis strobilorum molles spicas fert, quibus succedunt capitula uti in maiore salice, qua maturata dehiscunt Augusto, mollénzque lanuginem fundunt, quæ pusilla nigra grana excipiuntur: radix admodum crassa, pro planta tenuitate, crassisque fibris obliquè sparsis firmata est.

II. ALTERVM similes fundit virgas, humi etiam fusas, nonnunquam paulo longiores, magis scabro cortice tectas, & in frequentiores ramulos densas, quas similia cum superiore ambiunt folia, paulo tamen magis mucronata, superne viridia, inferne splendentia, licet tenui lanugine pubescant. Huius florum spica, sine iulus, crassior est, illi fere similis qui in eo salicis genere nascitur, quod Eleagnum Theophrasti censent: radix cum superiore convenit, imò crassior quodammodo videtur, non minus quàm illa dispersa, virgis etiam, secundum radicis caput, interdum fibras agentibus.

TER-







**TERTIO** generi graciliores sunt virga, pedales, **III.**  
 nonnunquam dodrantes duntaxat, recta, lenta, sub-  
 flavo cortice tecta: uncialia folia, sed satini lini foliorum Salix pumila angustifolia prior.  
 modo angusta, supina parte virentia, prona verò cine-  
 rea, & cum adhuc novella sunt omnino cana: flos ut in  
 vulgari flavesceus, exigua & brevis mollique spica ante  
 folia nascens, qui deinde in candidam lanuginem resol-  
 vitur: radix digitali crassitie, obliqua, nigra, & tenui-  
 bus fibris donata.

**INVENITUR** porro in Pannonia & Austria qui- **IIII.**  
 busdā depressis caduis silvis et uliginosis pratis, Quar- Salix pumila angustifolia alba.  
 tum quoddam genus, gracilibus & cubitalibus inter-  
 dum virgis assurgens, non minus quàm in superiore len-  
 tis, quæ a medio ad summum ramulorum, multas ferunt  
 exiguas florum spicas, molles & incanas, maturitate in  
 papposam lanuginem abeuntes: folia superiore breviora  
 & angustiora, supernè virentia, infernè cana lanugine  
 pubescentia, & splendentia: radix superiore non minus  
 crassa, & tenuibus fibris prædita: sed & virgulta se-  
 cundum summum radices caput, quæ telluri coherent,  
 tennes & capillatas fibras agunt.

## DE SPINA INFECTORIA PUMILA.

### CAP. XXIX.

**SPINA** infectoria, quæ & Rhamnus solutivus à Rhamnus so-  
lutiivus.  
 Recentioribus nuncupatur, multis Pannonia locis vul-  
 gatissima est, ubi interdum arboream amplitudinem  
 adipiscitur. De ea nobis non est sermo: sed de aliis duo-  
 bus fruticibus, qui admodum illi adfines esse videntur.

**PRIOR** bicubitalibus assurgit ramis, in multas a- **I.**  
 las divisus, cortice levis, Spinaeq. infectoria vulgari tum Spina infect.  
prior.  
 colore, tum substantia simili tectis, qui membrana su-  
 periore demta, ex viridi pallefcit, et sapore est amariss-  
 culo:



culo: ramuli paucis spinis horrent, sed ipsi in spinas plerumque desinere solent: folia illi vulgari fere similia, sed minora & angustiora, ad Pruni silvestris folia plurimum accedentia, gustu linguam exsiccante: flos congestus ut in vulgari, eiusdemque coloris & forma, hoc est ex pallido herbaceus, & quatuor foliolis constans, minor tamen: radix ut in aliis fruticibus lignosa.

Exit frequens cum vulgari in Leytenberg: floret Maio.

CYBITALES habet alter ramos, minimi interdum digiti crassitudine, plerumque minores, nigro rugosoque cortice obductos, superiore parte in ramulos divisos, qui tenuiore lauioreque cortice tecti, plerumque in acutam spinam desinunt: folia Myrti, aut Pruni silvestris potius, breviora tamen & minora, viridia, per ambitum nonnihil serrata, gustu primum adstringente, deinde non nihil amaricante: flores inter folia herbacei, quatuor foliolis constantes ut in priore: fructus deinde Spinae insectoriae vulgari haud absimilis, binis, nonnunquam etiam ternis veluti commissuris distinctus, initio viridis, deinde per maturitatem niger: radix crassa, lignosa, dura, raras fibras in latera spargens.

II.  
Spina insect.  
litera.

Nascitur copiose in monte Badensibus thermis imminente, & vicinis ingis loco petroso & salebroso.

Floret Maio: fructus Iulio maturescit.

SPINAM insectoriam pumilam hos frutices appellavi, quod vulgari plurimum respondeant, licet minores sint. Si quis tamen Lycii generibus citius annumerandas censeat, non refragabor. Vulgare nomen nullum intellexi. Et haud scio an aliquo in usu sint apud eorum locorum, in quibus nascuntur, accolae.

Lycium.

DE RO-



## DE ROSA.

## CAP. XXX.

*ÆQUE varia conspiciantur Rosarum genera in Austria hortis, ac in plerisque aliis Provinciis. Duo tamen istic aluntur quæ alias videre non memini. Sunt & siluestria quoque genera, antea mihi non conspecta: de quibus omnibus suo ordine.*

*MULTIS statim à radice assurgit Prima virgis, hu-* I.  
*manam altitudinē plerumq. æquatibus, laevibus, & sine* Rosa sine spi-  
*spinis, viridibus, in varios ramos diductis: folia in alas* nis.  
*dimissa, terna aut quina vni costæ (quæ nonnihil aspera*  
*est) inherentia, bina semper inter se opposita, postremo*  
*impari, satis ampla, atro virore supernè nitentia, infer-*  
*nè canescentia: extremis ramis insident flores in oblongis*  
*hirsutisq. pediculis, multiplici foliorū textura cōstantes,*  
*Prænestinis maiores, medijs inter illas & rubras coloris,*  
*odorisque incundi: fructus brevis, crassus, orbicularis*  
*fere, maturitate rubens, inæqualia grana lanugine in-*  
*noluta continens: radix dura, lignosa uti aliarum, &*  
*plerumque sub terra propagines ad latera fundens.*

*Hanc acceptam ferant studiosi C.V.D. Ioanni Schro-*  
*tero Ienensis Academiæ in Thuringia Primati &*  
*Ill<sup>mo</sup> Ducum Saxonie, Landgraviorum Thuring-*  
*ie, & Principum Coburgensium Medico, qui ab Ill<sup>ma</sup>*  
*Principe Comite de Mansfeld eam nactus, liberaliter*  
*mihi Viennam usque misit 1576. Eloret Iunio.*

*2. Aliud genus inuenitur virgis non admodum diffi-*  
*milibus, quæ minores & rariore filiorum textura con-*  
*stantes flores profert, colore fere secum vini rubri.*

*PARI propemodum Altera est magnitudine: raro* II.  
*tamen duorum cubitorum altitudinē superat, frequen-* Rosacinamo-  
*tibus verò breuibûsque ramis donata est purpurascen-* mea pleno  
flore.  
*tibus, qui*





tibus, qui raris & breuib; spinis armati sunt: foliorum ala similes illis quæ in Rosa vulgo Canella cognominata, hoc est ex quinis aut septenis foliis æquali inter se spatio distantibus constantes, uno hinc altero inde geniculatim coniugatimque semper adherente, unòque in cacumen excurrente, colore superna parte viridi, inferna verò candicante: flores vulgari Cinamomea Rosa similes, sed maiores, & multiplici foliorum glomeratione constantes, uti alba & prænestina, minores tamen, odore qualis in alba rosa fere est: fructum nondum videre licuit, tamen multis annis iam alamus: huius radix latè admodum serpit, vinaxque est, & subinde nouas virgas producit.

Vnde primùm Viennam allata sit, pleriq. dubitant: nonnulli tamen ex Tyrolensi Comitatu originem ducere existimant. Nunc in omnibus Casarcis hortis, quorundamque Principum virorum, Nobiliorumque matronarum, & aliorum nonnullorum qui herbaria rei studio oblectantur, aliter. Frequentiorè tamen nusquam vidi quàm Cassellis in amœnissimo cultissimòque horto Ill<sup>mi</sup> Principis Wilhelmi Landgrauij Hassiæ &c. & apud Generosos Dominos Adolphum Hermannum & Georgium Ridesel zu Eysenpach.

## III.

Rosa campestris odora.

TERTIA aliquot virgis assurgit cubitalibus, aut ad summum, rarissimè tamen, bicubitalibus, firmis, duris, lignosis, colore rubescente, densissimo spinarum vallo munitis, ex quibus frequentes confuso ordine oriuntur spinosi ramuli, virides, singuli suum florem sustinentes, album, odoratum, quinque foliorum simplici textura constantem, lutea aut canella rosa vulgaris aequalem, capillaceis quibusdam staminibus cum suis apicibus luteis medium floris umbilicum occupantibus: fructus rotundus, brevis, primùm viridis, per maturitatem verò niger,



niger, crassa, angulosa, candida, dura semina continet: folia sunt inter lutea, & eius quæ ab aggeribus in quibus sponte provenit, siue à Pimpinella foliorum similitudine nomen apud Belgas accepit, folia, fere media, per ambitum serrata, & minimè splendentia: radix lignosa, dura, in diuersa tendens.

Inuenitur multis circa Viennæ locis, præsertim editioribus & montosis. Floret Maio, quo tempore rustica mulieres plurimos eius fasciculos venales in forum deferunt, ob odoris gratiam. Fructus Augusto maturescit.

PEDALES atque etiam aliquando cubitales ex eadem radice profert Quarta virgas, virides, lentas, infernè paucis, supernè multis spinis rigentes: foliorum alas rubra rosa similimas, septem aut quinque foliis supernè viridibus, prona parte candicantibus constantes: summis virgis & ramulis innascuntur calyces satis magni, hirsuti barbatique uti rosarum rubrarum simplici foliorum ordine constantium, ex quibus deinde sese explicant magna, non omnino odoris expertes rosa, quinque foliis prædita, initio rubra, deinde paulatim remittente & evanescente quasi rubore, coloris fere carnei, multis staminibus luteis, floris umbilicum, quemadmodum in aliis rosis, occupantibus: fructus ruber, rotundus, omnium maximus & pyriformis, pulpa fulvescente, inæqualia semina alba continet.

Nascitur passim in silvis caduis, aliarum silvarum marginibus, agrisq. sublimioribus, & desertis per Austriam inferiorem & uniuersam Pannoniam. Floret Junio; fructus Augusto maturescit, & plerumque tota hieme ipsi planta inhaeret.

Non inèptè meo quidem iudicio, χαμαιψίδον græcè vocabitur quartum genus, Latinis rosa pumila: Au-



Striaci Erdt rosen bnd Hepdrosen/ Ungari verò Par-  
ragi rosa appellant.

## DE RUBO SAXATILI ALPINO.

## CAP. XXXI.

PEDALEM non superat altitudinem, seretibus <sup>Rubi saxatilis</sup>  
viticulis subrubentibusque & hirsutis, in quibus bi- <sup>historia.</sup>  
na aut terna folia, Rubi quem vulgo Ideum vocant fere  
similia, hoc est, terna simul ex eodē pediculo nascētia, at-  
tamen minimè hirsuta, licet rugosa, nullisque spinis hor-  
rentia, sapore admodum exsiccante & adstringente,  
deinde amariusculo: in summis viticulis, et supremis ea-  
rum alis flores fert, deinde fructus rubi, minores, hoc est,  
minore acinorum numero constantes: etenim binos tan-  
tūm, ternos, quaternos, aut ad summum quinos acinos  
habent, sed longè maiores quàm in ullo alio ruborum  
genere, omnino rubentes, & adeo succi plenos, ut quo-  
dammodo transpareant, sapore acido & palato gratissi-  
mo: continent isti acini singuli singula grana, alba, ru-  
gosa, inaequalia, gustu adstringente: radix longè lateq;  
serpit, & interdum longas viticulas humi sparsas, &  
procumbentes producit, quæ subinde radices agunt.

Abunde provenit in saxosis collibus Neuberger mo-  
nasterio imminentibus. Crescit & in aliis scopulis: sed  
non in summis iugis, verū in montium declinibus dun-  
taxat. Augusto fructu suo maturo onustum collegi.

RUBUM saxatilem appellant, quòd aprius nomen  
non succurreret, & in solis saxosis locis inuenerim. Ru-  
stici Steinber/ id est, petraeas baccas nuncupant. χαμαί- χαμαί-  
Cát & Theophrasti non ineptè meo iudicio dici posset, <sup>Humirubus.</sup>  
quem Gaza Humirubum interpretatur. Quanquam  
proximè ad Chamabaton etiam accedat humilis ille ru-  
bus, qui plerisque Belgica locis siluosis & agrorum in-



terdum marginibus nascitur, baccis siue moris succulentis paucis, exiguis acinis constantibus, modò nigris, modò ceruleis, palato admodum gratis. Occupat etiam ille multos Austria & Pannoniæ agros, & Ungaris dicitur Zedöry.

Notus autem Gesnero etiam fuit quem hoc capite descripsi *Rubus*, eumq. *Idæum* appellat in descriptione Montis fracti. *Rubus idæus*, inquit, fructu rubi fere, absque ullis spinis, humilis planta, lignosa radice, foliis rubi vel fragi, acinis binis, ternis, aut singulis in uno fructu, acido sapore, in saxo. Meminit & in epistolis: & Simlerus in Commentario de Alpibus ad calcem.

*Rubus idæus*  
Gesneri.

SIMILEM planè suis baccis onustum, eodémque nomine apud montanos pastores insignitum ex Silesia usque montanis scopulis erutum ad me misit Achilles Cromerus anno 1580. quem copiosè ad metallicas fodinas Zuckmantel nasci postea scripsit.

CETERVM alius est *Rubus*, quem Germani *Hinber*/ Galli *Framboisier* appellant, baccis siue moris rubris, non modò saporis, sed etiam odoris gratia commendatis: eum omnes peritiores *Idæum* esse existimant, de quo Dioscorides lib. 4: & Plinius lib. 16. cap. 27. & lib. 24. cap. 14. Nascitur etiam is sponte plurimis Pannonia locis.

*Rubus idæus*  
Diosc.

## DE CHAMÆMORO.

### CAP. XXXII.

INTER mites *Rubos* etiam recensenda est hac elegans plāta, cuius iconem & descriptionem nobis communicavit C. V. Thomas Pennæus suprā memoratus, eiūque *Chamæmorum* appellare placuit.

DODRANTALIBVS autem pradita est viticulis, in quibus alternatim tria, quatuor, rarius quinque nascuntur

*Chamæmori*  
historia.



*nascentur folia scabra, malua, vel potius mori* [nouellæ videlicet & primùm semine natæ] *foliis non ualde dissimilia* [malum cum Ribes vulgaris foliis cōferre] *in quinque precipuas partes diuisa & per amb. tum serrata, lōgis pediculis innixa, qui ex binis alis sive apophysibus cauliculum amplectentibus exeunt. Summum caulem exornat flos unicus quinque foliolis ex nigro purpurascens constans. Fructus mori fructui* [rubi vulgaris potius] *similimus (unde nomen) sed paulo minor, primùm albicans & acerbus, postea ruber, ex acerbodulcis: radix utcunque nodosa, ex singulis nodis paucas fibras spargens, mire se propagans, & quam longissimè serpens, adeo ut breui tempore maximum spatium occupet. Floret Junio & Iulij initio: fructus Augusta maturus est.*


*Niuosa & aperta loca amat, summōsque montes, & magna copia inter Ericas prouenit monte Ingleborrow totius Angliæ celsissimo, duodecim miliaribus à Lancasteria.*

ANGLI Knotberries appellant, hoc est, nodosam baccam, à fructu nodis simili. Gustu adstringit, exsiccatur, & refrigerat.

QVONIAM verò in Ribes mentionē incidimus, alunt *Austriaca & Styriaca aipes eius quoddā genus nihil, vel quam minimum à vulgari differens, fructu tamen non acido, sed dulci. Est præterea secundum genus amplioribus foliis & maiore fructu quàm sit vulgaris, licet eiusdem saporis, cuius flos etiam variat: nā qui in vulgari herbaceus est, in hoc eleganter rubet, & punicat. An huic similis sit quam c. v. Joannes Boissot alit in horto Bruxellis, ignoro. Vulgarem Ungari aproten-gōri zölö, id est, minorem uiam marinam vocant.*

Ribes fructu  
dulci

Ribes rubro  
floro.





FREQUENTISSIMVS & per has provincias Berberis  
est frutex ille spinosus vulgo Berberis dictus: Ungaris  
Iröm barbara, hoc est Vinum barbarum. floret Maio.

## DE AVELLANA PVMILA BYZANTINA.

## CAP. XXXIII.

ACCEPIT Constantinopoli hoc anno 1582. mense  
Octobri una cum varij generis bulbaceis stirpibus  
Mag<sup>us</sup> ac Generosus Dn. David Ungnad, Baro in  
Zonneck, & Consilij bellici in Austria Præses, Auella-  
na quoddam genus rarum admodum & peregrinum,  
quod Turcarum Imperatori ejusque Proceribus in de-  
liciis esse asserit.

Eius porro fruticem supra cubitalem altitudinem ra-  
rò excrecere, sed pumilū semper persistere refert: cras-  
sos verò admodum, magnosque fert in tenuibus pedicu-  
lis calyces, extrema parte in multas crassas longasque  
lacinias divisos, sede etiam multis laciniatis appendici-  
bus obsita: sunt autem ij calyces foris valde dura aspe-  
raque lanugine hirsuti, interiore parte laeves, continent-  
que fructum Auellana siluestri & sponte nascenti fere  
similem, breuiorem tamen, duròque putamine, ut illa,  
constantem: qualis verò sit qui in eo continetur nucleus,  
indicare nequeo, cum unicum duntaxat fructum (de  
paucis quos adserendum retinuit) mihi dederit, eam-  
que ob causam cōfringere noluerim, sed ut suis coloribus  
depingi curarem, & illius qualemcumque historiam  
describere possem, seruauerim. Quam ad huius libri  
calcem reieci, quòd suo loco minime inseri potuerit.  
Hunc verò fructum, una cum suo calyce serendum esse  
cum mihi eum daret, admonuit.

Auellanae ele-  
gans & rara  
Genus.

# CAROLI CLVSII

## RARIORVM STIRPIVM

PER PANNONIAS

obſeruatarum Hiſtorix

LIBER SECVNDVS.



**A**VBLEOSIS ſecundum noſtra Pan-  
nonicarum ſtirpium hiſtoria librũ au-  
ſpicari volui, vt cum ordinem, quem  
in Hiſpanicis obſervationibus tenui,  
ſequerer. Verũ per pauca admodum  
ſeſe obtulerunt, quas alibi antè non vi-  
derim: omnes tamen percurram, earum quæ ab aliis ob-  
ſeruata non ſunt, paulo exactiorem deſcriptionem da-  
turus: iis quæ nonnullas alias ſelectiſſimas adiiciam, quæ  
aut bulbis aliunde miſſis, aut ſemine ab amicis accepto  
prognata, mihi Vienna Aſtria floruerunt.

Primum autem locum obtinebunt Liliacei generis  
planta, ob magnitudinem, & ſorum elegantiam.

DE TVSAI SIVE LILIO PERSICO.

CAP. I.

**C**AULE aſſurgit interdum bicubitali, aut am-  
pliore, firmo, craſſo, intus fungoſo, viridi, rotundo  
quidem, ſed ad cubiti altitudinem ſtriato, multiſque  
liliaceis fere foliis, nunc aequaliter, nunc confuſo ordi-  
ne cum ambientibus exornato, eleganti virore ſplenden-  
tibus, odore ſætido, & quaſi hircino nares procul etiam  
ferientibus: idem ille deinde caulis, pedalis, nonnũquam  
etiam cubitali, ſupra folia emicat amplitudine, nudus,  
& ſine foliis, neque ſtriatuſ & viridis, ſed leuiſ & colo-  
re quaſi



re quasi purpurascens, qui tamen in summo totidem fere in angulos definit, quot flores sustinebit, nempe binos, ternos, quaternos, quinos, senos, aut plures, omnes verò quasi aequaliter, sed contrario situ nascentes, singulosque inter bina folia, inferioribus longè minora & angustiora, aequali propemodum longitudine propèdentes elegantissimo spectaculo: supra flores caulis denuo attollitur dodrantali aut maiore amplitudine, foliis exilibus & angustis onustus. Habui autem anno 1580. plantam quæ undecim flores tulit, cuius caulis supra septenos aequaliter propendentes, denuo nudus quasi dodrantali longitudine, reliquos flores singulos inter bina folia nascentes protulit, longa densa & multifida alia foliorum coma supra eos fusâ. Habuit & Matrona quadam Patricia Viennensis, cuius caulis supra terram planus pedali lōgitudine extabat, deinde in binos fidebatur ramos aequali longitudine excrecentes, singulos undenis floribus onustos, magna etiam supra eos fusâ foliorum coma. At quæ eodem anno Ill<sup>mo</sup> Principi Wilhelmo Hassia Landgrauio floruit, reliquas florum numero superauit, quos supra quadragenos in plano caule tulit, latissima supra eos luxuriante coma. Sed & intelligo ab his qui aliquot annis Constantinopoli haeserūt, caulem nonnunquam supra priores illos flores aequaliter propendentes dodrantali longitudine extare, aliūque florum ordinem gestare, & interdum etiam tertium, ac tum demum foliorum comam supereminentem. Porro cum flores primū erumpunt, inter folia latent, candidantesque sunt, deinde paulatim augeſcunt, una etiam succrescente ea caulis, quæ eos sustinet, nuda parte: in augmento verò florum pediculi deorsum inflectuntur, et ipsi flores palleſcere incipiunt, venis tamen purpureis secundum foliorū (quæ sex sunt, lata, & per extremum

MICRONA-

uncronata) longitudinem & latera excurrentibus, ungue autem singulorum foliorum nonnihil eminente & ex nigro purpurascante. Flos maturitatem aut perfectionem iam adeptus, expanditur, tintinnabuli modo propendens, colore fere aurei mali, sed pallidior, venis illis purpureis summam venustatem adferentibus: singula florum folia interiore parte in ipsis unguibus, singularibus tuberculis candidis prædita sunt, quæ sole etiam meridiano limpidissimam dulcemque aquam exstillant lacrymarum modo, ut uniones propendentes videantur, sed abundantius pluvio tempore: ea deinde tubercula marcescentibus floribus in lacunas abeunt albas. Ex medio flore sex candida stamina cum apicibus pallescentibus prominent, breviori trifido stilo inter ea latitante. Flori succedunt magna trigonæque, interdum etiam tetragona capita, uti in Lilio rubro, à nonnullis Martagon appellato, quorum singuli anguli utrinque pinnati sunt, & alati: statim vero excusso flore sursum eriguntur ea quæ fecunda futura sunt capita, magna Dei omnium rerum Conditoris providentia, ne dehiscantibus illis semina ante maturitatem excidant: sunt verò ea plana, liliacea, oblongiora paulo, cartilaginea, sub-rufa, duplici serie in singulis angulis digesta, quæ admodum in Tulipis, Lily generibus, congeneribusque plantis. Radix bulbosa est, crassa, ex squammis orbiculatis fere, magnis & succulentis compacta, colore interdum albo, nonnunquam etiam purpurascante, plerumque verò pallido, odore admodum foetido, hircum, uti folia, olente.

2 Aliud genus est, quod nec caule, nec foliis, nec florum forma ab eo differt: nam & illos in extrema laevis & nudi caulis parte sustinet aequaliter fere in ambitu nascentes, singulosque inter bina angusta folia, uti superius.

Tufas et. dis-  
ferentia.



perius. sed color variat: nam qui in alio luteus est, sine aari amulus, huic potius rubet, aut sandaraca sandicisve colorem refert. foliis etiam sex constat latis & mucronatis, unguibusque ex purpura nigricantibus cum suis interiore parte candidis tuberculis limp: dum rorem exstillantibus, stiloque & sex staminibus, quae tamen aequali longitudine propendunt.

3 Variat item in nonnullis plantis color floris: nam aut Tusfai rra. diff. ferentia. medius est inter utrumq. genus, aut ad prioris secundine colorem proximius accedit.

Floret Aprili, interdum etiam Martio, si aëris temperies paulo calidior fuerit, una cum praecocibus Tulipis, atque etiam maturius.

Nusquam verò sponte nascentem hanc plantam conspexi: sed Constantinopoli delatam, primus Belgica hortis communicavi: & in Viennensibus reposita feliciter proxenit. Ante meum tamen ex Belgica discessum, iconem eius, (qualem D. Dodonaeus in Purgantium historia appendice exhibuit) Dn. Ioanni Brancioni miserrat D. Alphonsus Pancius Ferrariensis medicus utriusque nostrum amicissimus.

HACTENUS nullam plantam observare memini, quae Hemerocallis Diosc. exactius Hemerocallide Dioscoridi descriptam referat, quam hac, meo quidē iudicio. Studiosi conferant & sententiā ferant. Pancius iconē misit corona Imperialis nomine. Corona Imperialis. Constantinopoli verò bulbi aut missi aut delati sunt à Caesareis oratoribus, nunc Tuyschiachi, nunc Tusfai, Tuyschiachi. nunc Tonsai (ita enim pronunciandum est veluti u germanicum, & elevatione vocis in ultima) appellatione, interdum etiam Tursani & Tursanda: sed postrema Tursani. illa duo vocabula à Turcis duntaxat aduci solent nominibus, ad magnitudinem rei, cui adiecta sunt, exprimendam: exempli gratia, Cavala lalé tursanda, id est, Tulipa





*Tulipa* [serotina videlicet] magno & amplo flore: ita *Turfani* aut *Turfanda* simpliciter, quasi de magnis & amplis.

Ex Persia verò Constantinopolim primum delatos illius bulbos omnino mihi persuadeo, quoniam cum eos accepi, una inter reliquas fuit inscriptio, *Tulai*, fior Persiano rosso ò discolorito con la testa a basso, hoc est, *Tusai*, flos Persicus ruber aut decolor, capite propendente.

*Tulai* fior  
Persiano.

CETERVM an apud eos aliquem medicum usum obtineat, non intelléxi: arbitror tamen magis venustatis & elegantie causa eos hanc plantam in suis hortis alere, quam ob ullas eius facultates. Sunt etenim Turce omnium elegantium florum, etiam nullo odore præditorum, studiosissimi: nec ullis sumtibus parcunt, ut eos undiquaque conquirant.

DIOSCORIDES verò sua *Heemerocallidi* has facultates tribuit: radix pota, aut cum melle & lana in pessa apposita aquam educit & sanguinem. folia trita mammarum inflammationes à partu contractas, oculorumque collectiones mitigant: radix et folia igni ambustis utilissime illinuntur.

## DE LILIO SYRIANO.

### CAP. II.

EODEM cum superiore nomine, imò inter ipsius bulbos Constantinopoli missa fuit huius planta bulbosa radix, altero postquam Vienam venissem anno, quam tamen, quoniam ceteris esset candidior, & nullo virulento odore prædita, seorsim terra commisi, diversam à *Tusai* esse ratus: nec mea opinione falsus sum.

Etenim primo subsequente vere, maturè admodum germinare cœpit, tandèmq; caulem protulit cubita-

*Lilij syriaci*  
historia.





lem, rotundum, multis circumscriptum foliis digitalis longitudinis & latitudinis, longè quàm Tusai modò descripti angustioribus, illis fere similibus quæ in summo ipsius capite nascuntur, virentis ex cinereo coloris, siue quodammodo æruginosi, qualis color in Tulipa foliis consp. citur: contorquentur verò ea, buxeique sunt odoris. Florem mihi non protulit: sed paulatim planta contabuit, adeoque est exinanita radix, ut unico folio subsequenter aliquot annis mihi duntaxat prodierit, tandemque omnino perierit. Radix magna est, Tusai æmula, e paucis magnisque orbiculatis fere squammis contexta, sed candidior, oblongior aliquantulum, nulloque (ut iam dixi) tetro aut gravi odore nares feriens.

Pennacio per-  
siano.

PORRO paulo ante meum è Belgica discessum, munere Magnifici Domini Jacobi Contareni Patritij Veneti, miserat ex Italia Dn. Iacobus de Caendenhoue consanguineo suo Dn. Ioanni de Brancion similem omnino bulbum, Pennacio Persiano nomine, qui eo defuncto ad Generosum Dn. Ioannem vander Dilst pari cognitionis vinculo iunctum ex ipsius legato, cum multis aliis rarissimis plantis peruenit. Is anno 1576. bicubitalem aut ampliorè tulit caulem, quinquagenis floribus onustum, senis foliis constantibus, e longis pediculis, qui summum caulem ambiebant propendentibus nolarum ritu, colore purpura obsoleta, & ingrato odore, ut Raphaël de Coxia Regius pictor, qui eodem anno eius iconem summa industria, & artificio à se depictam misit, ad me perscripsit: nullum verò semen tulit: inò ne germinauit quidem subsequente anno, quemadmodum ipsemet Dilstus mihi significauit.

Illius etiam iconem habeo, non. tamen adeo artificiosè depictam, & sine bulbo, cum Lily rubri, siue Martagonis Chalcedonici delineatione, munere doctissimi viri,  
summiq[ue]

*summique omnium Natura miraculorum scrutatoris & admiratoris, Nicolai Rastij Chirurgi regij p. m. qui eam Hyacinthi maioris nomine mihi communicauit anno 1571. dum apud illum Lutetia essem.*

De hac etiam planta ad nos in Belgicam perscripsit Alphonsus Pancius, quando Tusai sine Corona Imperialis picturam misit. Pénacio Persiano è pianta bellissima & è specie di Giglio ò Martagon, diuerso della Corona Imperiale: hoc est, Pennacio Persiano elegantissima est planta è Liliij aut Martagonis generibus, differens à Corona Imperiali.

Illius pauci bulbi inter Tusai bulbos qui Constantinopoli allati fuere anno 1580. inuenti sunt, è quibus unum liberalitate Mag<sup>i</sup> at Generosi Domini de Entzestorf adeptus sum, qui eius iconem præcedente anno miserat. Tusai scheda inscriptum erat Tusai fior Persiano si domanda Pennacio persiano. Illius bulbi florem nondum tulerunt: at meus planè periit. Generosa porro Domina de Heynsstain duos etiam bulbos anno 1581. accepit cum hac appellatione Susamgiule, qui nunc illi egregiè prodeunt. Verisimile est è Susa vrbe Susiana regionis Persidi vicina primum delatam fuisse Constantinopolim hanc stirpem.

## DE LILIO RVBRO; siue miniato

Chalcedonico. CAP. III.

VENUSTA admodum rar. q. est etiam hac planta, cuius folia Liliij foliis similia sunt, breuiora tamen latioraque & in lateribus subhirsuta, confuso ordine caulem amplectentia, qui cubitalis aut maior est, ex viridi purpurascēs, digitali crassitie: flores in summo profert languido collo deorsum propendentes, sex folius conuolutis & reflexis ut in Lilio siluestri, siue Martagone

Lilij miniati  
historia.



*Matthioli constantes, elegantissimo miny, aut cera rubentis colore: è medio flore exeunt sex stamina candidantia, apicibus craceis insignita, stilo inter ea prominente: nullum semen observavi, sed in trigonis capitibus nasci arbitrar, quemadmodum in Lilio & Martagone, planum, nigricans: radix ut plurimum non est adeo magna ut quidam existimant, sed Lily siluestris radicem haud multum superat, coloréque dum recens cruta est, adeo illi persimilis (etenim si diutius extra terram adseruetur purpurea fere tota est, & subinde quibusdam natis saturè rubentibus inspergitur) ut etià in stirpium cognitione admodum exercitati, nisi eas inter se conferant, difficile discernere possint: huius tamen radix è tenuioribus squamis contexta est, nec minus fibris supra & infra, quàm illa donata.*

*Floret Iunio cum Liliis, aut paulo serius.*

*Constantinopoli etiam Viennam delata fuerat hæc planta ante meum in eam urbem aduentum, & aliquot nobilibus Matronis communicata. Vnicum postea bulbum inter aliquot alios Sultan Zambach nomine missos, à Magnifico & Generoso Dn. Dauide Vngnad, Cesaris tum apud Turcarum Imperatorem Oratore accepi, qui mihi iam biennio floruit: semen verò nullum, imò ne angulosa quidem capita protulit, quæadmodum nec nobilibus illis Matronis. paucula autem semina Constantinopoli accepi sine inscriptione, plana, Martagonis aut Lily siluestris semini fere similia, sed nigriora, minora, neque adeo spongiosa, quæ terra commissa, anno 1579. prodierant, plana que foliola tulerunt uti. Tusai primum è semine natum.*

*Vnicum autem florem mihi hætenus protulerat: sed anno 1579. quaternos, & subsequente senos, còsque omnes ex summo extimòque caule simul prodeuntes, quem-*

admodum & ea planta Domina de Thaw patritia Viennensis, quæ in extimo caule duas uncias lato flores natos habuit. Illis autem Matronis plerumque unus, interdum alter & tertius, non plures flores in singulis nati sunt. Ill<sup>m</sup> Dn. de Brancion unum bulbum à D. Alphonso Pancio acceperat paulo ante meum ab urbe Machlinia discessum, sub Martagonis Constantinopolitani appellatione. Eum de Dn. Disfo intellexi unicum dentaxat florem singulis annis tulisse. Sed ipse aliam plantam semine natam habuit, quæ illi primo quo floruit anno flores octo, subsequente verò, qui fuit 1578. quadraginta protulit.

Martagò con-  
stantinopoli-  
tanum.

Liliū miniatū  
polyanthum.

Videtur autem duorum generum esse, unum πολυαν-  
θον, alterum pauciorum florum: quandoquidem quod  
unico ab initio constat flore, rarò plures deinde proferre  
obseruatum sit.

HANC Matthiolus Hemerocallidis alterius nomi-  
ne appellare videtur, & in Iapidia mōtibz eruisse ait:  
sed illius descriptionem frigide admodum adumbrat.  
Eruti autem anno 1579. & subsequentibus, in hortis  
ultra Bosphorum in Asia sitis bulbi, allati sunt Mag<sup>o</sup>  
& Generoso Dn. Wolfgango Christophoro ab Entze-  
storff, & aliis aliquot Zufiniare nomine, cū à Dn. Vl-  
rico de Khunigspurg ipsius affine Constantinopoli redeun-  
te, tum ab aliis qui proximis subsequentibus annis Con-  
stantinopolim honorarij conducendi gratia missi, inde re-  
dierunt: tamen si in schedis interdum additum esset à  
nonnullis appellari Corona di Re, hoc est, coronam  
Regiam.

Zufiniare.

Coronategia.

Memini & Zufiniare appellatione inscriptum se-  
men, quale ante descripsi, accipere, cū primum Vien-  
nam appulisset anno Domini 1573. sed terra commis-  
sum nequaquam prodit.



PORRO *Lilium* hoc miniatum nouo vere cum *Martagone* primum solet emergere: *Sultan* verò *Zambach*, de quo proximo capite, etiam ante hiemem cum *Lilio*.

## DE SULTAN ZAMBACH.

## CAP. IIII.

QVONIAM superiore capite *Sultan Zambach* meminimus: non abs re erit, si quenam planta sit, hic declarauerimus.

Nam aliquoties eo nomine missa sunt Constantinopoli radices *Lilio* similes, quas quoniã extrema squama flarescebant, *Martagonis* alicuius, consimilis *Lilio*, superiore capite descripto, genus esse existimabam: idcõque quibusdam amicis in Belgicam misi pro *Martagone* Constantinopolitano. Sed postquam terra commissas, folia *Lilio* vulgari planè similia producere animadueriti: negligentius postmodum eas habui, vulgare *lilium* esse existimãs, præsertim cùm in quodam catalogo comperissem *Sultan Zambach* fa fiori grandi bianchi, hoc est *Sultana Lilium* magnos albos flores habet: & in altero, a odore di Giglio, id est, odorem habet *Lilij*. Inde factum est, ut apud Belgas modò *Sultan Zambach* appellata sit ea planta, modò *Martagon* Constantinopolitanum flore albo: cùm tamen unica eadẽque sit planta, non dua diuersa.

Biennio post, cùm omnes, quas seruaueram, planta mihi egregie florerent, certissimè comperi nihil aliud esse quàm *Lilium*, adcò cum vulgari conueniebant. Huius tamen caules, tametsi vulgari non sint breuiore, si quis diligentius contulerit, graciliores esse deprehendentur, rarioribûsque & minoribus foliis septi, atq. etiam ipsius flores aliquanto minores, a què tamen ac vulgares odorati.

Sultan Zam-  
bach polyan-  
thon.

rati. Nonnulla verò radices in tantam molē excreuerant, ut vix utraque manu comprehendi possent. Vna etiam illarū plures quā sexagenos flores anno 1577. protulerit: caulis autem planus fuit, & tres fere uncias latus: anno verò subsequente ad ingenium rediit. Sic interdum Natura in plantis ludere solet.

Memini cūm Ulyssipone essem anno 1564. Liliaeae radicem in foro emere, quam Petro Coudesbergo Pharmacopœo doctissimo Antuerpiam cum Draconis arboris ramo, Colocasia, variisque aliis rarissimis plantis misi. Ea illi postea flores huic omnino (nisi memoria fallit) similes tulit: sed quoniam plerumque in extremo caule confertim nascebantur, & interdum vitium faciebant, ipse Lilium fatuum cognominare solebat.

Lilium fatuū.

Zambach idē  
est Iasmino.

ZAMBACH perro vocem, testis est Amatus Lusitanus commentariis in Dioscoridem capite de Iasmino unguento, idem Arabibus significare, quod nobis Iasminum, topiariis operibus nobile & accommodum, cuius florum odor suauissimus quidem est, sed caput etiam ferit. Verisimile autem est Turcas hanc Arabicam vocem omnibus plantis quarum odor fere Iasmini florum (quos etiam rubri coloris in Asiaticis hortis ultra Bosphorum inueniri intelligo) suauolentia similis est, tribuere: sunt etenim Turcae admodū negligentes & imperiti in rebus propriè nuncupandis. Sic illi Con Zambach appellāt eum bulbum qui Mompellianis Pancratium flore Lily, Valentinis Hemerocallis dicitur, quod eius flos non modò Lily quodammodo formam, sed etiam odorem referat: sic vocem Gul, quæ illis rosam significat, omnibus floribus rosaceis accommodant, addito catamer vocabulo, si pleni sint, ut Gul catamer illis est & Rosa plena, & Anemone flore multiplici foliorum textura constante, & Papaner, & Malua hortensis, & similes.

Con Zibach.

Gul Catamer.

*similes, omnes etenim haec eo nomine nobis missa fuere. Vt cornicem exprimant, propriam vocem non habent, sed circumlocutione utuntur, gallinam nigram appellantes.*

## DE LILIACEIS quibusdam aliis stirpibus

### CAP. V.

**LILII** purpurei sine rubri bulbiferi tres differentia apud eos qui rem herbariam excolunt, observantur.

**VNUM** bicubitali interdum assurgit caule, firmo, **I.**  
*crasso, foliis septo liliaceis, subatris, in summis alis bulbos crassiores gestans, & flores magnos, rubros, Lilio rubro minori non bulbifero concolores. Teneriores huius planta, antequam flores ferre incipiant, non minus donata sunt bulbis secundum caulem inter folia nascentibus, quam reliqua duae species: sed quando vetusta sunt, & flores aliquot annis protulerunt, vix solent nisi in summo diuiso caule & secundum flores generare maiores bulbos. Huius radix omnium maxima est.*

Martag6 bulbiferum max.  
ius.

**ALTERUM** vix cubitatem excedit altitudinem, **II.**  
*caule etiam firmo, striato, & ex virore nigricantibus foliis praedito: quae tamen cum summo caule incana lanugine pubescunt: eius flores igneo rubore non rutilant ut in superiore, sed magis pallescunt, & Lili purpurei sine rubri maioris non bulbiferi colorem quodammodo referunt. Eius caules adulti paucos bulbos nisi in summis alis etiam gestare solent.*

Martag6 bulbiferum incanum.

**TERTIUM** inter utrumque media est magnitudine, nonnunquam etiam primum aequat: sed caules sunt infirmiores, gracilioresque, ipsique cum foliis dilutioris virore praediti: flores secundo generi similes. Hoc perpetuos secundum bulborum inter folia nascentium sobole onustum est: eiusque radix priore minor è lateribus propagines spargere plerumque solet, quae ad singula genicula in candi-

**III.**  
 Martag6 bulbiferum minus.





in candidos bulbos excreſcentes, ſubinde novas in circumſu plantas producent, Lilij rubri minoris non bulbi ſi modo: eius bulbi in aliis nati, ſecunda ſpeciei pare, priori tamen magnitudine inferiores: omneſque terra comiſſi ſui generis plantam procreant, & ſecundo anno in caulem bulbillis onuſtum excreſcunt. Ferunt tamen omnes ha planta in capitibus triangulis ſemen latum cartilagineum ſubſuſum, quemadmodum liliū vulgare, quod non ſterile eſt, ſed ſui generis etiam plantas proſert. verum qua ex bulbillis in aliis natis creſcunt planta longe citius adoleſcunt.

Florent omnes ha planta Junio, ſemenque perficiunt Auguſto: bulbuli verò in aliis nati harere ſolent, donec vento, aut contactu excutiantur, imò interdum planta adhuc inherētes fibras deorſum ſpectantes agere ſolent, quaſi ad communem matrem terram aſpirantes, & illa ſe condi cupientes.

Prior nuſquam ſponte naſcens à me obſervata eſt, ſed eam primùm Lira conſpexi in cultiſſimo horto Generoſæ Dn. Mariae de Brimeu Mag<sup>ti</sup> Dn. Conradi Schetti uxoris, qua deinde bulbis in terram depactis reliquis Belgicis breui tempore communis facta eſt: atq. etiam nunc Vienneniſibus ac aliis vicinis mea opera, miſſis ab ipſa à Belgica aliquot ad me maioribus bulbis. Reliquæ duæ in montaniſ pratiſ Auſtria & Styria ſponte creſcunt: ſed ſecunda rarior inuentu.

Solent verò cum ha, tum alia duæ non bulbifera, cum primùm florum gemmas oſtendere incipiunt, à formicis admodum infeſtari, ſic ut eo tempore nunquam immunes ab ipſis conſpicere queas, non ſecus ac Pæonia flores ante quàm explicentur, qui mirum in modum etiam à formicis appetuntur, præſertim qua pleno eſt flore.

LILII siluestris, siue Martagonis Matthioli *duo* Lilium silue-  
stre.  
etiam differentiaprehenduntur.

NAM unum maiore excrescit altitudine, foliaque 1.  
ampliora & nigriora obtinet: multo etiam pluribus flo-  
ribus saturatius purpurascens preditum est, qui  
modo multis nigricantibus maculis, modo paucioribus  
distincti sunt.

ALTERVM humilius est, eius folia dilutius vi- 11.  
rent, rarioreque flores producit, & eos plerumque di-  
lutiores, ac multis maculis nigricantibus insignitos.  
Utriusque autem deorsum spectant, foliisque ad pedi-  
culum reflexis constant: semen etiam in trigonis capiti-  
bus duplici serie in singulis angulis continetur, fuscum,  
planum, cartilagineum: radix in utroque genere lu-  
teo ochrea colore infecta est, quam ob causam a Germanis  
Gold wurtz, id est aurea radix appellatur.

Passim ambo proueniunt in siluis & umbrosis pratis  
Leytenberg, eorumque montium qui à Calenberg usq.  
ad Alpes excurrunt, & in plerisque siluis Styriae &  
Vngariae. Memini etiam minus olim obseruare in mul-  
tis Germania siluis, non modo editiore loco sitis, sed etiam  
in plano, uti apud Witebergam.

PORRO Liliaspodelus ille luteo flore odorato, Liliaspode-  
lus luteus.  
quem C. V. Dodonaus Hemerocallidem esse censet, ma-  
xima copia sponte nasci in multis viginosis pratis, non  
procul ab oppido & arce munitissima Nemethwywar  
Ill. Dn. de Bathyan arce, qua occidentem spectat, an-  
nis 1579. & 1580. deprehendi, ubi florentem sub fi-  
nem mensis Maij, & initio Junij erui. Vngari Zeöd  
lilium appellant: Croatae autem, apud quos etiam flore  
albo inueniri afferunt, Illyan zwet.





## DE TULIPA SIVE LILIO NARCISSEO.

## CAP. VI.

POST Liliaceas stirpes non incommode reponemus peregrinam illam, et ob insignem in flore colorum varietatem omnib. herbaria rei studiosis merito gratissimam plantam, quam vulgus Tulipam, doctiores Liliomarcissum appellant, licet in appendice ad Hispanicas observationes peculiari capite de ea egerimus.

Liliomarcissus.

Illius autem duo tantum primaria genera hactenus observant, praeocius unum, serotinum alterum: tamen si inveniantur quadam veluti dubia, quae medio inter utrumque genus tempore florere soleant.

PRÆCOCIOR Tulipa unicum fert caulem, pedalem maxima ex parte, aut interdum paulo ampliore, rotundum, virentem, & brevis quadam incanâq. lanugine aspersum, non concavum, sed firma medulla plenum: hunc plerumq. terna amplectuntur folia, nonnunquam quaterna & quina, inferiora lata admodum & liliacea, longiora tamen & crassiora, carinata, supra terram sese pandentia & contorquentia, superiora autem minora & angustiora, eâque vel propendentia, aut sursum erecta interdum, omnia autem colore ex carulco virente, aut argineo, veluti que farina asperso. Summo cauli insidet magnus flos, unicus (geminos etiam vidi) sursum spectans, sex foliis ut plurimum constans (tamen si & septenis & octonis conspexerim) eiusdem initio cum caule coloris, & interdum ad terram sese inflectens, in ipsâq. recumbens, ut colubri aut serpentis caput in terra decumbentis ementiatur, deinde paulatim sese subleuans, & colorem mutans atque tandem sese explicans & calathi aut cyathi modo in fundo pandens, ex quo sena, aut totidē quot foliis constat stamina

Tulipæ præcocius historia.

K

prodeunt,

prodeunt, modò lutea, modò pallida, modò nigricantia, pediculis etiam quæ stamina sustinēt, mirum in modum variantibus. Excusso flore, succedit mēbraneum triangulare caput, satis magnum, quandoque oblongius, interdum brevius, ventrēq. magis prominulo: quo in tres partes à summo dehiscente, conspiciuntur sex ordines seminis plani, cartilaginei, liliacei fere, & circinata prope modum rotunditatis, licet interdum altera parte quæ capitis centrum & interiora pertingit, oblongiusculum inueniatur, pallidi, fului, aut rubescentis, & si imbres frequentiores fuerint, etiam susci. Radix bulbacea interdum brevior est, interdum oblongior, crassa, inferiore sede nonnihil prominente, uti fere in Colchico, fibris aliquot tenuibus donata, & foris nonnunquā fulvescente, magna verò ex parte nigricante membrana obducta, quæ interiore parte lanuginosa est, quemadmodum castancarum cortex, quandoque autem ad eò densò tomento plena, ut mollissimè recubet radix, quæ solida est, firma, & velut albumen oui coctum candida, gustantique dulcis, nec ingrata.

T.p. insignis  
varietas.

**S V M M A** autem in *Præcoce* est coloris varietas: nec maiorem in ullo alio flore videre memini, nisi fortè in papavere. Etenim aut omnino luteus est, aut ruber, aut albus, aut purpureus: interdum etiam bini vel plures ex his in eodem flore permixti conspiciuntur colores. Non desunt qui carulei omnino coloris se vidisse asserant, mihi certè hæcenus videre non contigit.

**I.** Lutea Tulipa vel ad auri fulgorem accedit, aut pallet, foliorum autem ungues plerumque aurei sunt: odor quasi cera recentis, sine etiam croci, interdum nullus, vel admodum imbecillus.

**II.** Rubra color nunc saturatior est, nunc dilutior & aspectu incundissimo, modò etiam inelegans, & obsoletus: fo-

T.p. lutea.

T.p. rubia.










rius: foliorum ungues vel lutei omnino, aut veluti lerei quadam fuligine in luteo aspersi: in quibusdam nigra macula medium unguem luteum tantummodo inficit, in aliis verò magna, ut nihil nisi lutea quadam linea nigrum unguem ambiens conspiciatur: interdum ad eò magni sunt isti ungues, ut dimidiam folij partem occupent. Huius verò odor aliàs gratus est, instar mali aurei, magna verò ex parte obscurus admodum, vel papaneris virus quodammodo referens.

Alba omnino candidus est, nisi tria exteriora folia III.  
dorso quidpiam cinerei vel interdum etiam cerulei coloris admixtum habere viderentur: ungues lutei, pediculi & stamina pallent. T.p. alba.

Purpurea aliàs saturatior est, & violaceum, siue IIII.  
amethystinum colorem habet, aliàs, Pæonia floris amula, nonnunquam dilutior, & Damascenam siue Pronincialem (quam eruditiores Prænestinam vocant) rosam colore referens, interdum verò ad eò diluta, ut albescere videatur: omnium autem ungues cum staminibus aut pallent, aut lutei sunt coloris, tametsi nigra etiam stamina nonnulla habeant, & pediculos ea sustinentes quadam veluti fuligine infectos. Invenitur & odora & inodora, T.p. purpur.

Varia ad eò multiplex est, ut difficile sit omnes eius V.  
differentias verbis exprimere. Nam cum cuiuscumque tandem praeocis Tulipa semina excussa, & tellure sculpulta germinant: per pauca admodum nativum matris colorem retinent, sed in varios colores transformant flores, saepe etiam in luteum degenerant. Alba autem semine prognatas plantas insignem colorum varietatem præ reliquis nancisci experientia & diligenti observatione didici. Semina enim in eodem capite nata, à matris ipso collecta, eodemque fere momento terra commissa T.p. varia.





autumno, aliquot plantulas proximo subsequente vere prodixerunt; quæ post quintum, sextum, septimum, nono etiam octavum (ut aliis alia facilius adoleſcunt) nonum, & decimum demum annum flores protulerunt, eòſque aut omnino albos & matrem referentes, atque albos varios, vel luteos & luteos varios, aut rubros ac rubros varios, vel purpureos & purpureos varios. Omnes porro has colorum differentias, quam aptiſſimè poterimus verbis exprimere conabimur.

Lutea igitur varia flos (ut eundem ordinem ſequa-  
mur quem in primis coloribus deſcribendis tenuimus) explicatus, nonnunquam primis diebus totus luteus apparet, quarto deinde aut quinto demum die, illius folia rubris virgulis extrinſecus leniter per oras diſtinguntur: interiore parte omnino lutea remanent, præſertim tria exteriora, & unguem habent veluti fuligine tinctum, ſtamina interdum lutea, & pediculos ea ſuſtinentes ſuſcos. Interdum exteriora floris folia circa medium raris virgulis rubris deſcripta ſunt, interiora autem frequentioribus, & ad extremum uſque ſolum ſerre excurrentibus, atque aureum unguem, pallida ſtamina habent. Nonnunquam exteriorum foliorum ora, foris omnino rubent, intèrius à medio ad extremas oras rubris virgulis diſtinguntur: interiora folia exteriorè parte omnino rubent, interiore autem à medio ad ſummum rubrum neruum protenſum habet, latera autem rubentibus radiis illuſtrata. Inuenitur etiam cuius exteriora folia dorſo omnino luteo ſunt, per oras verò dilutioris cinnabaris colore virgatim diſtincta, interiore parte ad unguem uſque cinnabaris color tota occupat: interiora verò folia cinnabaris etiam colore omnino ſere infecta conſpiciuntur, niſi duplex nervus luteus ſecundum longitudinem, & lutea virgula in extremas oras

I.  
T. p. l. v.  
differentiæ.

- excurrerent, illius stamina nigricant, pediculi ea sustinentes lutei nonnulla tamen fuligine infecti sunt, & un-
5. gues aurei magni stamina quodammodo superant. Alius praterea cuius exteriora tria folia mucronata lutea sunt, prater oras quae purpura rubescente radiatim intercurfante insigniuntur, deinde extrema ora lutea sunt, interiore parte circiter medium folium rubri coloris radij frequētes sunt: folia interiora orbiculato mucrone, ab infima ad summum oblongis rubris lineis distinguuntur, prater extremas oras quae lutea sunt, interior pars minus radiata est quā exterior, unguēs magni, lutei, quemadmodum stamina cum suis pedicellis: odoratus est. Est & cuius folia extrema cuspide orbiculata sunt, foris omnino aurea, oris luteis: intus autem omnino lutea sunt, aurei coloris sine potius rubri flauo permixti linea radiatim medium folium transuersimque secante, pediculi lutei sunt, stamina cinerea: odoratus est aliquantulum. Item cuius folia mucrone omnino sunt orbiculato, dorso in exterioribus ad extremum usque mucronem luteo, oris latis, ex aureo rubris, unguibus luteis, dimidium folium occupantibus, pediculis & staminibus luteis: nonnihil etiam odoris. Alij similiter huic pares, sed dilutiore colore praediti, pediculis & staminibus duntaxat variantibus: sed nec hi odore carent.
1. Rubra varia flos exteriora folia magna ex parte mucronata habet, interiora orbiculata. Aliquando autem utraque magnis oris auri fulgore splendentibus sunt praedita, magnis unguibus luteis, staminibus vel nigris, vel obsoleta purpura tinctis, & pediculis ea sustentibus plerumque velut fuligine infectis; huius flos satis odoratus est. Interdū exteriora folia luteas oras foris habent, interius autem dilutius rubent, & quasi radiatim in luteas oras satis latas desinunt: interiora verò similiter rubent,



rubent, sed latiores oras luteas habent, rubro colore radiatim ut in exterioribus desinente, ungues luteos, stamina cinerei coloris: & istius flos nonnihil odoratus.

3. Nonnunquam dilutiore minij colore rubent utraque folia, mediocres oras luteas habentia, foris minij colore interiora folia fere tota occupante, virgatim tamen in oras luteas desinente, magnis unguibus luteis, staminibus cinereis, pediculis ea sustentantibus luteis: flos etiam
4. vicumque odoratus. Aliorum exteriora folia, medio dorso luteo sanguineis virgulis distincta sunt, reliqua parte rubra, oris tamen luteis: interiora omnino fere rubra, sed rubro colore radiatim in aureas oras desinente, interiore parte tota propemodum lutea, nisi circa medium folium rubris radiis distingueretur, ungues cum
5. pediculis lutei, stamina nigra. Aliorum folia omnia mucronata externè dorso lutei coloris, reliqua parte sanguinei, prater oras quae lutea sunt, internè sanguineis radiis tota respersa, extremis tamen oris luteis: interiora foris sanguinis modo omnino rubet, lutea ora sunt, coloribus tamen sese in inuicem commiscentibus, interna
- parte omnino lutea sunt, nisi circa medium crebrioribus sanguineis radiis instar orbis quodammodo insignita essent: ungues, pediculi & stamina cum superiore conueniunt.
6. Nonnullorum omnia etiam folia mucronata, oris aureis reliqua parte rubris, prater exteriorum foliorum dorsa quae aureis quibusdam virgulis aspersa sunt, omnium ungues lutei radiatim in rubro commixti, pediculi lutei, stamina nigra. Quorundam externa folia mucronata, interna orbiculata, tota rubra, oris exceptis quae aurei coloris sunt, radiatim in rubro desinentis: exteriora verò folia saturatiora sunt, omnia tamen interiore parte magis aurea sunt, ungues, stamina, pediculi cum praecedere conueniunt: omnium istorum flores satis odorati

odorati sunt. Invenitur etiam cuius folia parvas oras 8.  
 aureas habent elegantissimo rubro colore reliqua occu-  
 pante, ungues luteos, pediculos veluti fuligine tinctos,  
 stamina obsoletè purpurea.

Alba varia aut omnia folia habet extrema parte  
 mucronata, aut etia duntaxat exteriora mucronata, 1.  
 interiora orbiculata. In nonnullis externa folia, ad ex-  
 tremum usque mucronè omnino fere alba sunt, exceptis  
 oris quæ elegantis & dilutè admodum purpurei siue car-  
 nei coloris sunt: interiora verò magis purpurascunt, un-  
 gues lutei deinde exalbidi, stamina cum suis pediculis  
 lutea. In quibusdā folia exteriora exalbido sunt dorso, 2.  
 purpureis virgulis asperso, reliqua parte purpurascen-  
 te aut incarnata: inter. ora folia omnino purpurea sunt,  
 ungues stellatim lutei, deinde albi, stamina lutea, pedi-  
 culi ea sustinentes veluti fuligine aspersi. In aliis exter- 3.  
 na folia dorso etiam sunt albo, pluribus purpureis pun-  
 ctis asperso, interiore parte dilutiore purpura nitent:  
 tria interna folia saturatioris sunt purpurea quàm supe-  
 rior, ungues lutei radiati stella modo, stamina nigra, pe-  
 diculi fusci. Interdum externa folia magnas oras carneo 4.  
 colore pradtas habent, reliqua parte alba sunt: interio-  
 ra verò quasi tota carnei sunt coloris. Nonnunquam 5.  
 externa folia dorso sunt pallescente, alioqui omnino al-  
 ba, præter oras quæ foris brevibus & raris purpuras-  
 centibus virgulis exornantur: interiora tota alba sunt,  
 oras tamen longioribus & frequentioribus purpureis li-  
 neis insignitas foris habent, interiore parte omnino fere  
 alba sunt. Aliquando folia exteriora dorso & extre-  
 mo mucrone pallent, alioqui omnino candida, interiore 6.  
 parte ora paucis radiis purpurascensibus distinguuntur:  
 interiora folia à medio fere ad extremas oras foris pur-  
 purascensibus radiis aspersa sunt, intus verò omnino  
 alba, præ-

T. p. A. - V diff-  
 ferentia.



alba, prater oras quæ varioribus lineis distincta sunt. In quibusdam omnino alba sunt externa tria folia : interiora autem oras modo multis modo paucis virgulis purpurascentibus sine carnei coloris distinctas habent : omnium unguis lutei sunt, stamina & pediculi pallent. Inuenitur etiam cuius omnia folia coloribus quidē carneo & albo permixtis pradita sunt, sed qui cinerem carneo colori fere temerè perfusum referant, vel similis planè coloris cum tenuiore illo byssino panno carnei coloris, cuius subtegmen album est, Germani Silberfarb / hoc est, argenteum colorem vocant : huius unguis exalbidi, stamina obsoletè purpurascentia, pediculi albi sunt.

Purpurea varia flos magna ex parte omnia folia mucronata habet, interdum tamen externa solummodo mucronata, interiora verò orbiculato & obtuso mucrone sunt pradita : est etiam cuius omnia folia orbiculatum habent mucronem, ut ex singulorum descriptione videre licebit. Nonnunquam igitur omnia folia mucronata Pœonia polyphylla & pleno flore, purpureum colorem imitantur, orasque habent ex albo purpurascentes, unguis ex luteo viridique coloribus simul quodammodo permixtis subobscuris, ex albido orbe radiatim eos ambiente, pediculos luteos veluti fuligine infectos, stamina nigra : illius flores magni sunt & admodum patuli. Aliquando omnia etiam folia mucronata, foris magna ex parte purpurea sunt, interius media parte carnei coloris, oris ex albo palleſcentibus, unguibus, staminibus & pediculis luteis. Interdum etiam omnia folia mucronata foris & intus purpurea sunt omnino, extremasque foliorum oras albas habent, unguis luteos albo orbe circumdatos, stamina obsoletè purpurascentia initio, deinde ubi obuersa sunt (solent enim omnia florum stamina explicante se flore aperiri & reflecti) luteo pulvere aspersa,

T. p. p. v. diff.  
ferentia.





*aspera, pediculos luteos. Aliorum etiam omnia folia 4.*  
*sunt mucronata, & saturatiore purpureo colore pradi-*  
*ta, omnium ora exalbida, ungues albi, in imo tamen lu-*  
*tei, pediculi & stamina pallida. In quibusdam omnia 5.*  
*etiam folia mucronata, sed color purpureus dilutior &*  
*magis floridus, ora exalbida, ungues ex viridi pallent,*  
*pediculi nigrescunt, stamina pallida sunt: odoratus ple-*  
*rumque est istarum flos, reliqui inodori, ut & subse-*  
*quentes. In aliis omnia etiam folia mucronata obscu-*  
*rioris purpure, & quasi amethystina colore pradi-*  
*sunt, magnis oris albis, unguibus, staminibus, & pedi-*  
*culis luteis. Quorundam contra florum omnia folia or-*  
*biculatis sunt oris, iisque magnis & albis, reliqua parte*  
*saturatiore nitentēque purpureo colore pradi- 7.*  
*ta, ungues lutei quos ambit alba corona, stamina cinerea, pediculi*  
*lutei. Nonnullorum interiora folia aliquantulum orbi-*  
*culata sunt, & dilutiore purpureo colore splendent: in-*  
*teriore parte omnino fere alba sunt, omnium ora magna,*  
*& alba, ungues, pediculi, & stamina lutei sunt coloris.*  
*Reperitur etiam cuius externa folia mucronata sunt & 9.*  
*reflexa, exteriori parte obscurioris purpure colore pradi-*  
*ta: interiora verò orbiculata & dilutius purpurea-*  
*scētia, utraque autem in magnas oras albas desinentia,*  
*& interiore parte veluti purpureum orbem totum flo-*  
*rem per medium ambientem habentia, ungues luteos*  
*orbe albo inclusos, stamina obsolētē purpureascentia, pe-*  
*diculos luteos. Est praterea cuius omnia folia mucrona-*  
*ta sunt extrema parte, & tria externa foris purpurea: 10.*  
*omnia autē magnis oris albis pradi- & interiore par-*  
*te omnino alba, nisi mediam folij partem veluti purpu-*  
*reus orbis secaret & varium faceret, ungues lutei sunt*  
*albo eos ambiente circulo, stamina cum pediculis pallēt.*

HÆC sunt quæ de præcocium Tuliparum varietate

nunc commentari libuit: non me fugit, quin plures differentia tradi potuissent, sed eiusmodi quas ad iam enumeratas tanquam primarias reduci, atque sub illis comprehendendi posse existimo. Nunc ad Serotinā trāseamus.

T. serotinae  
historia.

SEROTINA longè maiorem acquirit amplitudinem, cubitalem enim & tripedalem interdum habet caulem, firmiorem & crassiore, rotundum, medulla plenum, & breui etiam quadam incanaque veluti lanugine siue efflorescentia aspersum, quem alternatim amplectuntur quaternaria plerumque folia, nonnunquam quina, carinata, firmiora quàm in praecoce, & saepenumero erecta, atque oris interdum adeo reflexis, ut sinuosa videantur, interdum minimè. Summo cauli qui pedali vel maiore plerumque, inò cubitali etiam nonnunquam longitudine nudus supra folia eminet, unicus insidet flos magnus & oblongus, cyathi modo concavus, sex foliis cōstans, extremo apice omnino mucronato vel orbiculato, aut tribus exterioribus duntaxat mucronatis, interioribus tribus orbiculatis, quemadmodum in praecoce, & è contra: caput ut in eadem triangulare, membranum crassius magna ex parte, et prominulo ventre, quo à summo dehiscente, sex ordines seminis plani, cartilaginei, fulvi, aut rubescentis, maiorisque quàm in praecoce conspiciuntur: radix praecoci similis, sed longiore maioreque bulbo plerumque constat, in reliquis cum illa conveniens.

Tulipa πολύκλωνος.

Tametsi autem hac Tulipa non secus ac praecox unico ut plurimum constet caule, interdum tamen eum etiam πολύκλωνον & ramosum habet: nam nata mihi sunt rubro flore praedita, quibus ex infimi folij ala alter nudus & pedalis ramus gracilior tamen, & ad summi folij exortum secundus crassitie cum primario caule propemo-



Maiores, florem non minorem habet quam serotina, <sup>I.</sup>  
 eundemque vel dilutius rubentem & cinnabaris ferme co- <sup>T. medicam-</sup>  
 lore, omnium foliorum extremis oris mucronatis, vel sa- <sup>ioris distecen-</sup>  
 turum & quodammodo nigricantem, exterioribus fo- <sup>I.</sup>  
 liis mucronatis, interioribus orbiculatis: unguis luteos  
 magnos vel paruos, nonnunquam veluti fuligine asper-  
 sos, vel in omnibus foliis, vel in exterioribus duntaxat:  
 stamina modo lutea & leui nigredine infecta, modo om-  
 nino nigra, pediculos etiam luteos media ex parte nigri-  
 cantes. Inuenitur etiam cuius omnia folia extremas oras <sup>2.</sup>  
 orbiculatas habent, exterius & interius omnino lutea  
 sunt, nisi extrema ora ad prematuri aurei mali colorem  
 accederent: stamina cum pediculis lutea sunt: Illius flos  
 odoratus est. Alia item cuius color initio omnino aureus <sup>3.</sup>  
 est, deinde externa folia, qua luteo sunt dorso, oras colo-  
 re dilutioris cinnabaris radiatim distinctas adquirunt:  
 interiora verò folia cinnabaris etiam colorem, atque in-  
 super binos luteos nervos secundum longitudinem, &  
 radiolos luteos in latera excurrentes: unguis magni,  
 lutei staminum altitudinem superant, stamina nigra  
 sunt, & pediculi lutei fuligine infecti.

Humilior pedalem altitudinem non superat, imò <sup>I.</sup>  
 maxima ex parte infra eam consistit, foliis & flore ad <sup>T. m. humi-</sup>  
 precocem proximè accedens: floris autem folia omnia <sup>12.</sup>  
 mucronata, sed exteriora multo longiora, foris obscu-  
 re rubra, extremis tamē oris vircentibus: interiora om-  
 nia folia intense rubent, & splendent: unguis lutei ra-  
 diati, sed quos nigerrima macula sic inficit, ut circulus  
 aureus & radiatus eam duntaxat ambire videatur,  
 & oculum quodammodo ementiatur, stamina & pedi-  
 culi nigricant: huius radix bulbacea interdum erio-  
 phora est, nam exterior illa membrana bulbi substan-  
 tiam amplectens & regens, plurimo denso, candido, mol-

lique tomento adeo suffulta est, ut mollissimè bulbum recubare necesse sit.

T. flores alij  
aliis magis  
caduci.

Non omnes porrò flores diu in sua coloris elegātia & venustate perdurant, verum nonnullarum magis caduci sunt, & breui marcescunt, aliarū firmiores sunt & coloris gratiam diutius retinent, præsertim serotina: omnes cerè umbilocalo sese contrahunt, & pluuio faciliè corrumpuntur, etiam ante quàm expandi possint: contrà, temperato sole illustrati sese explicāt & diutius conseruantur: at vehemens etiam ardor eos nimium excoquit, sic ut absumto humore faciliè defluant.

T. feritur va-  
riis modis.

CETERVM tamen si seminibus terra mandatis, huius plantæ genus conseruari soleat: interdum tamen & nucleis maiori bulbo adnatis propagatur, sed nullum inter præcocia fertilius rubro & albo, omnium autem maximè serotino rubro, quod adeo fecundum est, ut etiam semine natum & vix bimum alias proles generet biennio aut triennio ante quàm florere incipiat, dū singulis annis bulbus recta & quasi ad perpendiculum in dodrantalem & palmarum altitudinem descendens (solent enim omnes Tulipa nōdum adulta & ante floris prolationem maxima ex parte quotannis altius descendere, Bononicas, siue Apēineas excipio, & Narbonenses, & Hispānicas illis congeneres, quæ non in aliū sed in latus & obliquum ante quàm florifera sint, proles è longis venis dependētes strargunt) in veteris bulbi exuuiō aliquid substantiæ relinquit quæ in alium bulbum efformatur, atque is etiam similiter, ut si quis dextrè & cum industria trimos vel quadrimos ex terra eruat, exuuiorū vestigia sequendo, nonnunquam velut catenam aliquot bulborū coherentium et ex primo exuuiō ortū ducētium inueniat: memini & bulbos in infima ala summa tellure natos, in serotinorum genere præsertim, (licet hoc

T. bulbifera.



(licet hoc anno 1582. etiā in Albe variz, Purpurea varia, & quarundā aliarū præcociū alis bulbi mihi nati sunt) qui terra cōmissi eiusdē coloris cum matre florem subsequente anno produxerint, quēadmodum etiā bulbi matri adnati. Ex seminibus verō quæ sit propagatio, planè (ut dixi) incerta est, in præcocibus nimirū: nam ferotina suum genus conservare videtur: aut si aliquam mutationem adquirunt, in unguum & staminum varietate duntaxat consistit.

Solet caulis è medio bulbo erumpere: sed ipso cum foliis iam marcido, & siccato, si bulbum eruas, ad latus ipsius bulbi enatum cōspicies (quod etiam evenit in Iride bulbosa, Colchico, & aliis congeneribus) nouo bulbo paulatim succrescente, & totius planta succum ad se recipiente, quo tempore commodissimè erui potest, & in alia loca sine noxa transferri.

Interdum accidit ut rubra ferotina iam grandior, nondum tamen planè adulta instar Tulipæ Apenninæ siue Bononiensis (cuius flos admodū odoratus est & leucis flore luteo suauolentiam refert) proles in latus spargat, ut in meo hortulo, in quo varij generis bulbosas stirpes florum elegantia & varietate commendabiles alo et excolo, non semel obseruari.

Omnes autem cuiuscumq. generis Tulipa, (ut etiam hoc breuiter annotem) quēadmodum longa experientia hætenus didici, quamdiu florem non ferunt, ἀναυδοi planè sunt, & unicum singulis annis proferre solent folium: at si dum sese explicare incipit, secundum etiam eo inclusum appareat, illo ipso anno florem prolaturum spes est, nisi pruina, aut aliud ab insectorum erosionē incommodum eam intercipiat.

Quo nomine veteribus dicta sit hæc plāta, multi dubitant. Sunt tamē peritiores nonnulli, qui ad Satyrium Dioscoridis,

Dioscoridis, quibusdam *τριφυλλον* cognominatum, referendam censeant: ad cuius sanè descriptionem multis notis accedit. An verò iisdem facultatibus cum Satyrio prædita sit, neminem periculum fecisse intellexi.

σάτυριον  
τριφυλλον.

Potuisset fortè ante aliquot annos Antuerpianus quidam mercator certi quidpiam de ea re statuere. Is enim cum horum bulborum non exiguum numerum ab amico unà cum byssinis pannis Constantinopoli sibi missum accepisset, cepas esse existimans, aliquot ex illis asfari iussit, & vulgarium ceparum modo ex oleo & aceto in canam sibi parari: reliquos in horto, inter brassicas & alia olera defodit, ubi neglecti, omnes brevi perierunt, præter paucos quos Georgius Rye mercator Machliniësis, rei herbarie perquam studiosus, ad se recepit: cuius sanè diligentia & industria acceptum referre debemus, quòd eorum postea flores gratissima varietate spectabiles videre nobis licuerit.

Hactenus autem Tuliparum bulbi nobis Byzantio missi sunt, præcociis quidè Café lalé, serotina verò Cauaíá lalé nomine: à locis nimirum unde primum Constantinopolim illati fuerunt appellatione indita. lalé enim Turcis florem significat: Caffa sanè urbs est in península Gazaria dicta, quæ inter Propõtidem & Euxinum pontum sita est.

Café lalé.  
Cauaíá lalé.

## DE FRITILLARIA.

### CAP. VII.

VENUSTISSIMA hæc planta rotundo est caule, pedali, interdum etiam maiore, tenui, foris ex viridi purpurascente, & obsoletioris coloris, intus verò, ut in Tulipis fungoso: quina plerumque habet folia, interdum etiam plura, temerè per caulem sparsa, angusta, carinata, digitali longitudine (superiora tamè breviora

Fritillariæ hystoria.





sunt) caule viridiora, & Narbonensi siue Hispanica Tulipa foliis forma coloréq. proxima: flos in summo caule sapissimè unicus, nonnunquã et alter, raro tertius, interdũ etiam gemelius (omnes autem, si plures fert, eodem tẽpore aperiuntur) inodorus, propẽdens & deorsum spectans tintinabuli aut nola modo, sex foliis constans, quæ areolis quibusdã nunc quadratis, nunc oblongis, partim candidi, partim purpurei, siue saturatioris, ut ita dicã, carnei coloris, elegantissimo ordine, pulcherrimaq. serie distincta sunt, quadris tamen ad latera minoribus: folia interiore parte sunt vegetiore & elegantiore colore prædita, candicantésq. sessili parte (ut in Rosis) ungues habẽt, à quorũ infima sede virescens quadã & herbidi coloris linea, ad mediũ usq. foliũ ducta videtur: stamina, sex medium florem occupant, primũ pallida, deinde, ubi obuersa sunt, lutea, & quasi pulvere quodam conspersa (quali sunt omnium fere florum stamina seu apices) quæ stilum trisulcum, ut in plerisque aliis floribus ambiunt: siliqua deinde succedit triangularis, uncialis plerumque, superna parte crassior & sine corona, alioque Mompelliana Tulipa capiti similis, in qua semen exiguum, planum Mompelliana tulipa semen quasi referens, margine membraneo latiore, in quo nullum, contra quàm in Tulipis, germen conspicitur: radix bulbosa, candida, solida, nullis tunicis septa, sed veluti in binas eãque plerumque æquales partes secta, è cuius medio protuberat quasi pulvinus quidam unde caulis emergit, sessili parte multis tenuibus fibris donata est.

Flos interdum variat: nam modò dilutiores quadras, modò saturatius purpurascentes habet.

Sponte quibusdã pratis ad Ligerim flumen non procul Aurelia vrbe Gallia celebrinascitur, unde primum ad me missa fuit Maccliniars, & Belgica com-  
municata

*municata* 1572. Deinde *Viēna Austriæ* aliquo bulbos accepi anno 1575. munere Ill. viri Dn. Ioannis de *Vulcob*, Regis Gallie apud *Cas. M<sup>tem</sup>* Legati. Anno verò 1579. etiam in quibusdam pratis quatruiduano itinere infra *Budam Pannoniæ*, ab iis qui *Constantinopoli* redibāt, mense *Martio*, cum floribus observata est.

Floret etiam in hortis *Martio*, nōnunquam *Aprili*.

2. D. Ioannes *Boisot*, veteri amicitia mihi coniunctus, eius genus habet magis serotinum, quod videlicet toto bimestri post primum illi floruit anno 1577. Habuit id binos flores parte interiore ex luteo virentes sine vlla colorum distinctione: foris verò nervus extuberans & eminens ex obscuro viret, & foliorum ora (qua nonnihil reflexa sunt) versicolores sunt, ex luteo, virenti, & purpureo: ex *Aquitania* originem ducere id intellexi.

Qui ad me primum genus mittebat *pharmacopæus Aurelianensis*, *Noël Capperon* vocatus, ac paulo post in cōmuni illa laniena per univērsam *Galliā* grassante sublatu, *Fritillariæ* nomen indidit, quod eius areola versicolores fritillum quodammodo emulenter: vulgo *Lilium variegatum* antè appellata fuit. Sunt qui *Meleagridem* vocare malint, quoniam eius foliola variis coloribus picta sint, uti pluma *Meleagridis anis* (qua vulgo *Gallina* siue *Perdix Barbarica* siue *Guinea* dicitur) diversis tamen. Secunda autē species, neque *Meleagridis*, neq. *Fritillariæ* nomen mereri videtur, quandoquidem nulla colorum varietate praterquam extremis foliorum oris distincta est.

AN apud Recentiores medicum in usum veniat hac planta, me fugit. Sed ob florum elegantiam & amœnitatem in hortis maxime coli existimo.





## DE NARCISSO PLENO FLORE.

## CAP. VIII.

NARCISSI pleno & multiplici flore historiam & iconem in Hispanicis observationibus dedimus. Sed postea aliud genus sese obtulit, quod pratermittendum non duxi.

ALTER ergo *τολμαθ* & Narcissus, similia priori Narcissus  
multiplex. 17. folia habet, & reliqua omnia prater florem, qui senis quidem ut prior constat albis foliis, coronam verò mediam totam luteam & multiplicem obtinet, emicantibus è medio foliolis oblongis & angustis stellatim quasi decussatis, colore quidem albo, sed cui & viridis foris, & pallidus interiore parte permixti sint: odor fere qualis in priore, sed nescio quid magis aromaticum spirans, medius quasi inter Narcissum & Muscari.

Allatus fuit hic Narcissus Constantinopoli à Dn. Philiberto de Bruxellis p.m. sub initium anni 1575. & mihi cum plerisque aliis bulbis donatus: eodem anno & subsequenter emerfit, & folia protulit, at nullum florem. toto anno 1579. latuit, eam ob rem omnino perisse existimaui, donec anno 1580. mense Martio iterum prodiret eodem quo repositus fuerat loco, Aprili tandem in eodem caule ternos flores, quales modò descripsi, tulit. Sed & anno 1581. dum abessem & in Anglia peregrinarer, floruisse denuo, mihi relatum est. Ante hiemem verò folia emergere non solent, sed nouo vere duntaxat, eo anno quo florem daturus est. Nam si ante hiemem illi prodeunt, proximo vere nullos dabit, eadem ratione quo reliqui precociiores Narcissi, qui cum steriles fuerint sunt, folia ante hiemem producant.

## DE NARCISSEO SEROTINO MONTANO.

## CAP. IX.

Narcissi sero-  
tini historia.

QVATERNÀ aut quina Martio mense profert folia, oblonga, angustiora, Narcissinis similia, inter quæ medio Aprili pedalem caulem, rotundum, nudum, intus fungosum, in cuius summo è tenui membrana tunicus, deinde alter interdum floris nascitur, sex niveis foliis expansis et stella modo decussatis constans, calyculo plano, pallido (cuius ora rubra fimbria exornata sunt) medium florem occupante, et sex intus staminibus subuliscis inaequalibus praedito, totus odoratus, & Narcissi medio purpurei floribus persimilis: capitula succedunt trigona, crassiuscula, in quibus semen nigrum, inaequale, continetur: radix bulbacea est, multisque candidis tunicis constat, extrema qua reliquas ambit, fusca, è cuius sessili parte plurima subfusca fibra dependent.

Provenit magno miliari supra Gamingam Chartusianorum monasterium Dinae virgini ad Thronum nuncupatum, pratis quibusdam altissimo lacui vicinis, ad pradium Zethof dictum, in quo curantibus Chartusa moderatoribus, perhumaniter & luculenter excepti semper fuimus, dum in summa Herrenalben & Durrenstein inga tenderemus, aut ex iis ingis Gamingam rediremus. Floret Maio.

In Belgicis hortis similem planè cum istis viuerem, ali memini.

## DE NARCISSEO PERSICO.

## CAP. X.

Narcissi Per-  
sici historia.

Ακavλος planè est hac planta, & floris tantummodo caulem sortita, veluti Crocum, siue Lirium alterum in Hispanicis nostris observationibus descriptum, cui in-  
sudet





*sides flos è membranaceo cucullo veluti ex vasculo exiliēs, Lirio quidem alteri similis, verùm paulo oblongior, sex foliis itidem constans, quorum tria interiora, nonnihil angustiora sunt, externa verò latiora, et sub extremum aliquantulum incurva, siue ἀπὸ πρὸς τὴν quandam habentia qua interiora amplectuntur & comprehendunt, colore melino, ingrato odore & papaveris virus redolente: stamina in medio totidem quot folia, sed quæ ad internorum foliorum sedem enascuntur, reliquis tribus longiora sunt, è medio stilus exilit oblongior, gracilis, & sine capite. Folia illi ab alterius Liry foliorum forma haud multum absimilia, sed Hemerocallidis Valentina in Hispanicis observationibus etiam descripta foliis viciniora, lata, plana, eiusdemque cum illis coloris, hoc est, æruginosi, quæ interdum sese circumagunt: radix crassa, bulbosa, à basi (qua multis fibris donata est) statim extuberans, intus candida, foris pallida quidem, sed nonnihil etiam nigricans.*

Constantinopoli semel duntaxat allatus est hic bulbis, mihiq̃ue communicatus à Philiberto de Bruxellis iam dicto, anni 1575. initio, quem postea variis amicis cum in Belgicā, tum in Germaniam misi. Atque principio Narcissum autumnalem ex bulbi forma esse coniciebam, in qua opinione admodum me confirmavit flos sub finē Septēbris emergēs. Sed postquā folia nō subsequi animadverti, & incunite demum vere prodire observavi, eaque ab illius foliis colore differentia: tum exactius utramque plantam inter se contuli, & manifestè deprehendi dispares esse: fert autem siliquam crassitudine pollicari brevis pediculo inhaerentem, & è summa tellure vix emergentem, quæ cum inanis esset, nullum semen observare licuit, etenim ab eo tēpore nullas siliquas protulerunt quas servaveram plantæ.

NOMINE Zaremcada persiano, quod latine Nar- Zaremcada  
persiano.  
tissum persicū sonat, allata fuit hac planta. Non mi-  
nus autem convenire videtur cum Lirio altero Theo- Lirium alee-  
rum Theo-  
phraſti.  
phraſti, quā autumnalis supra memoratus, & forsi-  
tan etiam aliquanto melius.

OMNEM porro Narcissum Turce propriè appel-  
lant Serin cade, hoc est, Regium calicem, quod flammū Serin cade.  
illud floris medietallium calicis formam quodammodo  
referat: qui verò huc ad nos mittunt eius bulbos, vario  
corruptoque ut plurimum inscribunt nomine, nunc Za-  
rem cada, modò Zetern cade, interdum etiam ineptiore  
Zaremcatta. At qui pleno est flore, nonnunquam Giul Giul catamer  
lale.  
catamer lalé (quemadmodum Anemonem polyphyllō  
flore, & alias nonnullas stirpes) appellatione accipimus,  
qua voces Rosæ plena florem significant.

Sed & Narcissum illum qui medium calycem exi-  
guum & planum, simbriciæque rubente insignitum ha-  
bet, unicum dantæat fere semper, aut raro binos flores  
eodem caule ferentem, non Serin cade, ut qui medio tri- Deus bohini.  
teus, aut totus flammus, totusve candidus est: sed Deve  
bohini vel boini, id est, Cameli collum sine caput nun-  
cupat, quoniam floris collum longius quā ceteri Nar-  
cissi protensum habet.

## DE LEVCOIO BULBOŒ PANNONICO.

### CAP. XI.

TRIA Leucoij bulbosa radice apud Pannonias in-  
veniuntur genera: quorum duo præcocia sunt, tertium  
serotinum.

PRIMUM Narcissi autumnalis vulgò vocati foliis simi- I.  
lima habet folia, admodū viridia, & nitida, sed nō adeò Leucoij bul-  
bosum præ-  
cox malus.  
atro virore splendentia, ut illius: cauliculū è medio fo-  
riorū exeunte, palmarem, nudū, striatum, infirmū, intus

M 2

vacuum,



vacuum, membranaceum folliculum aut vaginulam extrema parte ferentē, è qua unus, interdū bini flores, rari terni erumpunt, sex foliis aequalibus candidis, sed extrema & angustiore parte veluti macula è viridi flavescente infectis cōst. intes, nutantes & deorsum spectantes, exigui cymbali modo, modū florē occupantibus sex luteis staminibus cum candicante stilo, odore floris oxyacantha, nec ingrato: flori succedunt membranacea capitula pyri modo turbinata, semen ex candido flavescentia, oblongiusculum, & durum: radix bulbosa est, multis candidis tunicis (extima tamen fusca) constans, & densa candicantium fibrarum coma firmata.

ALTERIVS folia à superioris quidem foliis non multū discrepant, verū angustiora & firmiora sunt, ad Pseudonarcissi flore luteo foliorū formā magis accedentia, quorū colorem eruginosum & cinereū emulantur: cauliculi graciliores, etiam palmares, nudi & concavi, è vaginula unicū semper florē (plures observare non meminī) prominentes, superiore minorem, nutantē etiam & pendulum, sexq; candidissimis foliis constantē, quorum tria externa omnino nivea, alius duplo longiora latioraque sunt, radii que solaribus illustrata, aut sudo celo, alarum modo sese explicāt, tria interna breviora sunt, & cordis, ut vulgo pingitur, formā referunt, virescente limbo extremitatis ambiente: medium florem sex etiam staminula crocea, stilusque exilis candidus occupant, odor nullus: similia superioribus fere capita succedunt, sed minora sunt, & olivæ virentis formam propemodum exprimunt, in quibus semen alteri simile sed candidius: radix superiore minor, multis etiam tunicis albis constans, externa nonnihil nigricante; & sessili parte multis tenuibus fibris prædita.

Prodit utrumque maturè admodum, statimque inter



bina folia florem ostendit vix liquefactis interdum nigris, quas secundum genus nonnunquam etiam penetrat: Maio mense semen mature, cit & folia marcescunt.

Alia porro Secundi generis species Constantinopoli 2. superiore Autumno allata est, cuius unicū bulbū Narcissi bulbis permixtū Generosa Dn. de Heynstein accipit, atq. cū illis terra mandavit. Huius anni 1583 in eunte Martio binis foliis prodit, eiusdē cum iā descripti foliorū coloris, nempe aruginosi, sed latioribus, floris gemmā ut in superiore cōplētentibus: crassiusculus cauliculus tandē succrescēs unicum florē in vaginula inclusum sustinuit, qui postquā explicatus fuit, forma superiori similis apparuit, duplo tamen maior, tribus externis foliis alarū modo expansis, omnino nigris, interiorib. vero brevibus, bisulcis ut in superiore, simul coniunctis, et veluti tubulū efformantibus, magna ex parte virētib., deinde circa oras albis, quas tamē extremas, virides macula inficiunt: inodorus verò non est hic flos, at illius, quē in Primo genere descripsi, fragrantiam emulatur, imò iucundius quidpiam mihi etiam spirare videtur.

TERTIO quinq. aut sex sunt folia Narcissinis similia 111. & virentia: ē quorum medio caulis pedalis aut amplior assurgit, nudus, concavus, aliquantulū planus, & binis acutis angulis praeitus, viridis, ē membranea vaginula quinos aut senos flores proferens, pendulos tintinnabuli modo, sex equalibus & niveis foliis constantes, quorum extimam partē virides macula inficiunt, senis iutus staminibus luteis & medio lacteo stilo cuspide viridi insignito: floribus succedunt magna & trigona fere capita, in pyri modū turbinata, quae semen continent nigrū orobi magnitudine, aut quale Lilia sphodelus flore lacteo fere habet: radix crassa & bulbacea multis succulentis tunicis constat, & plurimis fibris donata est.

Leucoium  
bulbos. By-  
zantium.

Leucoiū bul-  
bosum maius  
serotinum.



*Serius quàm superiora plerumque germinare solet, atque Maio demum mense flores proferre.*

*Uno duntaxat loco hoc postremum genus observavi, in Pannonia inter amni uliginosis pratis supra Warasdinum anno 1579. Pracocium item primum solummodo in silva non procul Zolonock Ill. Dn. de Batthyán oppido vdis locis: Alterum verò non modo in Viennensi & Leytano salubus, sed etiam plerisque Pannonia pratis: umbra tamen magis delectari videtur.*

*PRIMUM à rhizotomis mulierculis Wolsch bepl/ quasi, palustris viola, dicitur; in Germania verò ubi plerisque locis nascitur, Wepss hornungs blumē/ id est, candidius February flos, ad differentiam Pseudonarcissi oblongo & luteo flore, quē gelb hornungs blumē/ hoc est, luteū February florem appellant, quòd eo mēse et in eunte vere plerumque floreat. Alterum ab usdem rhizotomis mulierculis Wepss bepl/ & Dnetropsen/ id est, alba viola, & nivea gutta ab insigni candore nuncupatur. Serotini nullum vulgare nomen intellexi. Cui planè simile ante triginta annos colligere memini in pratis ad Latera oppidulum Mompelliani agri, non procul à Volcarum stagno. Eius etiam genus alitur in Germanicis & Belgicis hortis, huic per omnia simile, nisi folia pallidiora quodammodo essent, & minus mucronata, sed veluti bifida: flores item maculis ex viridi pallentioribus infecti sunt.*

## DE ORNITHOGALO ARABICO.

### CAP. XII.

*OBLONGA habet folia, viridia, carinata, Hyacinthi orientalis foliis adeò similia, ut ab iis vix discerni possint, minimè autem Narcissi foliorum amula: inter qua cubitalis emergit caulis, levis, nudus, gracilis, vi-*

Ornithogali  
arabici histo-  
ria.

M 5                      rescens.





rescens, quem aliquot in summo nascentes confuso ordine ambiunt pediculi, flores sustinētes magnos, Narcissinis pares, sed Ornithogali forma præditos, illorūque modo sub vesperam se claudentes, sex foliis omnino albis constantes, medicato odore, triangulari, capitulo nigro, splendēte, medium florem occupante, ipsum verò capitulū staminibus sex albis apice luteo coronatis ambientibus: semina nondum observare mihi licuit: radix bulbosa, Hyacinthi amula, candicans plerumque, & multis tunicis constata, lata admodum sede, & in circuitu fibras spargente.

Primum communicata Belgis hac planta fuit, missis eius radicibus Ill. Dn. Brancioni à C. V. Alphonso Pantio, & ampliss. Iac. Ant. Cortuso, deinde etiā Constantinopoli cum aliis raris stirpibus missa. Semel eam in Belgica florētē vidi, deinde unica Vienna mihi floruit mense Iunio 1575: neutra tamē semē tulit, sed caules cum foliis emarcuerūt. Et licet sæpius postea acceperimus, illius flores videre non contigit, nedum semen.

At qua anno 1580. Constantinopoli mense Martio allata fuerunt, magna ex parte flores tulerunt, sed nullum semen.

Mira verò est istius bulbi natura: nam plerumque experti sumus vix vlla folia producere, nisi singulis eximatur annis, & aliquanto tempore adseruetur, deinde denuo antequam hiemem terra mandetur, tum enim demum germinare: nullus autem florere mihi conspectus est, nisi recens Constantinopoli allatus. Cum verò frigoris admodum impatiens sit, neque in Belgica, neque Vienna hortum ferre potest: sed in fœtilibus alendus est, ubi adnatis sese feliciter propagat.

PORRO ex Italia missus fuit Lili Alexandrini nomine: Constantinopoli verò semper Zumbul arabi, quod

Lilium alexandrinum.  
Zumbularabi.

Hyacin-

*Hyacinthum arabicum* sonat. Sed quoniam ad Ornithogali genera potius referendus videtur, quam ad *Hyacinthos*, Ornithogali arabici nomen indidi: licet Matthiolum *Narcissi* adnumeret. Viennenses matrona *Wepf's Jacinthe* hoc est, candidum *Hyacinthum* appellant.

## DE ORNITHOGALO PANNONICO.


## CAP. XIII.

DVO Ornithogali genera per Pannonias observant, quæ nunquam antea videre memini.

I. PRIOR quæque aut sex ante hiemem germinant folia humi expansa, angusta, digitali longitudine, ex viridi canentia, & *Caryophylleorum altitium* foliis forma & colore propemodum similia, aliquantulum hirsuta sapore herbacco: subsequente Aprili dum iam flaccescere incipiunt folia, ex eorum medio exilit dodrantalis cauliculus senos aut plures flores spicatim coharætes sustinens, qui è senis foliolis compositi Maio mense sese explicant, intusque niuei omnino, foris nervum viridem ut vulgare ornithogalum, masusque Mompellianum, habere conspiciuntur: siliquæ deinde triangulares semen nigrum, rotundum continent: radix subest bulbosa, oblongiuscula, candida, intus viscosa, gustu primum insipido, deinde acri, foris cinerea membrana tenui obducta, & sessili parte multis candidis fibris capillata. Illud peculiare habet hac planta, ut magna ex parte dum floribus onusta est, sine foliis conspiciatur, aut fere iam evanidis, & flaccidis. At in hortos sata diutius plerumque folia retinere solet, & in maiorem amplitudinem excrescit, spicæ vicenorum aut plurium florum nonnunquam proferens.

Largissime pronuncit aperto illo campo secundum siluulam pago Lachn imminentem, et in pratis siccioribus secundum Danubium, in more Badensibus thermis imminenti, totaque illa montium serie, inde usque ad Calenberg

Ornithogali  
pannon. minus  
ore albo.





lenberg excurrēte locis apertis & gramineis, tum etiam in *Hamburgenſi monte*.

Vnico alterum prodiſt foliolo, duorū aut trium digitorū tranſuerſorū longitudine, anguſto, colore exalbidō, ſubacido guſtu: iuxta quē tenuis cauliculus uncialis, unū aut alterū foliolū ſuſtinens, ē quorū medio bini aut terni exiliunt ſoſculi ſtellati, intus lutei, foris ex viridi purpuraſcentes, ſex radiolis & tot: dē ſtaminibus intus praditi: iis ſuccedunt exigua triangula capita, ſemine ruſſo, exili, & inaequali plena: radix candida rotunda, cinereo putamine amicta, piſi exigui magnitudine. Sed & hoc cultura maius aliquantulum euadere ſolet.

Inuenitur eodē quō ſuperior loco apud ſilvulā *Lachnago* vicinam: ſed aprico magis delectari videtur: nam abundantius creſcit in margine illius aperti agri *Meridiei* oppoſito. Obſervari etiam in agris inter *Nemethwywar* & *Zolonock* oppida ſepius memorata.

Utrumq. hoc genus D. Brancioni aliſq. amicis Belgis miſiſiā ab anno 1574. altero poſt quā *Viennā* appuliſe.

CETERVM in *Alpiū* pratis ubi ſilva deſinere incipiunt, inuenitur etiam id *Ornithogalum luteum*, quod *Fuchſius* & *Tragus* *Bulbum ſilueſtrem* appellarunt; *Vngari*, *tik tara*: tamenſi alpinum maiore folio conſtare mihi videatur, floribꝫque non adeo luteis, ſed ex herbaceo quodammodo pallentibus eſſe preditum.

Frequens eſt & ultra *Drauum*, et *Warasdinum* in agris *Ornithogalum vulgare* flore albo.

Apud *Nemethwywar* verò in ſegetib. naſcitur maius illud *ornithogali* genus, quod apud C.V. Remb. *Donoſum Aſphodeli bulboli* Galeni nomine inſignitur.

Hic etiam mihi natum eſt *Ornithogalum maius* *Mompelliano* ſimile, ſemine *Moly* nomine, à *Raſſio* mihi *Luſetia* miſſo.

II.

*Ornithogalum pannon. minus* luteo flore.

*Bulbus ſil. Fuchſij.*

*Ornithogalum vulgare.*

*Ornithogalum maius Aſphod. bulboli. Galeni.*

*Ornithogalum maius Mompellian.*



## DE HYACINTHO OBSOLETIORIS

## Hispanico. CAP. XIII.

CONSTAT quinis aut senis foliis oblongis, carinatis, Hyacinthi obsoletoris Hispanici historia. succi plenis, colore extinereo virescente, Muscari foliorum amulis fere, sed angustioribus, flexilibus, per extremū rotundis & mucronatis, candida linea interius per longitudinem excurrente, ingrati saporis: caulis ē mediis foliis prodiū pedali longitudine, gracilis, nudus, denos, duodenos aut plures flores per intervalla ferēs deorsum spectantes, Hyacintho Belgico, siue nō scripto Dodonai propemodū similes, senis foliis constantes, quorum terna exteriora valdē reflexa sunt, interiora minus, sed veluti tubulū quendam efficiūt: color in his admodū obsoletus, ex purpureo, pallido & virescente permixtus, nullus odor: semen fert in capitulis planū, nigrū, cartilagineum, circinata fere rotunditatis, Scilla semini non multū ab simile: radix globosa et rotunda multis candidis tunicis constat, & numerosis fibris sessili parte pradiū est.

Sponte nascitur quibusdam Hispania locis, unde primū in Belgicam delatus, nonnullis amicis floruit, à quibus semine communicato nata mihi sunt aliquot plantae: earum una duodenos flores anno 1578. protulit, altera biennio post plures, sed nullum semen.

Serò germinat, & folia in Autumnum servat: Iunio autem floret cum Liliis.

CUM in Belgicam amicis mitteret hunc bulbum Franciscus de Holbeque Regis Hispania hortulanus in Aranjoes, adscriptum erat Hyacinthus flore coloris cerei & terreni. Et sine dubio inter Hyacinthos censendus est.

Bulbi varij à  
Francisco de  
Holbeque ut  
Belgicā mitti.

Misit praeterea & aliquot alios bulbos, quorū maxi-

N

mam par-



nam partem (ut Hispania bulbacearum & variarum aliarum stirpium exoticarum maximè ferax est) in

1. Hispanica mea peregrinatione non obseruari: quales sunt: Bulbus quatuor aut quinque flores gestans, in modum
2. dum alba campanula efformatos: Bulbus flore campanula satis magno terram spectante, colore intus luteo, foris
3. ris purpureo: Bulbus flore luteo superiore parte aperto:
4. Bulbus alius flore luteo humili, cui semen simile amores
5. mios (eo nomine Hispanis dicitur Hemerocallis Valē-
6. tina) Narcissus unciifolius flore albo: Narcissus flore
7. caruleo: Pseudonarcissi genus admodum exile: Bulbus
8. montanus ignotus similis Croco siluestri: Tulipa Hispanica
9. monte quodam nascens non procul Aranjoes: &
10. Hyacinthus orientalis Hispanicus.

Tulipa hispanica.

Tulipa quidem istius Hispanica aliquot bulbos aliquando habui: sed unicum omnes folium duntaxat protulerunt, in quo adeo singulis annis imminuti sunt, ut tandem perierint: bulbus non erat absimilis Mompellianae tulipae, sed paulo minor, folium etiam aequale: florem autem illi forma similem esse retulerunt, sed qui cum luteo purpurascentem colorem admixtum haberet.

## DE HYACINTHO COMOSO BYZANTINO.

### CAP. XV.

Hyacinthi comosi byzantini historia.

QUATERNARIA, quina, aut sena habet folia, humi interdum fusa & expansa, nonnunquam solummodo procumbentia, oblonga, Hyacinthi primi Matthioli foliis fere similia, sed latiore cuspidē, & in lateribus tenui veluti lanugine obsita, praesertim circa folij exortū, gustu ingrato: è quorum medio pedalis aut amplior interdum nascitur caulis, teres & rotundus, nudus & sine foliis, intus fungosus, foris viridis, lauisque, quem à medio ad summum sexageni aut plures ambiunt flores oblongiusculi,



longiusculi, extrema parte in sex laciniolas divisi, sexque intus staminulis purpureis praediti, in odori, initio candidi, deinde cum marcescere incipiunt, fusci & inelegantis coloris: pediculi quibus flores nituntur, initio brevissimi sunt, deinde paulatim marcescentibus floribus excrecentes, quatuor unciarum aut ampliore interdum longitudinem adquirunt, sic ut totus caulis suis floribus ita expansis onustus, aspergillum non minus referre videatur, quam Hippuris quoddam genus: caulis suprema pars cum florum pediculis purpurascit: incipit autem florere ab imis ut eiusmodi genera: capitula deinde trigona exigua pro planta magnitudine fert, in quibus semen rotundum, nigrum, vulgaris Hyacinthi comosae femine minus continetur: radix rotunda, bulbosa, multis candidis tunicis constat, exteriore subfusca, & basi multis fibris candicantibus fulta.

Ante paucos primum annos Constantinopoli cum alius varii generis bulbis allatus est Mag<sup>o</sup> ac Generoso Dn. Paulo à Trautzon Caesarea aule Marischalco, et eiusdem Ma<sup>ti</sup> Consiliario, qui eius paucos bulbos in suburbano suo alit, ubi mihi primum conspectus est anno 1580. Maij initio florens.

Hyacinthus  
primus Matthioli.

- CETERVM Hyacinthi illius primi Matthioli, siue comosae maioris à quibusdā cognominati, qui in multis orbis Christiani provinciis sponte nascitur, duo per
1. Pannonias genera observare memini. Alterum praecocius latiore folio, crassiore coma, ineleganti tamen, maioreque bulbo.
  2. Alterum angustiore folio, tenuiore coma, laxiore tamen & elegantiore, minoreque bulbo, cuius flores coma proximi, ex caruleo purpurei eiusdemque cum coma coloris sunt, qua nota in priore desideratur: praecocius Maio, alterum Junio floret.

SIMI-

SEMINA porro ex Hispaniis anno 1575. Hyacinthi orientalis hispanici nomine misso (cuius tamen duo genera esse deprehendi, cum unum minutius esset Hyacinthi comosi maioris amulum, alterum crassius, Muscari semini perquam simile, quæ adeo causa fuit ut separatim sererem) Vienna Austria nata sunt planta bulbacea, quæ nobis tandem duo Hyacinthi comosi maioris genera dederunt, à vulgaribus florum coma non differentia, nec etiam foliis, nisi quod alterius folia latiora Muscari foliis proxima sunt, & ineunte vere primum emergere solent, alterius verò angustiora, oblongioraque, etiam ante hiemem.

Hyacinthus  
comosus ma-  
ior Hispani-  
mine natus.

MEMINI & nos in Belgica alere Hyacinthum comosum flore albo obsoletiore, qui nulla aut perpussilla coma præditus esset.

Hyac. comos.  
flore albo.

Illud autem peculiare in nonnullis, ut flores præmaturi nigrum seu fuliginosum pollinem excussi spargant vitilagini fere similem. Semen in omnibus rotundum, nigrum, Muscari seminis propemodum amulum.

Quo nomine prior à Turcis missus sit, me latet: cum Muscari bulbis permixtum fuisse arbitror, propter comæ & florum cum comoso similitudinem, comosum Byzantinum cognominavi: vulgarem utrumque appellant Ungari Kygio hagma, id est, serpentinam cepam.

## DE BULBO ERIOPHORO.

### CAP. XVI.

Hic est ille bulbus, cuius florem tam diu Belgica videre desideravit. Nam cum primum nacti munere amplissimi viri Jacobi Antony Cortusi patricij Patavini, plurimis annis summa diligentia istuc excoluimus, ut in maximam amplitudinem excreceret, & seminum



in modum admitis propagaret, adhibita etiam omni cura (subinde mutatis terræ generibus) ut ad florum generationem perduceremus, sed operam insumimus.

Et postquam accessit illustrium quorundam Venetorum qui ad nos perscripserunt testimonium, eius florē (tamen si plus decennio hunc bulbum in suis hortis coluerint) nunquam conspexisse, factum est, ut sterilem esse matris natalibus, neque florem aut semen proferre arbitramur, præsertim quando id vitium numerosa macleorum sobole abunde compensaret. Verum aliter rem se habere, anno 1575. mense Maio deprehendi.

Bulbus erio-  
phorus rarif-  
simè florens.

Nam cum præcedente cum annu. & bruma aliquot eius bulbos Mulcati maioris nomine cum plerisque aliis rarissimis plantis, Constantinopoli rediens attulisset Dn. Philebertus de Bruxella S. C. M<sup>us</sup> dapifer p. m. & ex illis nonnullos pro nostra amicitia mihi dedisset, partem ipse terra concedidi, partem in pensili horto C. V. D. Joannes Aicholzius medicus & professor Viennensis: mihi omnes perierunt, ille vero duos conservavit, quorum alter etiam floruit non sine ingenti meæ letitia, quam omnibus rei herbariæ studiosis istius bulbi ad viam expressa delineatione à peritissimo artifice Martino Rota S. C. M<sup>us</sup> sculptore, atque descriptione in Appendice ad Hispanicas observationes illo ipso anno testatam esse volui, quam nos hic denuo repetemus, quoniam ab eo tempore illius florem nunquam videre nobis contigit, licet ipsum bulbum adhuc alamus mira fecunditate plurimas soboles procreantem.

SYNT. ergo. Bulbo erio-phoro multa oblonga folia, Hyacinthinis fere similia, minus carnosæ & succulenta, duriora tamen, viridia, mucronata, sapore ingrato, quibus minutissime etiam confractis, tenuia quedam fila instar tela aranearum diduci possunt. Ex horum

Bulbi erio-  
phori histo-  
ria.

medio caulis exit cubitalis aut amplior, rectus, Scillini caulis emulus, lanis, nudus, virescens, superiore vero parte ad caruleum colorem tendens: in summo veluti oblongam ac densam fert spicam in denos vel plures versus, ante quam explicetur, distinctam, primū viridem, sed paulatim (dum sese explicat in flores) caruleum colorem contrahentem: flores senis foliolis stellatim expansis constant, triangulo umbone in medio protuberante, Hyacinthi autumnalis floribus propemodum similes, in odori, colore cum suis pediculis caruleo & internis staminibus, quorum apices initio purpurei sunt; &, ubi sese explicarunt, veluti pallescente quadā farina aspersi. Incipit florere ab imo, uti Scilla solet, & reliqui magna ex parte bulbi, qui flores racemi aut spica in modum confertos habent. Semē etiam observare volumus: sed flores admodum caduci, statim marcescere cœperūt, & relictis in caule tantum pediculis deciderunt. Radix crassa & bulbosa est, ex plurimis tunicis contexta, alba, tomentosa, & veluti aranearum telis obsita, multos circa latera natos bulbos habens, & crassis oblongisque fibris nitens.

ἐριόφορος.

Εριόφορος, Laniferi nomen huic bulbo inditum, ob tomentū copiam, quod lana modo in stamina diduci potest.

Solus Theophrastus inter Veteres lib. 7. Histor. plant. cap. 13. eriophori meminit bulbi, eum in litoribus nasci, lanāque sub primis tunicis habere, ex qua toga & alia vestes conficiantur.

Eius testimonium adfert Plin. lib. 21. Naturalis hist. cap. 2. Addit Theophrastus, quod internum est in eo bulbo, mandī: cuius nullum fecimus periculum.







## DE MUSCARI.

## CAP. XVII.

Ex Constantinopoli vicinis hortis ultra Bosphorum in Asia sitis primum nostrae Europa communicata est hac planta, quae ob suavissimum odorem silentio premenda minime fuit.

Muscari histo-  
ria.

HABET autem quina aut sena oblonga folia, per terram diffusa, & hac illac sine oblique inflexa, canaliculata, satis crassa & succulenta, Hyacinthi comosi maioris, sine primi Matthioli foliis perquam similia, quae cum primum germinant, purpurascunt nonnunquam, interdum albescent, & aliquando palcherrimo rubro colore nitent. Ex horum medio caulis verno tempore erumpit satis crassius, rotundus & nudus, sed admodum infirmus pro sua crassitie: hunc à medio ad summam ferre racematim coherentes ambiunt flores, vrceolis propemodum similes, initio interdum purpurascences aut virides, deinde ex purpura virentes, aut ex virore albicantes, nonnunquam subcaerulei, aliquando nigricantes initio, deinde pallidi, qui marcescere incipientes gratissimum moschi fere aut aromaticum odorem referunt, licet qui flavo colore est, gravior quidpiam, & narcissinum quodammodo spiret: intelligo & niveo omnino flore, atque etiam egregie rubente inveniri, quos sane mihi videre nondum contigit. Omnibus succedunt praegrandia, triquetra, & veluti pinnata capitula, in quibus semen continetur nigrum, rotundum, magnitudine orobi, aut illi Hyacintho primo iam memorato ferpe omnino simile, qui veluti coma ex caeruleo purpurascens staminibus constantem summo caule gerit. Radix subest magna, albicans, multis tunicis ceparum more contexta, & frequentibus crassis fibris ex una sede pro-



deuntibus firmata, perennibus, nec singulis annis marcescentibus et pereuntibus uti Hyacinthorū, Narcissorum, Tuliparum & Liliorum fibra. Ab imo flores explicare incipit, quemadmodum precedens.

Ad Hyacinthi genera proculdubio referri debere hanc plantam, nemo est mediocriter in Botanico studio versatus, qui non agnoscat. Eius primam notitiam amplissimo viro Iacobo Antonio Cortuso etiam acceptam referimus, qui eam <sup>1</sup> viro Dn. Joanni de Brancion p. m. summo meo amico, ante multos annos in Belgicam misit Tibcadi nomine.

Clariss. Matthiolas eius iconem omnium opinione exhibet Comment. in Dioscorid. cap. de Bulbo vomitorio, nulla tamen addita descriptione.

Constantinopoli verò (unde primum eò perlata fuerit adhuc ignoramus) semper missa fuit nunc Muscati, nunc Muschoromi, nunc Muscurimi appellatione, ob insignem videlicet odoris suauitatem, qui ad eorum pastillorum fragrantiam, qui ex benjuin aliisque odoratis fieri solent, quodammodo accedere videtur.

## DE HYACINTHO BOTRYODE.

### CAP. XVIII.

SPONTE passim plerisque Pannonia locis nascitur Hyacinthus ille Hispaniis & Gallie Narbonensi vulgaris, quem ego à floribus in racemi modum extremo caule congestis <sup>2</sup> botryodē cognomino, nonnulli comosum minorem appellare malunt: Germani Hunds knoblauch/ id est caninum allium vocant.

1. EIVS duo inveniuntur genera: unum crassioribus longioribusque foliis, florumq; racemo oblongiore, densiore, & odoratiore: alterum minora omnia habet, & vulgarius est. Istorum autem flores saturum admodum colo-

Tibcadi.

Bulbus vomitorio.

Muschoromi.  
Muscurimi.

Hyacinthus  
botryodes  
Hyacinthus  
comosus minor.





dum colorem habent, & quasi nigrum.

EST verò & tertium genus breuioribus latioribus-  
que foliis & firmiteribus, quæ humi uti superiorum dif-  
fundi nō solent, sed erecta sunt: huius flores licet superio-  
ribus forma similes, longe aspectū elegantiores, dilutioris  
purpure, atque in ceruleum tendentis colore præditi  
sunt. Id genus sponte hic non nascitur, sed ex Tyrolensi  
comitatu delatum esse fertur.

Similes porrò omnino planta non modò Viennæ, sed  
etiam antè in Belgica è semine Hyacinthi botryodis flo-  
re lacteo, & è nino purpurascens (etenim binæ eius in-  
ueniuntur differentia) nata sunt: & inter illas una que  
ramosam protulit unam, hoc est, quæ una in modū plu-  
res congestos habuerit racemos, alios aliis minores &  
graciliores.

VERVM Hyacinthus βοτρυώδης flore lacteo, à su-  
perioribus florum forma minime differt, sunt enim con-  
cavi et tumentes, at vel nulla, vel perquam exigua odo-  
ris gratia commendabilis. Is etiam in duas species di-  
stingui potest.

Una enim lacteum omnino florē habet, caulem exal-  
bidum foliaque dilutius virentia & quasi palleſcentia.

Alterius flos nunc quidem colorem habet, sed cui  
leniter perfusa videatur tenuis quadam & dilutissima  
purpura, quæ vetustate & marcescente flore intensior  
redditur: caulis è viridi purpurascit, folia viridiora  
sunt, & infima parte quodammodo purpurascens.  
Omnium semina in triangulis quibusdam vasculis con-  
tinentur, rotunda, nigra, exigua; & omnium radix seu  
bulbus plurimos exiguos nucleos in ambitu deponere so-  
let, nulla tamen abundantius quàm duorum priorum.  
Omnes florent Aprili, interdum etiam Maio.

Lactei prior species olim nobis communicata à C. V.

Alphonso

Hyacinthus  
ceruleus e la-  
cteo.  
Hyacinthus  
botryod. ra-  
mosus.

Hyacinth. bo-  
tryod. flo. la-  
cteo.



*Alphonſo Pantio: altera ab Ampliſſ. Cortuſo Dipcadi* Dipcadi alb.  
*albi nomine.*

**CETERVM** in proximis *Vienna ſiluis atq. etiam* Hyacinthus  
Stellaris.  
*in Pannonia ſupra Nemethwywar qua iter Gratium*  
*eſt ad villam Kerthwelyes, vulgaris eſt is Hyacinthus,*  
*qui à floribus radiatim expaſis, & in ſtella formam de-*  
*cuffatis, ſtellaris cognomen, apud rei herbaria ſtudioſos*  
*inuenit: ſed is duntaxat qui caruleo flore eſt, albo enim*  
*nondum videre contigit. Maturius reliquis floret, & in*  
*triangulis vaſculis ſemen fert, non atrum ut cetera ge-*  
*nera, ſed fucum duntaxat & veluti fuligine infectum.*  
*Matronæ Viennēſes Blato Baldozian nuncupant, qua-*  
*ſi caruleum Lilium conualium.*

## DE SCORODOPRASO.

### CAP. XIX.

**SCORODOPRASI** duo genera inter ſe differen-  
*tia in his Prouinciis obſeruaffe videor.*

**MVLTa** oblonga & lata fert *Primum folia, por-* I.  
*raceis maiora, carinata, caulem verò ſeſquicubitalem,* Scorodopra-  
ſum 1.  
*aut bicubitalem interdum, digiti craſſitudine, ſuperiore*  
*parte nudum, ſerentem in ſummo caput membrana in-*  
*uolutum ut cepa, quod explicatum multos flores ſimul*  
*cōgeſtos oſtēdit cepaceis ſimiles, ſex ſoliis exalbidis con-*  
*ſtantes: quibus ſuccedunt trigona capitula, in quibus ſe-*  
*men nigrum cepæ ſemini par: radix ſubēſt craſſa, exi-*  
*gua cepæ magnitudine, multis albis tunicis cōſtans, qua*  
*ſeſſili parte copioſis candidis fibris pradita eſt, & vetu-*  
*ſtate in alios maiores bulbos ſeſe diuidit, atque alios mi-*  
*nores in lateribus adiunctos habet, mediꝝ inter allium et*  
*porrum, grauiſque odoris. Floret Junio & Iulio.*

**BICVBITALEM** habet alterum caulem, multis II.  
*ab infima parte ad medium uſq. porraceis foliis priore* Scorodopra-  
ſum 1.  

O

*angſtiori-*





angustioribus circumdatum, odore inter porrum & al-  
 lum medio: reliquam caulis partem nudam, viridem,  
 lauem, sustententem in summo caput ex multis bulbis,  
 uti in *Moly* indico, congestum, & candicante mem-  
 brana oblongamque viridem cuspidem habente tectum,  
 qua deinde bulbis excrecentibus rumpitur, nudosque  
 bulbos initio purpurascens, deinde exalbidus detegit,  
 inter quos flosculi quidam enascuntur: ea caulis extrema  
 pars, cui caput innititur, initio sese cum suo capite con-  
 uoluere solet, ut serpentis oborto collo similitudinē quo-  
 dammodo referat, deinde paulatim sensimque sese expli-  
 care incipit, donec eadem caput erigat & sursum attol-  
 lat: radix ex multis nucleis simplici aut duplici tenui  
 membrana inuolutis constat, multisque exalbidis fibris  
 sessili parte donata est.

Iunij initio suum caput contorquet, Iulij verò erigit,  
 eodemque mense bulbos ad maturitatem perducit, qui  
 terra crediti plantas sui generis procreant.

Primi generis pauci bulbi Ornithogali arabici bulbis  
 admixti Byzantio primū allati sunt paulo post quā  
 Viennam apputissem, quorum unum aut alterum Ill.  
 Dn. Joanni de Brancion misi, cum alterius generis ali-  
 quot bulbulis, unico quem seruauerā mirum in modum  
 sese hic propagante, ut multis successu temporis commu-  
 nicare potuerim. Eum apud Turcas esse in deliciis, mihi  
 aliquando retulit Ill. Dn. Augerius de Bousbeque.

SUNT qui secundū genus ὀφιοσκόφοι appellent, quod <sup>ὀφιοσκόφος</sup> caput cum suprema caulis parte serpentis modo contor-  
 queat.

## DE ALLIO SEV MOLY MONTANO.

### CAP. XX.

VARIA in uis Prouinciæ montibus inueniuntur  
*Ally* siue *Moly* genera, vel foliis, vel floribus, vel capi-  
 tibus in-



tibus inter se discrepantia: quorum maximam partem ab aliis hactenus minime observatam fuisse existimo.

PRIMUM caulem habet duorum cubitorum altitudine excrescentem, quem ad medium usque ambiunt folia, multo quam Alii generibus latiora, oblonga, porraceis proxima: summo cauli, qui laevis & iunceus est, insidet caput è multis bulbis ex atro purpureis simul congestis satisque crassis conflatum, inter quos in oblongis pediculis nascuntur flores dilute purpurascētes quibus succedunt trigona vascula in quibus semen: radix crassa bulbosaque ex multis nucleis constans, numerosis albis fibris praedita est: sed et bulbuli rotundi radici adherent in fere similes qui in capite nascuntur. Toti planta Alii gravis odor inest. Junio & Julio floret & bulbos fert.

I.  
Moly montanum latifolium.

CVBITALI assurgit Alterum caule, laevi, rotundo, viridi, in quo terna plerumque folia, superioris folio angustiora, & veluti graminea: summus caulis sustinet caput duabus laxis membranaceis tunicis oblonga cauda insignitis obvolutum, quibus sese aperientibus, multi exigui bulbi simul congesti apparent, inter quos flores, sex purpurascētibz foliolis praediti, & oblongis pediculis inherentes dependent: radicem habet rotundam candidam, oblongis albicantibusque fibris capillatam.

II.  
Moly montanum graminico folio.

EADEM excrescit Tertium altitudine, totidemque folia habet, iunceae, viridia, caulem supra folia laevem, rotundum, viridem, sustinentem inter duas etiam membranaceas tunicas oblonga cauda insignitas, caput è multis exiguis bulbis è colore viridi puniceis, & in oblongam herbaceam cuspidem plerumque desinentibus, confertimque nascentibus compactum, inter quae dependent in oblongis tenuibusque pediculis flores superiori forma & magnitudine similes, ex albido tamen colore,

III.  
Moly montanum iunceae folio.

quorum





quorum media foliola secundum longitudinem et utraque oras vena obsoletè purpurascens notat: radix etiam rotunda est, candicans, & oblongis albicantibusque fibris prædita est.

## IIII.

Moly mont.  
flo. pallido  
odoro.

HABET & hoc terna folia iunceæ, caulē etiam cubitalem, rotundum; cui insidet caput duabus membranæis tunicis caudatis conclusum, quo utrimq. dehiscēte, magna explicatur coma florum ex oblongis pediculis dependentium, qui sex pallidis foliis constant, totidēque staminata cum medio stilo obtinēt, qui cum suo caule resecti & in cubiculum illarū suavisissimi odoris (qualis in floribus Cyclamini percipitur) esse deprehenduntur: iis succedunt trigona capitula, in quibus semen nigrum, planum, Caryophylleorum semini non multum absimile: radix globosa est, superiori similis, & similiter capillata, nucleos interdum in lateribus deponens.

## 2.

Moly mont.  
obsoletiore  
flore.

Alia inuenitur eius species, pari propemodum altitudine excreſcens, similibusque propemodum foliis prædita, cuius coma inter laxas membranæasque & oblonga cuspidē præditas tunicas late sese explicat, plena floribus coloris admodum obsoleti: radix superiori similis, nucleos etiam in lateribus proferens.

Trium istorum radix allium subolet, at folia minime, sed herbaceum quendam potius odorem referunt.

Duo priora, hoc est alterum & tertium, in serie montium qui ab Alpibus ad Danubium supra Viennā excurrunt, sponte nascuntur: id verò quod odorato est flore, circa Posonium, & locis Nickaspurg in Moravia vicinis. Florent autem omnia Julio.

## V.


Moly mont.  
purp. elegan-  
tiss. flore.

PARI altitudine assurgit Quintum, caule nudo, viridi, paucis oblongis tenuibusque foliis obsito, viridibus, cui insidet caput orbiculare, è multis floribus breui pediculo præditis congestum, qui sex foliola nunquam sese expli-









se se explicantia habent, cum aliquot staminibus stiloque medio, colore purpureo eleganti: radix bulbosa, nucleos interdum in lateribus tenui membrana tectis proximè caulem deponens, & sessili parte multas albicantes fibras habens. Caput ferit ally modo eius odor.

Circa Posonium id duntaxat observavi, ad vinetorum in collibus sitorum margines secundum Danubium. Floret Junio, interdum etiam Maio.


DE ALLIO SEV MOLY NARCISSINIS  
foliis. CAP. XXI.

ALLII odor facit, ut bira ha stirpes ad Ally sine Moly classem non inepte meo iudicio referri possint.

- I. Moly Narcif. fin. maius. PRIOR quina aut sena ex radice promit oblonga folia, plana, succulenta, Narcissi serotini foliis similia, viridia admodum & splendentia, inter qua cubitalis plerumque nascitur caulis, nudus, firmus, viridis, striatus, ferens in summo multos flores sex foliolis purpureis constantibus, totidemque intus staminulis praeditos, simul coëstos, & veluti globosum caput constituentes quemadmodum in cepa, quibus succedunt trigona capitula, qua maturitate debescunt, semen rotundum, nigrum, continere deprehenduntur: radix bulbosa & candida est, multis tunicis circumnoluta, multisq. albis fibris praedita, nodosa, & adnatis se se feliciter propagans.

Aliud eius est genus fere simile, foliis mollioribus, et magis cinereis, floribus etiam dilutioribus. Floret utrumque sub finem Junij & Iulio.

- II. Moly Narcif. fin. minus. HABET & Secunda folia quina aut sena superioribus non minus lata, sed breviora, nonnihil se se contorquentia, viridia & splendentia, inter qua pedalem caulem promit superiore graciliorem, sed non minus firmum, & striatum, qui in summo ex membranacea tunica promit multos





multos flosculos in orbiculare fere caput simul congestos, prioribus similes, sed elegantiore purpura nitentes: capitulis & semine superiori respondet: similiter & radice, quæ nodosa est, & adnatis in circuitu non infelicius priore sese propagat.

Illius etiam genus inuenitur longioribus & angustioribus foliis neque adeo conuolutis, cauliculis paulo infirmioribus, floribusque multo dilutioribus, in reliquis satis conueniunt.

Vtraque hæc species serius priore genere floret, nempe Iulio & Augusto. In omnium radicibus illud peculiare, ut ramosa tandem & obliqua fiant, vestigia caulis præcedentibus annis nati impressa habentes, uti Polygonati radices, sed non adeo laxæ.

Nascuntur omnes hæc planta in Leytenberg supra Manderstorf, & aliis montibus urbi Vienna vicinis.

SECUNDO generi similes Vienna mihi nata sunt semine Lutetia misso anno 1576. à doctissimo viro Nicolao Rasio p. m. Galliarum regis cheirurgus, Bulbi vomitorij nomine, quoniam facile vomitum ciēt eius radix præmāsa. Eodem etiam nomine in cultissimo & amplissimo suo horto Cassellis alit Illustrissimus Princeps Wilhelmus Landgravius Hassiæ &c. Non desunt tamen, qui Plinij Alum, quod Natural. Histor. lib. 19. cap. 6. in aruis sponte nasci scribit, esse velint: sed cum eius formam non describat, & Alij genus duntaxat esse dicat, certi quidpiam statuere difficile est.

Bulbus vomitorius.

Alum Plinij.

DE VICTORIALI LONGA VVLGO nuncupata. CAP. XXII.

AD Alij etiam genera haud dubiè referenda est hæc planta, ut odor ipsius indicat,

CVIVS caulis cubitalis est digitali crassitudine, fungosus,

Victorialis longa historia.



fungosus, infima parte purpurascens, supernè viridis & striatus, numerosos in summo ferens flosculos, oblongis pediculis inherentes, senis candidis foliolis stellatis constantes, ceparum floribus similes, senis intus staminulis stiloque præditi: deinde trigona capitula in quibus semen, per maturitatem nigrum, rotundum: folia bina aut terna caulem circa mediam partem amplectuntur, & quasi vestiunt, nervosa, oblonga & lata, Gentiane maioris foliis fere similia: radix oblonga, extrema parte bulbosa, multisque validis & perennibus fibris donata, multiplici cortice variis fibris transversim coeuntibus constante, & quodammodo reticulato involuta, que feliciter adnatis singulis annis se propagat, fibris adeò implicatis, ut difficile sit bulbos coniunctim natos & coherentes ab invicem seiungere.

Nascitur copiose in scopulis Durrestein, duobus supra Gamingam miliaribus, & montanis pastoribus Ianlauch dicitur, quibus magno in usu est aduersus corrupti aëris & nebularum exhalationes. Invenitur & in montibus qui Bohemiam à Silesia determinant, ubi Diegwurtz à Germanis appellatur, quoniam qui effodiendis metallis operam dant, magnas certasque illius facultates se experiri prædicant, ad munendum sese aduersus impurorum spirituum insultus, à quibus frequentissimè impetuntur: unde etiam Victoralis nomen ab effectu inditum cõtendunt. Matthiolus Allium anguinum vocavit.

Allium anguinum.

Iosias Simlerus Allium alpinum nuncupat, Sigwurtz & Sibenhamkorn/ ab involucris quibus tanquam reticulo radix involuitur.

Allium alpinum.

Vulgus herbariorum Victoralis longe aut maioris cognomen dedit, ad Gladioli differentiam, cuius radicem, ob corticis, quo integitur, cum superiore similitudi-

P

nem, Vi-



Victorialis  
rotunda  
Allij vrsini  
folia.

nem, *Victorialem* rotundam & parvam appellant.

Lilium con-  
uallium.

CUM *Victorialis* longæ foliis magnam similitudinem habent *Allij vrsini* folia, licet molliora & teneriora. Frequentissimum id est in omnibus Pannoniæ & Austriæ umbrosis siluis, coniunctim plerumque cum lilio conuallium nascens, quod Austriaci *Wepfle baldzian/Vngari zent györgy veraga*, hoc est *S. Georgij flore* & *Gyewngy wyrag* nuncupant.

Xyphion mi-  
nus.

QUONIAM porro *Xyphij*, siue *Gladioli* mentionem fecimus, multis Pannoniæ & Austriæ pratis, & nonnunquam ad silvarum declini loco sitarum margines frequens est *Xyphion minus* flore rubro, quale in Hispaniis & Narbonensi Gallia inter segetes nascitur.

## DE CROCO VERNO MÆSIACO

### CAP. XXIII.

SÆPIVS miratus sum, nec in vicinis huic urbi Viennæ montibus, nec in Pannonicis, ullum *Croci verno* tempore florentis genus inuenisse, tametsi diligenter perlustrarim: cum *Heluetica Alpes* aliquot eius genera sponte alant.

Tandem successu temporis, diligentia *Stephani von Hausen*, nunc in familia *Generosi Dn. Friderici Brainer*, *Cæsarei ad Turcarum Imperatorem Legati*, *Constantinopoli* agentis, qui anni 1579. initio *Generosum Dn. Ulrichum à Khunigsperg*, honorarium eò ferentem comitatus fuerat, unum videre contigit, non hic reperi- tum, sed in *Serua* siue *Mæsia superiore* sub *Belgrado* cum suo flore erutum mense *Martio*, dum *Byzantio* *Viennam* rediret, quo itinere etiam sub *Buda Fritillariam*, cuius supra memini, florentem obseruauit.

Croc. vern.  
flauo flore.

Ex his porro quos ille *Viennam* retulit bulbis, binos habeo, qui huius anni 1583. mense *Martio* eleganter floruerunt,



floruērunt, diuerso tamen ab iis planè colore, quos in Hispanicis obseruationibus descripsi: nam qui in illis vel niueus omnino, vel purpureus, aut versicolor est, in his flauus conspicitur. Vnum autem Generosus Dn. Wolfgangus Christophorus ab Entzeßtorf superiore Autumno mihi donauit: Alterum ipsius Stephani munere accepi, sed cuius nunc duntaxat florē conspexerim.

- I. PRIOR inter folia primū terra emergentia, quæ proximè ad Croci satini, seu potius montani Theophrasti, cuius historiam in Hispanicis obseruationibus & iconem dedi, folia accedunt, paulo tamen breuiora sunt, albo neruo secundum longitudinem media secante, vnum aut alterum, nonnunquam tertium & quartum florem promit sex foliis, interdum etiam pluribus constantem, orbiculato propemodum mucrone, coloris planè aurei, utcunque odoratum, tria oblongiuscula latiusculaque stamina dilutius flauescencia intus continentem: cui succedit, ut in alio Croco verno membraneum oblongiusculum & triangulare capitulum, rotundo rufoque semine plenum: radix cum alterius Croci verni radicibus conuenit, quæ quodammodo plana, solida, aliquot tunicis obuoluta, atque candicantibus fibris sessili parte donata est.
- II. INTER Alterius etiam folia primū terra pullulantia, quæ superioribus paulo latiora videntur, exit flos sex etiam foliis constans, minus tamen orbiculatis, sed quodammodo mucronatis, colore autem non aureo, at omnino pallida, viridibus venulis exteriorū foliorum ungues foris distinguētibz: cetera nota conueniunt.

#### DE DENTALI. CAP. XXIIII.

Dentalis hi-  
storia.

HVC planta prodeunt initio bina plerumque folia, rarò terna, mutuo se amplectentia & florem occultantia (quandiu





(quamdiu enim florens non est prolatura, unico duntaxat, Tuliparum more, praedita est folio) liliaceis proxima, breviora tamen, & magna ex parte latiora, ad Allij ursini foliorum formam valde accedentia, at crassiora & magis carnosâ, multis magnis maculis ex atro purpurascensibus aspersa, basi angusta, paulatimque in latum extensa, deinde sensim in mucronem desinentia: explicatis foliis, flos sese conspiciendum praebet, dodrantali pediculo enodi & vacuo purpurascensq. inmutens, sex foliis oblongiusculis constans, eleganti dilutioris purpureae colore, deorsum inflexus & spectans, qui tepore aëris Solis radiis excalescenti sese explicat, foliaque sursum reflectit floris Cyclamini modo, senis intus staminibus purpureis, stiloque candido trifulco, nulla odoris gratia placens, sed sola elegantia commendabilis: flori succedit capitulum trigonum, continens aliquot semina Leucoybulbosi praecocis alterius seminibus fere respondentia, sed oblongiora gracilioraque, & colore flavescente: radix oblonga, infima sede crassior, multisque candidis fibris stipata, paulatim superiore parte gracilescens (unde caulis emergit summa tellure, ut dictum est, bina folia proferens) & appendice quadam plana unica aut pluribus donata, quae veluti radicum superioris anni & praecedentium aliquot vestigia sunt. Unicum etiam duntaxat producit folium haec planta, quamdiu nullum florem prolatura est.

Nascitur copiose ad quorundam montium radices solo herbido & vdo in Styria non procul Grätzio, eius provincia metropoli & Ser<sup>mi</sup> Archiducis Austriae Caroli regia.

Adfertur etiam ex Apennino Italia, solo floris colore ab hac differens, qui totus lacteus est, aut mixtis ex purpurascens alboque coloribus constat, qualem cum à

*C. V. Ulyffe Aldrouando totius Naturæ miraculorum scrutatore diligentissimo, & Medico excellentissimo, tum ab ampliff. Viro Iacobo Ant. Cortuso Patrio Patauino in Belgicam nobis missam memini, ut et similis planè cum hac coloris in Allobrogũ montibus erutam a Walerando Donrez.*

*Floret Aprili, interdum etiam maturius, præsertim in hortis reposita, frigoris admodum patiens.*

Pseudohermodylus  
dens caninus.  
Satyrium erythron.

*VVLGO à Styriæ medicis & pharmacopœis Dentali appellatur, à nonnullis rusticis Schoßwurtz. Ex Italia Pseudohermodyli & Dentis canini nomine missa fuit; ex Allobrogibus verò Satyri erythroni, quæ etiam appellatione noster Lobelius in Aduersariis & Observationibus usus est.*

*Styriacas mulierculas radices exiccata pollinem pulvis puerorum inspergere solere ad enecandas tenebrasque ventris tineas, mihi relatum est. Ex vino autem haustum, mirificè colic dolores mitigare expertus est doctissimus vir Thomas Haustain Ser<sup>mi</sup> Archiducis Caroli primarius medicus, qui plures eius bulbos nò semel Viennam usque mihi misit: insuper corporis vires reficere & nutrire; ex aqua verò pueros epilepticos innuare.*

## DE CYCLAMINO ODORATO.

### CAP. XXV.

*VT Superiior non nisi nouo Vere folia promit, & flores simul explicat: sic contra Cyclaminus non nisi Autumni initio flores suos producit, & statim folia, quæ postquam tota hieme perstiterunt, sub Aprilis finem, aut Maio euanescere solent. Eius autem in his prouinciis duæ obseruantur differentie.*

Cyclamini  
flore odorato  
historia.

1. *Vna etenim ex globulari radice tenuibus nigricantibusque*

*búsque fibris pradiſa, multa circinata propemodum rotunditatis proſert folia, Afari foliis fere reſpondentia, non adeò tamen cráſſa, ſuperne virentia, infernè purpuraſcentia, humi iacentia & expaſa, flores in oblongis pediculis unico folio ſed in quinq. profundas lacinias diuiſo, ſic vt plura videantur, conſtātes, quæ ſurſum, cùm ſeſe explicare incipiunt, reſlectuntur, nūc dilutius, modò ſaturatius purpuraſcentes, odoris ſuauiſſimi, qui cùm euaneſcere incipiunt, integri decidunt, capitulúmque ſubſequitur ſe, cum pediculo cui inſidet, in multas ſpiras conuoluens, donec terram attigerit, cui incumbens paulatim augeſcit, donec viola martia ſeminariũ vaſculum magnitudine aquet, quod maturitate ab extremo mucrone aperitur, ſeménque oſtendit inaequale ex fuſco purpuraſcens, quod terra commiſſum non in germen abit, ſed in tuberculum aut radiculam conuertitur, prater reliquorum ſeminum naturam, unde poſtea foliola promit.*

*Alteri illi planè ſimilis eſt; pauciora tamen ſemper 2. proferre folia conſpicitur, eaque non purpuraſcentia ſubtus, at ex viridi quodammodo albicantia & pallentia, vt i aſarina.*

*Nulli ſunt harum provinciarum montes ſiluoſi, nulli ſáltus, aut interdum etiam in montium accliuibus vda prata, quæ iis non abundant, ubi varia magnitudinis radices eruuntur, tanta interdum vt manum implere queant, quæ plerumque magis ſcabro ſunt cortice, quam iuniores aut quæ intra mediocritatem conſiſtunt, habéntque nonnunquam varios quaſi cauliculos unde folia & flores ſingulis annis emergunt, qui etiam confracti & terra reconditi, in globularem radicem eſformantur & tráſeunt, ſingulis etiam annis folia & flores producentes. In montibus autem ſaxoſis aut rupibus*



qua Pinastrorū siluas alunt, non sine difficultate eruere memini qua digitalem crassitiem non superarent, sed in cubitalem nonnunquam longitudinem excreuissent, subinde in nodos (ubi scilicet paulo laxiores petrarum fissuras naſtae erant) extuberantes.

Rhizotoma muliercula, qua multas cyclamini radices cum variis aliis plantis Viennam in forum venales adferre solent, Sawbrot appellant, hoc est, porcinum panem, quidam etiam rustici Erdt apfel / id est terra malum, Vngari autem dizno repa, quod porcinum rapum significat.

Cyclaminus  
conſtātinop.

CETERVM superiore Autumno, Generosa Domina de Heysenstein Cōstantinopoli missa sunt cum varij generis bulbis aliquot Cyclamini radices orbiculares, castanea magnitudinem non superantes, cortice admodum terſo & expolito, qua statim ante hiemem (nimirum quod diutius extra terram conſeruata fuiſſent) folia produxerunt Cyclamini nouo vere primum emergentis et florentis foliis fere ſimilia, prona parte pulcherrimè purpuraſcentia, & ſupina maculis candicantibus inſignita, ſed non adeò frequentibus angulis prædita. Cuius generis ſint, proximum ver, ut ſpero, nos docebit. Ei qui illas emit, tametſi Cyclamini eſſe agnoſceret, pro Viola martia flore rubro à Turca qui vendeſat libenter obtruſa fuiſſent. Hic menſe Martio 1582. dum mearum obſervationum deſcriptionem abſoluo, floruit, ſed ſubſequens gelu flores corruptit: itaque vernum eſſe non dubito.

Cyclaminus  
verno tēpore  
florens.

II. HABEO autem Cyclamini verno tempore florentis pauculas plantas ſemine ex Belgica mihi miſſo natas, qua iam ante biennium protulerunt flores odoratiſſimos ſanè, & ſaturatiores vulgari, atque paulo graciliores, folia in ambitu quodammodo criſpa, & foliorum hederæ forma

forma propemodum, minora tamen, supina parte candicantibus maculis aspersa, angulorum mucronibus albicantibus, prona omnino purpurascens. Primus inter Belgas eam plantam habuit Dn. de Brancion munere Alfonsi Pancij, ex cuius deinde semine in aliorum etiam potestatem peruenit. Sed C. V. Ioannes Boissot aliud <sup>2.</sup> genus alit oblongiore folio, ut mihi, cum ante aliquot annos ipsius semen mitteret, per literas significauit.

HABEO & alium semine natum flore dilutiore, inodoro, foliis hederaceis minimè subius purpurascens <sup>Cyclaminus fol. hederæ.</sup> & supernè per interualla candicantibus, quorum nonnulla ad umbilicum macula alba sunt insignita, alia minimè. Id genus Ioannes Montonus Pharmacopœus doctissimus & diligentissimus, primus in Belgica quadam silua non procul urbe Tornaco obseruauit, cuius radices librales dum Machlinia viderem, & magno rapo æquales, ab ipso nobis missas memini: Illius etiam flos planè interdum albicat & verè carnei est coloris.

At quem noster Labelius apud Insubres flore luteo <sup>Cyclaminus flore luteo.</sup> obseruasse scribit, mihi videre nondum contigit. Quem admodum nec eum de quo mihi aliquando relatum est, parua radice auellanae magnitudine, æstate florem vulgari maiorem proferentem, & nascentem in decliui montis qua faciendum est iter iis qui Roma Florētiam proficiscuntur, ultra pontem Miluium secundum riuum Aque trauerse dictum.

## DE ORCHIDE.

## CAP. XXVI.

VIENNENSI agro & vicinis Provinciis admodum frequentia sunt Orchidum varia genera, quæ in <sup>Orchidæ magnæ varietas.</sup> Belgica etiam videre memini, quarum historiam, cum ab aliis descripta sint, minimè repetendam esse ducimus: sed quæ



sed qua nunquam aliàs mihi conspectæ fuerunt, quâsq. à nemine observatas suspicor, earum porro historiam hoc capite conscribemus, initium ab omnium, quas unquam viderim, maxima facientes.

BINA habet hæc Orchis folia, Hellebori albi foliis I. amplitudine non cedentia, venis aliquot à pediculo ad extremum usq. folium productis similiter insignita, superne virentia, inferne haudquaquam, omnino tamen splendentia: caulem cubitalem, paucis foliolis sine involucris præditum, pentagonum: flores in summo spicatum coherentes, quo autem colore, quâne forma præditi sint, ignoro, cum ante quàm explicarentur, plantam duntaxat observauerim: radices binas, crassas, & parvi napi modo oblongas, supra quas infimo cauli inhaerent aliquot fibrae satis crassæ.

Solū mihi conspecta est hæc orchis Maio mense 1579: in declivi montis in quo extracta est arx Ill<sup>l</sup> Dn. Balthasaris de Batthyán nūcupata Grebén, intra Drauum & Sauum, binis ultra Warasdinum miliaribus.

Illius genus haud dubiè erit, quod non modò in silvis 2. Nemethwywar oppidi eiusdem Ill. Dn. de Batthyán vicinis, sed etiam in Leytano saltu supra Manderstorf observavi, foliis quidem magnis & latis, sed infra superiorum amplitudinem, caule propemodum cubitali, floribus magnis, aliarum orchidum forma purpureis maculis aspersis, galea exalbida florem tegente radicibus geminis, crassis, minus tamen superiore oblongis.

ALTERI plura sunt folia, angustiora, caulis gracilior, pedalis, flores rubri pulcherrimi, quales fere in Belgico illo Orchidis genere videre memini, quod è pratis Louanio vicinis eruebatur.

Crescit in eodem iugo Grebén non procul ab arce, & plerisque gramineis locis, inter flumina, Muram & Drauum

Orchis latifol.  
max.

Orchis latifolia altera.

I I.  
Orchis flore  
rubro elegantissimo.

*Drauum, & apud Sackturnya Ill. Comit. de Zrinio arcem.*

**III.** *TERTIUM* genus elegatissimum, binis crassis bulbis, altero succi pleno, altero flaccidiore, quod in Orchidibus vulgare est: foliis longis angustis: caule interdum pedali, spica florum elegante, odorata, quorum galeola obscura purpura nitet, hiatus cum labro candicant, purpureisque maculis insigniti sunt.

Orchis obscura  
se purpurea.

Inuenitur in pratis Nemetihwyar vicinis, supra Rabam, intraque Muram & Drauum flumina.

**IIII.** *QUARTÆ* quina aut sena sunt, folia, caulis palmaris aut amplior, aliquot minoribus foliis involutus: spica elegantium minutorum florum purpurascens galea tectorum, labro prominulq, in quatuor barbularum diuisa, candido, purpureisque punctis asperso, paruo calcaris à tergo prominente, tenui odore: sub quo, ut in reliquis orchidibus torosum & cōtortum est capitulum exiguum semen scobis instar continens: geminas radices habet parvorum testiculorum modo, alteram plenam, alteram flaccidam, supra quas ex imo caule orta fibra expanditur.

Orchis galea  
purp.

Nascitur ad radices montis Clesensfeld imminentis, binis supra Neapolim miliaribus, at copiosè admodum in montium tenui gramine tectorum accliuibus, supra Radann, Medeling, Baden, & plerisque aliis locis editioribus & siccioribus Vienna vicinis.

**2.** Ei similem erui montibus Grebén proximis, sed longè ampliorem, crassiorèq, & longiore spica.

**V.** *QUINTA* quatuor aut plura folia habet summa tellure diffusa, Belgica orchidis foliis, quæ vulgo in pratis maturè florè purpureum fert, similia, sed nullis maculis distincta: caulem palmarem, aliquot minoribus foliis septum, cuius summum multi flores, exigua galea duobus

Orchis colore  
vario.

duobus foliis constante, tribusque aliis foliis galeam ambientibus, latioréque barba propendente, & calcari obtusiore praditi, spicatumque nascentes exornant, colore modo purpureo saturatiore, modo dilutiore, modo carneo, modo omnino lacteo, barba tamen plerumque nunc exiguis, nunc maioribus saturatè purpura scētibus maculis aspersa, interdum etiam nullis omnino, praesertim in lacteis floribus: semen ut in reliquis orchidum generibus vasculis contortis continetur: radices geminas alteram flaccidiorem superioris anni, alteram succulentam recentiore tegunt multa candida crassiuscula fibra.

Inuenitur passim in pratis Viennae vicinis: similem etiam observare memini superiore anno 1581. in pratis urbi Londinensi in Anglia proximis: ubi & aliam erui grandiore paulo florum purpureorum spica tetrerrimo odore foetidam.

Omnes autem, praeter primam, mense Maio florere solent. Orchis fortissima.

TRIA plerumque habet Sextum genus angusta folia, alioqui reliquis orchidibus similia, viridia, cauliculum dodrantalem, spica flosculorum ex herbido pallentium, tribus apiculis constantium, odore moschi exornatum: radicem unicam, rotundam, pisi magnitudine, supra quam longa propagines exporriguntur, quae nonas subinde plantas generant.

VI.

Orchis pusilla  
pallida odorata.

Exit copiosè in colle monasterio Neuberg vicino; & floret Iunio.

FOLIIS est Lilij primùm nascentibus tribus aut quatuor Septima, dilutiore et quasi pallente virore praditis, nullaque macularum aspergine notatis, ingrati saporis: caulem dodrantalem amplectuntur nonnulla foliola, in cuius summo flores spicatum digesti nascuntur colore

VII.

Orchis ferapias.



colore exalbido, nec ullis punctis distincto, anterieus morionum hiantibus cacullis similes, utrimque auriti, & latiusculo pallido labro propendente, posterius verò corniculum habentes, uti *Consolida regalis*, aut *Linaria*, sed latius & obtusum, grauter odorati, florum sambuci odorem emulantes: ad horum exortum singula foliola nascuntur pallentia, & floribus colore respondentia: radices geminae, veluti palma in binos aut plures digitos distributae sunt, quarum vetustior, fungosa, nigrior & flaccidior est, altera candida, vegetior ac solida, paucis supra earum exortum nascentibus fibris.

Aliud genus est cum forma tum magnitudine illi simile, cuius flores purpurei sunt, & foliola sub floribus nascentia etiam purpurascunt.

Inuenitur utrumq. genus non modò in Leytano saltu supra Manderstorf aliisque Austriae inferioris saltibus: sed etiam editioribus quibusdam pratis Viennensi saltui proximis. Floret autem Aprili, nonnunquam etiam Maio, pro mitiore aut rigidiore aëris vernalis constitutione.

## DE LIMODORO AVSTRIACO.

### CAP. XXVII.

COGNATVM quodammodo est Orchidibus λειμόδωρον, cuius varia genera inueniuntur multis provinciis communia. λειμόδωρον.  
austriacum.

At unum in montanis supra Badenses thermas obseruari, quod nusquam alibi obseruare memini. Assurgit id pedali caule, frequentibus secundum radicem foliolis tanquam vaginulis inuoluto, qui spicam fert florum quatuor foliis constantium, superiore in corniculum desinente, & promuscide quadam inter media folia prominente, cui adnatae sunt duae tenues barbulae: floribus stria-



bus striata & oblonga subsunt capitula, semine exili & orchidum simili plena: radix crassis longisque & obliquis fibris constat, quemadmodum in ea planta qua vulgo Helleborines nomen obtinuit.

Tota stirps saturo purpura & planè violaceo colore pradiata est. Floret Junio.

Similem fere, sed colore multo dilutiore, olim observare memini in silva illa agri Mœpelliani ad monasterium Gramont sub flicibus arboribus.

Orobanchæ.

Rapum geni-  
flæ.

Porro Orobanche illa maior, quam Belga, quoniam ad Genistæ vulgaris radices interdum nascitur, Rapum genistæ cognominant, cuiusque in pulverem trita ex tepido vino hausta presens ad colic dolores remedium esse predicant, passim multis Austria & Pannonia silvis nascitur, atque Vngaris Milè gycerthyâ, id est missalis candela siue ceruus dicitur.

Radix caua.

FREQUENS est etiam in Leytenberg, atque aliis montibus siluosis vrbi Vienna vicinis, multisque Pannonia locis cum circa sepes, tum ad silvarum extremitates inter vepres ea planta quam à radice orbiculata, & subtus nonnihil natura excavata Radicem cauam vulgo nominant: qua vel albo flore, vel carneo rubrove dilutiore quam frequentissime, vel egregie rubente, sed raro conspicitur. At minorem illam Germanicis & Belgicis officinis apprimè notam, quæ cum in Germania passim, tum in Belgica inter vepres et frutices nascitur, nusquam in his provinciis videre memini.

## DE IRIDE.

## CAP. XXVIII.

In Iridum generibus maximam conspiciuarietatem.

NUNQUAM maiorem in vlla planta varietatem observare memini, quàm in Iride. In nullâ etenim provinciam

uinciam institui, quin eius aliquod genus antea mihi non conspectum inuenerim, uti ex mea Hispanicarum stirpium historia videre licet, et ex hoc etiam capite deprehendi poterit: in quo nonnullas etiam frides describere animus est, non hic quidem sua sponte nascentes, sed Constantinopoli aut ex Illyride primum meo tempore huc delatas, & postea Viennensium hortorum inquilinas factas, cum iis quas variis Pannonia & Austria locis eruimus.

A maioribus autem latifoliis initium faciemus, deinde ad humiliores easque tamen latifolias progrediemur, postremo loco angustifolias descripturi.

PRIMUM verò loco merito sibi vèndicare videtur I.  
Iris Cusana quæ sena aut octona habet folia, Iridis Lusitanica biflora foliis hand absimilia, mutuo sese ut in reliquis fridum generibus amplectentia: è quorum medio caulis exit cubitalis aut amplior, rotundus, geniculatus, digitali crassitudine, florem sustinens omnium quos unquam in fridibus conspexerim maximum, senis foliis constantè, sed colore à reliquis Iridibus differentem: nam tria deorsum reflexa folia, crassa sunt, & interiore parte omnino nigra, nisi quedam vena ex purpura candicantes intercursarent, ab infima basi ad medium usque nigris villis late obsita, macula nigra villosum sericum imitante, & medium folium occupante, foris verò multo dilutiora: quæ autem sursum attolluntur, palmari sunt amplitudine, sed quasi membranæ tenuitate, plurimis lineis ab infima basi ad extremum usque folium excurrentibus, partim nigricantibus, partim ex cinereo candicantibus (sic fere ut Galli paonis siue Americani paonis expasam caudã imitentur) interius circa unguem nonnihil hirsuta: terna deinde habet alia minora folia, illis quæ deorsum reflexa sunt incisbentia, concamerata et bifida,

Q 2.

eiusdem

eiusdem propemodum cum illis coloris, paulo tamen dilutioris, & ad obscuram purpurā accedentis: his ligula occultitur: nullo verò odore commendatur hic flos, sed sola coloris varietate & raritate: an siliquas & semen aliarum Iridum more ferat, mihi non constat, cum eius florem bis aut ter duntaxat viderim, qui ad frugem non pervenerit: semel etiam Domina de Indenelde p. m. floruisse, scripsit ad me C. V. Ioannes Boisot veteri amicitia mihi coniunctus: radix crassa est, obliqua, summa tellure sese spargens reliquarum Iridum modo, sed globosa & veluti in bulbū extuberās, quā folia exoriuntur.

Constantinopoli primum delata fuit Viennam hæc Iris sub finem anni 1573. paulo ante diem Christi Salvatoris nostri natali sacrum, cum recens eò venissem, Mag<sup>o</sup> ac Generoso Domino Augerio de Bousbeque, Cæsaris olim ad Turcarum Imperatorem bis oratori, nunc verò Elizabethæ Austriadis Gallia Regina, aula summo Præfecto, qui eam & Dn. de Indenelde & mihi communicavit. Subsequente verò anno similem attulerunt Constantinopoli reduces Magnificus Dn. Carolus Rym Dñs de Eeckebecke Orator, et eius affinis Dn. Philibertus de Bruxella. Verum cum hiemis iniurias minus ferre potis sit, quam reliqua Iridum genera: mihi fere intercidit, imò D. Acholtzio sapius à me communicata (nam adnatis se propagat ut reliqua) nunquam in eius horto persistere voluit. Et licet cum Nobiles matrona tum Generosi viri his proximis annis Constantinopoli aliquot eius stirpes acceperint, perpaucæ hiemis iniuriam evaserunt.

- II. SENA, septena, octona, aut plura habet Altera folia, omnium Iridum amplissima, & in latum expansa, mutuo tamen sese amplectentia, reliquarum Iridū modo, colore ex viridi aruginoso: è quorum medio caulis exilit

exilit sesquicubitalis, atque amplior interdum, firmus, crassus, lenis, geniculatus, multisque alis concavus, è quibus copiosi, vaginulisque inclusi prodeunt flores Iridis Dalmatica maioris floribus persimiles, dilute admodum cerulei, & florum Sambuci odorem quodammodo emulantes, gravioriorem tamen, siliqua deinde crassa, magna, triangulares, obtuso mucrone, qua per maturitatem dehiscentes, semen continere deprehenduntur crassum, angulosum, durum fulvescens: radix est crassa magna et nodosa, multis oblongis crassisque fibris prædita, lateribus uti reliqua Irides se propagans, & si repurgata exiccetur, odorata.

**TERTIA** habet folia Secunda similia, paulo tamen breviora, & angustiora: è quorum medio exit caulis cubitalis, rotundus, digiti crassitie, in aliquot ramos divisus, qui proferunt è membraneis thecis flores superiore minores, quorum labra, siue tria folia deorsum spectantia saturatioris sunt purpura, et infra versus umbilicum, quâ videlicet hirsuta illa & pallefcens simbria excurrit, variis lineis distincta: tria verò sursum erecta, elegantis sunt purpura, flori Lusitanica biflora similia fere, attamen latiora: deorsum reflexis incumbunt alia tria bifida latiuscula, quæ ligulas candicantes occultant: sunt verò isti flores nonnihil odorati; & his succedunt triangulares siliqua, obtusa, in quibus semen inæquale; radix tuberosa, superiori similis.

Utraque hæc Maio floret cum Prima, & illius nomine Constantinopoli ad me missa est, à Mag<sup>o</sup> & Generoso Dn. Davide Vngnad, Cesareo tum apud Turcarum Imperatorem Oratore, nunc verò bellici Consilij apud Cæsarem Præsede.

**HVC** rugosa sunt folia, pedali longitudine, & secundum radicem omnino interdum purpurascencia,

III.

Iris asiatica  
purpurea.

IIII.

Iris varia  
caulifera.



aliquando minimè: è quorum medio caulem premit cubitalem, leuem, viridem, aliquot ramis diuisum, quibus insident flores è viridibus vaginulis emergentes, magni, nunc prorsus inodori, modo oxyacantha ferè odorem spirantes, coloris varietate commendabiles: etenim tria folia quæ sursum spectant & attolluntur, rarò se mutuo amplectuntur, sed plerumque (nisi flaccescere incipiant) recta sunt, nonnihil tamen conuexa & angustiora, colore luteo, quali sunt etià illa quæ fimbriam ligulâsq. contegunt: folia deorsum inflexa circa basim & exortium pallent, reliqua parte candicant, multis tamen purpureis lineis sine virgulis ab ipsa sede ad extremum vsque folium (quod magna ex parte purpureum saturatiussq. est in earum stirpium floribus quæ circa radicem non purpurascunt, orâ tamen pallida) eleganti pictura decurrentibus: fimbria villosa qua parte integitur lutea est, extrema verò exalbida: ligula pallentes; siliqua magna, triangule, obtuso aliquantulum mucrone, continentes semen orobi magnitudine, fuscum, rugosum: radix nodosa instar vulgaris iridis, foris flavescent, multis transversis fibris firmata, quæ repurgata & exiccata odoratissima est, et cum Illyrica quæ in officinis habetur odoris gratia contendere potest.

Id genus primum inueni in montanis supra arcem Diui Georgij herbido solo, & ad oppidum Stamphenin Vngaria transdanubiana aliquot miliaribus ultra Posonium: deinde utrumque genus frequens in Leytenberg supra Manderstorf, atque etiam in siccioribus pratis non procul Sopronio, & collibus Entzestorf Mag<sup>i</sup> Dñ. de Entzestorf pago vicinis. Maio etiam floret, & Iunio semen maturescit.

Ex illius semine natam censeo, quam anno 1577. V.

Noriberga ad me misit C. V. D. Ioachimus Ioach. E. Itis exotica  
Camerarij.

*Camerarius*, eius *Reip.* medicus primarius, & amicus mihi optim. nō multum etenim ab illa differt, cuius folia circa radicem non purpurascunt. Habet namque cubitalem caulem, lauem, rotundum, aliquot ramulis diuisum, qui è vaginulis virentibus promunt flores superiori similes, paulo tamen maiores, quorum tria reflexa folia multo magis purpurascunt: tria verò erecta luridi planè & obsoleti sunt coloris, quasi pallidi fuligine perfunsi, uti etiam tria illa quæ luteas fimbrias integunt, sub quibus etiam latent candicantes ligula: nonnihil odorati sunt. Cum reliquis floret.

Eius natales non novi: sed, quemadmodum dixi, è semine *Varia caulifera Pannonica* quarto loco mihi descripta natam suspicor: mirum enim in modum variat, quæ ex semine nascuntur *Irides*, non secus ac præcoces *Tulipa* & *Papauera*, ut longa experientia didici.

VI.

*Iris illyrica.*

**S E X T A** non multum à *Lusitanica biflora* differre videtur: etenim quina aut sena ex singulis radicis capitibus promit folia, illius foliis similima: caulem deinde pedalem, raro ampliorem, qui in summo è vaginulis purpurascens floribus promit *Lusitanica* forma, colore, & odore persimilem, paulo tamen maiorem & teneriorem, nullum semen observavi: radix nodosa, & geniculata, multis fibris, quemadmodum aliarum *Iridum* radices, firmatur, odoris, dum virens est, ingrati; at dum siccata est, satis grati; & insipidi initio gustus, postea tamen feruidi faucis que vrentis.

Venetis primum huc perlata est anno 1574. atque *C. V. D. Aicholtzio* communicata, qui eam cum reliquis *Iridum* generibus in cultissimo suo horto alit.

Floret cum reliquis *Maior*.

VII.

*Iris caulifera purp.*

**L A T A** folia habet *Septima*, rugosa, pedali fere longitudine, circa radicem nonnihil purpurascens: caulem pro-



te promit non è medio foliorū, uti alia, sed seorsim sine foliis, pedatē, in quo tres aut quatuor flores è purpurascētibz vaginulis prodeunt, magni, purpura saturatioris, inodori, quorū tria folia ad terrā inflexa, ab ipso exortu vsq. ad simbria, quæ tota candida est, extremum, albis virgulis insignita sunt: his succedunt triangulares siliquæ, magnæ, in extremo obtusæ, semen continentes magnum, aliarū *Iridum* semine haud absimile: radix satis crassa, geniculata, intus candida, foris furvi coloris cortice recta, satis odora, ad *Phu* sine *Valeriana* domesticæ odorem accedens.

Neq. huius natales observavi, sed in D. Aicholtz. y cultissimo horto primum vidi: ipse verò unde eā naetus sit, indicare non potuit. Floret verò maturius iam descriptis, sub Aprilis videlicet finem.

Peculiarem autem habet hæc præter reliquas *frides* notam, ut nulli folia per hiemem retineat, sed omnia flaccescant & exsiccentur, nudæque conspiciatur, deinde primo vere nova germina proferat.

NON dubium est quin ex huius semine, quod cum 2 aliorum generum *Iridis* seminibus, & variarum radicibus ante aliquot annos in Belgicam ad amicos misi, prognata sit elegans illa *Iris* quæ superiore Augusto anni 1581. in cultissimo horto nobilis viri Dn. Ioannis de Hoboke archigrammatei Antuerpiani iam secundum florebat: etenim per omnia illi respondet, nisi quòd folia circa radicem saturatius purpurascere mihi visa sunt.

OMNES porro illa & latifolia sunt & caulifera. Duæ verò subsequētes cum suis speciebus prorsus axav-  
 λοι sunt siue excaules, et earum flores pediculis succulen-  
 tis & infirmis duntaxat innituntur, ut croci, colchici,  
 & similium flores.



VIII. **HARVM** autem maior breuibus est foliis, interdum etiam pedalibus, fridis vulgaris modo latis, & secundum radicem magna ex parte purpurascens: inter qua multi flores e vaginulis prodeunt singulari pediculo dodrantalique fulti, atque sine caule, vulgari paulo minores, Lusitanica biflora amuli, cum magnitudine, tum colore, qui saturatoris nigra viola est, praesertim tria folia deorsum inflexa, quae fimbriam villosam, usque ad bifida illa quae ligulas tegunt folia, ex caruleo purpurascens habent, sub ligula verò luteam: omnia autem florum folia, tam quae sursum attolluntur, quam quae repanda terram spectant, inferiore & sessili parte lineis quibusdam albis variegata sunt: at vel aliquantulum odorati sunt, vel inodori: siliqua triangula, magna, minoronata, in quibus semen orobi magnitudine pallefcens, quod exsiccatum rugas contrahit et fulvescit: radix nodosa est aliarum Iridum modo, similiterq. se propagans.

IX. **Chameiris latifolia minor purpurea.**

NONA superiore minor est, & brevioribus angustioribusq. aliquantum foliis, Chameiridi latifolia Hispanica & Gallica (de qua in Hispanicis observationibus) similis: flore superioris fere simili, sed minore, & villo fimbria supra ligulas caruleo, infra verò, quemadmodum in alia, luteo: saturator interdum est, nunc dilutior, ille quidem odoratus, hic minimè, ternisque foliis quae sursum inflectuntur in utroque genere modò orbiculatis, modò longioribus & bifidis. Siliqua & semen etià minora, uti sunt reliquarum subsequentium specierum.

2. **Chameiris latifol. min. caerulea.**

**Chameiris latifol. min. tuberculosa.**

Alia huic omnino similis, cum foliis, tum nascendi modo, tum radice, quae nodosa est & obliqua atq. multis fibris praedita, tum etiam flore, qui tamen caruleus est, & odoratus, & labra inferiora nonnihil purpurascens habet.

3. Tertia nequaquam à superiore differt, sed eius flos quodam-

quodammodo rubet, interdum etiam dilutior & exalbida quodammodo rubedine & carneo colore praeclatus est, praesertim foliis sursum erectis, estque aut odoratus, aut inodorus, villo fimbria supra albicante, infra uti in aliis luteo: omnibus his ligulae sunt caeruleae.

Flore reliquis forma simili est *Quarta*, sed colore interdum pallescente, nonnunquam exalbido: folia sursum erecta, ab ipso statim exortu in utroque genere purpurascens quibusdam lineis decorantur, deorsum vero inflexa, in pallescente exalbida sunt, & in albicante virescunt.

4.  
Chamaeiris. la-  
tif. min. pal.  
& alba.

*Quinta* solo floris colore à quarta differt: is etenim fulvescit, eiusque superiora quidem folia purpurascens virgulis exornantur, labra tamen propendentia modo nigricante, modo diluta purpura in medio infecta sunt: ligulae porro in quarta & quinta specie albae sunt, & flores odori: pallescens autem oxyacantha floris odorem omnino emulatur.

5.  
Chamaeiris. la-  
tif. min. va-  
rta.

Omnium vero foliola quae ligulas & fimbriam magna ex parte contegunt, bifida sunt, & pinnae duas sursum erectas, veluti Irides bulbosae habent: Purpurea praeterea, alba & varia folia secundum radicem plerumque purpurascunt.

Nascuntur autem omnes in nudis & apertis montibus Pannonia & Austria: purpurea maior in Prellenberg: purpurea minor cum istis, tum supra Medeling, Gumpostkirchen, & Baden, in quibus montibus inveniuntur & rubra & caerulea: alba in Hamburgensi monte: variam certe non nisi in monte Badensibus thermis imminenti, qua parte de Górovot spectat, observari. Ceterum tam insignem varietatem ex semine deciduo, sponteque sese ferente fieri existimo. Nam variae semina à me in hortulo terrae commissa, & variis, & pallidas, et albas protulerunt.

RESTANT

RESTANT nobis *Angustifolia* persequenda, quarum tametsi tria genera in Pannonia & Austria inueniantur: unicum tamen est, mihi aliàs in reliquis quas obini prouinciis haudquaquam obseruatum.

X.  
Iris angustifolia maior.

TRIVM. autem istarum *Iridum* maxima, planè similis est, *Iridi angustifolia* maiori, cuius descriptionem in Hispanicarum stirpium historia dedi, quam ob causam hic eam retexere minimè necessariū duximus.

Prouenit verò ea herbosis quibusdā locis iuxta vias, & ad margines pratorum quorundam non procul à Manderstorf quinto à Vienna Austria miliari, atque etiam apud Walterstorf, & anno 1579. non procul à Lindwa Mag<sup>i</sup> Dn. Bamfj arce in pratis obseruati.

XI.  
Iris angustifolia media, sive varia.

MEDIA, quæ perelegans est, nec ullibi antè mihi conspecta, cubitalia habet folia, angusta admodum, minimi digiti, sive semuncia latitudinem non excedentia, viridia, non tamen splendentia, per extremum mucronata, inferiore verò parte qua terra integuntur purpurascencia, nullo ingrato odore, ut pleraque aliarum angustifoliarum, donata: caules sunt sesquicubitales, rekti, teretes, firmi, intus caui, geniculati, virides, superiore parte in binos aut ternos ramulos diuisi, quibus insident bini aut terni flores *Iridis* varia bulbosa floribus forma propemodum similes, odorati, quorum tria folia deorsum reflexa, sessili parte, & quatenus bifido folio ligulam occultente teguntur, colore furno sunt, reliqua parte (quæ in nonnullis breuior & latior est, in aliis oblongior & angustior) nunc candicante, nunc purpureo, seu violaceo colore, venis intensiore purpura nitentibus per folij longitudinem excurrentibus, & sine fimbria: tria sursum erecta, angustiora sunt, & cum bifidis illis exalbidis ligulas tegentibus, purpurei saturatoris, sive violacei sunt coloris: breues deinde consequuntur filiqua  
triangula,





triangula, fridi bulbosa flore luteo magnitudine pares, aut paulo maiores, qua per maturitatem nigricant, & aliquantulum dehiscunt, semen inaequale, angulosum, nonnihil compressum & durum continentes: radix nigra, tenuis, dura, nodosa, fibris aliquot duris & tenuibus pradita est.

Sponte exit in quibusdam Viennensi agro vicinis pratis, veluti supra Himbergam, Eberstorf Magnifici Dn. Hieronymi Bec à Leopoldstorf, atque aliis Austriae pratenfibus locis. Misit illam postea ad me siccam in Sudetum montibus erutā doctiss. vir Ludouicus Ioach. senioris F. Camerarius ex S. Anna monte. Anno verò 1579. frequentissimam circa Sakturnyam Ill. Comitis de Zrinio arcem, aliisque locis inter Muram & Dravum, pratis uliginosis, quemadmodum etiam in Comitatu Saladiensi inter Lindwa fl. & Muram observavi. Floret Maio, semen Augustum maturum est.

POSTREMA angustifolia passim hic in pratis Viennen-  
 sis agri ad radices montium sitis provenit, uti apud Me-  
 deling, Gumpostkirche, Badenses thermas: nec differt ab  
 ea quam C. V. Dodonaeus Chamairidem appellavit,  
 quaeque iam multis annis in Belgicis hortis alitur, flore  
 maturè prodeunte, & Armeniaci mali odorem referen-  
 te. Eam Lobelius noster in stirpinum observationibus  
 Iridem perpusillam siluestrem angustifoliam nominat.

XII.

Iris angustifolia minor.

Sed eius duae videntur esse differentiae, nam una pedalem interdum acquirit caulem, binosque aut ternos plerumque in eo gestat flores, & deinde capita sine siliquis admodum acutis angulis praditas, eaque in his pratis vulgatiores: alterius caulis vix dodrantalem superat  
 altitudinem, et unicum magna ex parte florem profert:  
 utriusque radix tenuis, nigra, & firma est.

1.

2.

CETERVM Prior Constantinopoli missa est  
 Alàia

*Drauum, & apud Sackturnya Ill. Comitis de Zrinio arcem.*

**III.** *Orchis obscura purpurea.* **TERTIVM** genus elegatissimum, binis crassis bulbis, altero succi pleno, altero flaccidiore, quod in Orchidibus vulgare est: foliis longis angustis: caule interdum pedali, spica florum elegante, odorata, quorum galeola obscura purpura nitet, hiatus cum labro candicant, purpureisque maculis insigniti sunt.

Inuenitur in pratis Nemethwywar vicinis, supra Rabam, intraque Muram & Drauum flumina.

**IIII.** *Orchis galea purp.* **QUARTÆ** quina aut sena sunt, folia, caulis palmaris aut amplior, aliquot minoribus foliis involutus: spica elegantium minorum florum purpurascens galea tectorum, labro prominula, in quatuor barbulas diuisa, candido, purpureisque punctis asperso, paruo calcari à tergo prominente, tenui odore: sub quo, ut in reliquis orchidibus torosum & cōtortum est capitulum exiguum semen scobis instar continens: geminas radices habet parvorum testiculorum modo, alteram plenam, alteram flaccidam, supra quas ex imo caule orta fibra expanduntur.

Nascitur ad radices montis Clesensfeld imminentis, binis supra Neapolim miliaribus, at copiose admodum in montium tenui gramine tectorum accliuibus, supra Radaun, Medeling, Baden, & plerisque aliis locis editioribus & siccioribus Vienna vicinis.

2. Ei similem erui montibus Grebén proximis, sed longè ampliorem, crassiorēq; & longiore spica.

**V.** *Orchis colore vario.* **QUINTA** quatuor aut plura folia habet summa tellure diffusa, Belgica orchidis foliis, quæ vulgo in pratis maturè florē purpureum fert, similia, sed nullis maculis distincta; caulem palmarem, aliquot minoribus foliis septum, cuius summum multi flores, exigua galea duobus



duobus foliolis constante, tribusque aliis foliatis galeam ambientibus, latioreque barba propendente, & calcari obtusiore praditi, spicatumque nascentes exornant, colore modo purpureo saturatiore, modo dilutiore, modo carneo, modo omnino lacteo, barba tamen plerumq. nunc exiguis, nunc maioribus saturate purpura scētibus maculis aspersa, interdum etiam nullis omnino, praesertim in lacteis floribus: semen ut in reliquis orchidum generibus vasculis contortis continetur: radices geminas alteram flaccidiorem superioris anni, alteram succulentam recentiorem tegunt multa candida crassiuscula fibra.

Invenitur passim in pratis Viennae vicinis: similem etiam observare memini superiore anno 1581. in pratis urbi Londinensi in Anglia proximis: ubi & aliam erui grandiore paulo florum purpureorum spica teterrimo odore foetidam.

Omnes autem, praeter primam, mense Maio florere solent. Orchis foetidissima.

TRIA plerumque habet Sextum genus angusta folia, alioqui reliquis orchidibus similia, viridia, cauliculum dodrantalem, spica flosculorum ex herbido pallentium, tribus apiculis constantium, odore moschi exornatum: radicem unicam, rotundam, pisi magnitudine, supra quam longa propagines exporriguntur, quae novas subinde plantas generant.

VI.

Orchis pusilla  
pallida odorata.

Exit copiose in colle monasterio Neuberg vicino; & floret Iunio.

FOLIIS est Lilij primum nascentibus tribus aut quatuor Septima, dilutiore et quasi pallente virore praditis, nullaque macularum aspergine notatis, ingrati saporis: caulem dodrantalem amplectuntur nonnulla foliola, in cuius summo flores spicatum digesti nascuntur

VII.

Orchis serapias.

colore





colore exalbido, nec ullis punctis distincto, anterius morionum hiantibus cucullis similes, utrimque auriti, & latiusculo pallido labro propendente, posterius verò corniculum habentes, uti *Consolida regalis*, aut *Linaria*, sed latius & obtusum, grauitè odorati, florum sambuci odorem emulantes: ad horum exortum singula foliola nascuntur pallentia, & floribus colore respondentia: radices geminae, veluti palma in binos aut plures digitos distributae sunt, quarum vetustior, fungosa, nigrior & flaccidior est, altera candida, vegetior ac solida, paucis supra earum exortum nascentibus fibris.

Aliud genus est cum forma tum magnitudine illi simile, cuius flores purpurei sunt, & foliola sub floribus nascentia etiam putrescunt. 2.

Inuenitur utrumq. genus non modò in Leytano saltu supra Manderstorf aliisque Austriæ inferioris salubus: sed etiam editioribus quibusdam pratis Viennensi saltui proximis. Floret autem Aprili, nonnunquam etiam Maio, pro mitiore aut rigidiore aëris vernalis constitutione.

## DE LIMODORO AVSTRIACO.

### CAP. XXVII.

COGNATVM quodammodo est Orchidibus λειμόδωρον, cuius varia genera inueniuntur multis prouinciis communia. λειμόδωρον. austriacum.

At unum in montanis supra Badenses thermas obseruari, quod nusquam alibi obseruare memini. Assurgit id pedali caule, frequentibus secundum radicem foliolis tanquam vaginulis inuoluto, qui spicam fert florum quathor foliis constantium, superiore in corniculum desinente, & promiscide quadam inter media folia prominente, cui adnatae sunt duae tenues barbulae: floribus stria-

bus striata & oblonga subsunt capitula, semine exili & orchidum simili plena: radix crassis longisque & obliquis fibris constat, quemadmodum in ea planta qua vulgo *Helleborines* nomen obtinuit.

Tota stirps saturo purpurea & planè violaceo colore pradiata est. Floret Junio.

Similem fere, sed colore multo dilutiore, olim observare memini in silva illa agri *Möpelliani* ad monasterium *Gramont* sub felicibus arboribus.

Orobanchæ.

Rapum genifl.

Porro *Orobanche* illa maior, quam *Belga*, quoniam ad *Genista* vulgaris radices interdum nascitur, *Rapum genista* cognominant, cuiusque in pulverem trita ex tepido vino hausta prasens ad coli dolores remedium esse predicant, passim multis *Austria* & *Pannonia* silvis nascitur, atque *Ungaris* *Misè gyerthyá*, id est missalis candela sine cereis dicitur.

Radix caua.

FREQUENS est etiam in *Leytenberg*, atque aliis montibus siluosis urbi *Vienna* vicinis, multisque *Pannonia* locis cum circa sepes, tum ad silvarum extremitates inter vepres ea planta quam à radice orbiculata, & subtus nonnihil natura excavata Radicem cauam vulgo nominant: qua vel albo flore, vel carneo rubrove dilutiore quam frequentissime, vel egregiè rubente, sed raro conspicitur. At minorem illam *Germanicis* & *Belgicis* officinis apprimè notam, quaque cum in *Germania* passim, tum in *Belgica* inter vepres et frutices nascitur, nusquam in his provinciis videre memini.

## DE IRIDE.

## CAP. XXVIII.

In Iridum generibus maximam conspici varietatem.

NUNQUAM maiorem in vlla planta varietatem observare memini, quam in *Iride*. In nullam etenim provinciam

vinciam institui, quin eius aliquod genus antea mihi non conspectum inuenerim, uti ex mea Hispanicarum stirpium historia videre licet, et ex hoc etiam capite deprehendi poterit: in quo nonnullas etiam Irides describere animus est, non hic quidem sua sponte nascentes, sed Constantinopoli aut ex Illyride primum meo tempore huc delatas, & postea Viennensium hortorum inquilinas factas, cum iis quas variis Pannonia & Austria locis eruimus.

A maioribus autem latifoliis initium faciemus, deinde ad humiliores easque tamen latifolias progrediemur, postremo loco angustifolias descripturi.

PRIMUM verò loco merito sibi vendicare videtur quæ sena aut octona habet folia, Iridis Lusitanica bifloræ foliis haud absimilia, mutuo sese ut in reliquis Iridum generibus amplectentia: è quorum medio caulis exit cubitalis aut amplior, rotundus, geniculatus, digitali crassitudine, florem sustinens omnium quos unquam in Iridibus conspexerim maximum, senis foliis constantè, sed colore à reliquis Iridibus differentem: nam tria deorsum reflexa folia, crassa sunt, & interiore parte omnino nigra, nisi quedam vena ex purpura candicantes intercursarent, ab infima basi ad medium usque nigris villis latè obsita, macula nigra villosum sericum imitante, & medium folium occupante, foris verò multo dilutiora: quæ autem sursum attolluntur, palmari sunt amplitudine, sed quasi membranea tenuitate, plurimis lineis ab infima basi ad extremum usque folium excurrentibus, partim nigricantibus, partim ex cinereo candicantibus (sic fere ut Galli paonis sive Americani paonis expasam caudam imitentur) interius circa unguem nonnihil hirsuta: terna deinde habet alia minora folia, illis quæ deorsum reflexa sunt incumbentia, concamerata et bifida,

I.  
Iris fullana

eiusdem propemodum cum illis coloris, paulo tamen dilutioris, & ad obscuram purpurā accedentis: his ligula occultitur: nullo verò odore comendatur hic flos, sed sola coloris varietate & raritate: an siliquas & semen aliarum Iridum more ferat, mihi non constat, cum eius florem bis aut ter duntaxat viderim, qui ad frugem non pervenerit: semel etiam Domina de Indenælde p. m. floruisse, scripsit ad me C. V. Ioannes Boissot veteri amicitia mihi coniunctus: radix crassa est, obliqua, summa tellure sese spargens reliquarum Iridum modo, sed globosa & veluti in bulbū extuberās, quā folia exoriuntur.

Constantinopoli primum delata fuit Viennam hæc Iris sub finem anni 1573. paulo ante diem Christi Salvatoris nostri natali sacrum, cum recens eò venissem, Mag<sup>o</sup> ac Generoso Domino Augerio de Bonsbeque, Caesaris olim ad Turcarum Imperatorem bis oratori, nunc verò Elizabethæ Austriadis Gallia Regina, aula summo Praefecto, qui eam & Dn. de Indenælde & mihi communicavit. Subsequente verò anno similem attulerunt Constantinopoli reduces Magnificus Dn. Carolus Rym Dñs de Eeckebecke Orator, et eius affinis Dn. Philibertus de Bruxella. Verum cum hiemis iniurias minus ferre potis sit, quàm reliqua Iridum genera: mihi fere intercidit, imò D. Aicholzio sapius à me communicata (nam adnatis se propagat ut reliquæ) nunquam in eius horto persistere voluit. Et licet cum Nobiles matronarum Generosi viri his proximis annis Constantinopoli aliquot eius stirpes acceperint, per paucā hiemis iniuriam evaserunt.

II.

Iris asiatica  
ærulea.

SENA, septena, octona, aut plura habet Altera folia, omnium Iridum amplissima, & in latum expansa, mutuo tamen sese amplectentia, reliquarum Iridum modo, colore ex viridi aruginoso: è quorum medio caulis exilit

exilit sesquicubitalis, atque amplior interdum, firmus, crassus, lanis, geniculatus, multisque alis concavus, è quibus copiosi, vaginulisque inclusi prodeunt flores Iridis Dalmatica maioris floribus persimiles, dilutè admodum carulei, & florum Sambuci odorem quodammodo amulantes, graviores tamen, siliqua deinde crassa, magna, triangulares, obtuso mucrone, qua per maturitatem dehiscentes, semen continere deprehenduntur crassum, angulosum, durum fulvescens: radix est crassa magna et nodosa, multis oblongis crassisque, fibris prædita, lateribus uti reliqua Irides se propagans, & si repurgata exiccetur, odorata.

**TERTIA** habet folia Secunda similia, paulotamen breviora, & angustiora: è quorū medio exit cancellis cubitalis, rotundus, digiti crassitie, in aliquot ramos diuisus, qui proferunt è membraneis thecis flores superiore minores, quorum labra, sine tria folia deorsum spectantia saturatioris sunt purpura, et infra versus umbilicum, quā videlicet hirsuta illa & pallescens fimbria excurrit, variis lineis distincta: tria verò sursum erecta, elegantis sunt purpura, flori Lusitanica biflora similia fere, attamen latiora: deorsum reflexis incumbunt alia tria bifida latiuscula, qua ligulas candicantes occultant: sunt verò isti flores nonnihil odorati; & his succedunt triangulares siliqua, obtusa, in quibus semen inæquale; radix tuberosa, superiori similis.

Utraque hæc Maio floret cum Prima, & illius nomine Constantinopoli ad me missa est, à Mag<sup>o</sup> & Generoso Dn. Dauide Vngnad, Cesareo tum apud Turcarum Imperatorem Oratore, nunc verò bellici Consilij apud Cæsarem Preside.

**HVC** rugosa sunt folia, pedali longitudine, & secundum radicem omnino interdum purpurascencia,

III.

Iris asiatica  
purpurea.

IIII.

Iris varia  
caulifera.





aliquando minimè: è quorum medio caulem præmit cubitalem, lauem, viridem, aliquot ramis diuisum, quibus insident flores è viridibus vaginulis emergentes, magni, nunc prorsus inodori, modo oxyacantha ferè odorem spirantes, coloris varietate commendabiles: etenim tria folia quæ sursum spectant & attolluntur, raro se mutuo amplectuntur, sed plerumque (nisi flaccescere incipiant) recta sunt, nonnihil tamen conuexa & angustiora, colore luteo, qualis sunt etià illa quæ fimbriam ligulâsq. contegunt: folia deorsum inflexa circa basim & exortum pallent, reliqua parte candicant, multis tamen purpureis lineis sive virgulis ab ipsa sede ad extremum vsque folium (quod magna ex parte purpureum saturatiussq. est in earum stirpium floribus quæ circa radicem non purpurascent, orâ tamen pallida) eleganti pictura decurrentibus: fimbria villosa qua parte integitur lutea est, extrema verò exalbida: ligula pallentes; filiquæ magna, triangule, obtuso aliquantulum mucrone, continentes semen orobi magnitudine, fuscum, rugosum: radix nodosa instar vulgaris iridis, foris flavescent, multis transuersis fibris firmata, quæ repurgata & exiccata odoratissima est, et cum Illyrica quæ in officinis habetur odoris gratia contendere potest.

Id genus primum inueni in montanis supra arcem Diui Georgij herbido solo, & ad oppidum Stamphenin Vngaria transdanubiana aliquot miliaribus ultra Posonium: deinde utrumque genus frequens in Leytenberg supra Manderstorf, atque etiam in siccioribus pratis non procul Sopronio, & collibus Entzestorf Mag<sup>i</sup> Dñ. de Entzestorf pago vicinis. Maio etiam floret, & Iunio semen maturefcit.

Ex illius semine natam censeo, quam anno 1577. V. Noriberga ad me misit C. V. D. Ioachimus Ioach. F.

Itis exotica  
Cameracij.



*Camerarius*, eius *Reip. medicus primarius*, & *amicus* mihi *optim.* nō multum etenim ab illa differt, cuius folia circa radicem non purpurascunt. Habet namque cubitalem caulem, lauem, rotundum, aliquot ramulis diuisum, qui è vaginulis virentibus promunt flores superiori similes, paulo tamen maiores, quorum tria reflexa folia multo magis purpurascunt: tria verò erecta luridi planè & obsoleti sunt coloris, quasi pallidi fuligine perfunsi, uti etiam tria illa quæ luteas fimbrias integunt, sub quibus etiam latent candicantes ligula: nonnihil odorati sunt. Cum reliquis florer.

Eius natales non novi: sed, quemadmodum dixi, è semine *Varia caulifera Pannonica* quarto loco mihi descripta natam suspicor: mirum enim in modum variat, quæ ex semine nascuntur *Irides*, non secus ac præcoces *Tulipa* & *Papauera*, ut longa experientia didici.

## VI.

*Iris illyrica.*

**S E X T A** non multum à *Lusitanica biflora* differre videtur: etenim quina aut sena ex singulis radicis capitibus promit folia, illius foliis similima: caulem deinde pedalem, raro ampliorem, qui in summo è vaginulis purpurascens florē promit *Lusitanica* forma, colore, & odore persimilem, paulo tamen maiorem & teneriorem, nullum semen observavi: radix nodosa, & geniculata, multis fibris, quemadmodum aliarum *Iridum* radices, firmatur, odoris, dum virens est, ingrati; at dum siccata est, satis grati; & insipidi initio gustus, postea tamen feruidi faucesque vrentis.

Venetis primū huc perlata est anno 1574. atque *C. V. D. Aicholtzio* communicata, qui eam cum reliquis *Iridum* generibus in cultissimo suo horto alit.

Floret cum reliquis *Maiō*.

## VII.

*Iris caulifera purp.*

**L A T A** folia habet *Septima*, rugosa, pedali fere longitudine, circa radicem nonnihil purpurascens: caulem pro-

lē promit non è medio foliorū, uti alia, sed seorsim sine foliis, pedale, in quo tres aut quatuor flores è purpura scētibus vaginulis prodeunt, magni, purpure saturatoris, inodori, quorū tria folia ad terrā inflexa, ab ipso exortu vsq. ad fimbria, qua tota candida est, extremum, albis virgulis insignita sunt: his succedunt triangulares siliqua, magna, in extremo obtusa, semen continentēs magnū, aliarū Iridum semine haud absimile: radix satis crassa, geniculata, intus candida, foris furui coloris cortice tecta, satis odora, ad Phu sine Valeriana domestica odorem accedens.

Neq. huius natales obseruari, sed in D. Aicholtz ij cultissimo horto primum vidi: ipse verò unde eā nactus sit, indicare non potuit. Floret verò maturius iam descriptis, sub Aprilis videlicet finem.

Peculiarem autem habet hac prater reliquas Irides notam, ut nulla folia per hiemem retineat, sed omnia flaccescant & exsiccentur, nudaque conspiciatur, deinde primo vere noua germina proferat.

NON dubium est quin ex huius semine, quod cum 2 aliorum generum Iridis seminibus, & variarum radicibus ante aliquot annos in Belgicam ad amicos misi, prognata sit elegans illa Iris qua superiore Augusto anni 1581. in cultissimo horto nobilis viri Dn. Ioannis de Hoboke archigrammatei Antuerpiani iam secundū florebat: etenim per omnia illi respondet, nisi quòd folia circa radicem saturatius purpurascere mihi visa sunt.

OMNES porro ille & latifolia sunt & caulifera. Duæ verò subsequētes cum suis speciebus prorsus anan-  
doi sunt siue excaules, et earum flores pediculis succulentis & infirmis duntaxat innituntur, ut croci, colchici, & similibus flores.

## VIII.

Chameiris la-  
tifolia maior.

**HARVM** autem maior breuius est foliis, interdum etiam pedalis, fridis vulgaris modo latis, & secundum radicem magna ex parte purpurascens: inter quae multi flores è vaginulis prodeunt singulari pediculo dodrantalique fulti, atque sine caule, vulgari paulo minores, Lusitanica biflora emuli, cum magnitudine, tum colore, qui saturatioris nigrae violae est, praesertim tria folia deorsum inflexa, quae simbriam villosam, usque ad bifida illa quae ligulas tegunt folia, ex caruleo purpurascens habent, sub ligula verò luteam: omnia autem florum folia, tam quae sursum attolluntur, quam quae repanda terram spectant, inferiore & sessili parte lineis quibusdam albis variegata sunt: at vel aliquantulum odorati sunt, vel inodori: siliqua triangula, magna, minoronata, in quibus semen orobi magnitudine pallefcens, quod exsiccatum rugas contrahit et fulvescit: radix nodosa est aliarum Iridum modo, similiterque se propagans.

## IX.

Chameiris la-  
tifolia minor  
purpurea.

**NONA** superiore minor est, & breuioribus angustioribusque aliquantum foliis, Chameiridi latifolia Hispanica & Gallica (de qua in Hispanicis observationibus) similis: flore superioris fere simili, sed minore, & villo simbria supra ligulas caruleo, infra verò, quemadmodum in alia, luteo: saturatior interdum est, nunc dilutior, ille quidem odoratus, hic minimè, ternisque foliis quae sursum inflectuntur in utroque genere modò orbiculatis, modò longioribus & bifidis. Siliqua & semen etià minora, uti sunt reliquarum subsequentium specierum.

## 2.

Chameiris la-  
tifolia min. ca-  
rulea.

**Alia** huic omnino similis, cum foliis, tum nascendi modo, tum radice, quae nodosa est & obliqua atque multis fibris praedita, tum etiam flore, qui tamen caruleus est, & odoratus, & labra inferiora nonnihil purpurascens habet.

Chameiris la-  
tifolia min.  
tub. cens.

## 3.

**Tertia** nequaquam à superiore differt, sed eius flos quodam-

quodammodo rubet, interdum etiam dilutiore & exalbida quodammodo rubedine & carneo colore praditus est, praesertim foliis sursum erectis, estque aut odoratus, aut inodorus, villo fimbria supra albicante, infra uti in aliis luteo: omnibus his ligulae sunt caeruleae.

Flore reliquis forma similis est *Quarta*, sed colore interdum pallescente, nonnunquam exalbido: folia sursum erecta, ab ipso statim exortu in utroque genere purpurascens quibusdam lineis decorantur, deorsum vero inflexa, in pallescente exalbida sunt, & in albicante virescunt.

4.  
Chamae. la-  
tif. min. pal.  
& alba.

*Quinta* solo floris colore à quarta differo: is etenim fulvescit, eiusque superiora quidem folia purpurascens virgulis exornantur, labra tamen propendentia modo nigricante, modo diluta purpura in medio infecta sunt: ligulae porro in quarta & quinta specie albae sunt, & flores odori: pallescens autem oxyacantha floris odorem omnino emulatur.

5.  
Chamae. la-  
tif. min. va-  
rila.

Omnium verò foliola quae ligulas & fimbriam magna ex parte contegunt, bifida sunt, & pinnae duas sursum erectas, veluti Irides bulbosae habent: Purpureae praeterea, albae & variae folia secundum radicem plerumque purpurascunt.

Nascuntur autem omnes in nudis & apertis montibus Pannonia & Austria: purpurea maior in Prellen-berg: purpurea minor cum istis, tum supra Medeling, Gumpostkirchen, & Baden, in quibus montibus inveniuntur & rubra & caerulea: alba in Hamburgensi monte: variam certè non nisi in monte Badensibus thermis imminenti, qua parte Λιθότοπος spectat, observavi. Ceterum tam insignem varietatē ex semine deciduo, sponteque sese serēte fieri existimo. Nam variae semina à me in hortulo terra commissa, & varias, & pallidas, et albas protulerunt.

RESTANT

RESTANT nobis *Angustifolia* persequenda, quarum tamen tria genera in Pannonia & Austria inueniantur: unicū tamen est, mihi aliās in reliquis quas obiui prouinciis haudquaquam obseruatum.

X. *Iris angustifolia maior.* TRIVM. autem istarum *Iridum* maxima, planè similis est, *Iridi angustifolia* maiori, cuius descriptionem in *Hispanicarum stirpium historia* dedi, quam ob causam hic eam retexere minimè necessariū duximus.

Prouenit verò ea herbosis quibusdā locis iuxta vias, & ad margines pratorum quorundam non procul à *Manderstorf* quinto à *Vienna Austria* miliari, atque etiam apud *Walterstorff*, & anno 1579. non procul à *Lindwa Mag<sup>i</sup> Dn. Bamfy* arce in pratis obseruauit.

XI. *Iris angustifolia media, sue varia.* MEDIA, quæ perelegans est, nec ullibi antè mihi conspecta, cubitalia habet folia, angustà admodum, minimi digiti, siue semuncia latitudinem non excedentia, viridia, non tamen splendentia, per extremum mucronata, inferiore verò parte qua terra integuntur purpurascentia, nullo ingrato odore, ut pleraque aliarum angustifoliarum, donata: caules sunt sesquicubitales, recti, teretes, firmi, intus cavi, geniculati, virides, superiore parte in binos aut ternos ramulos diuisi, quibus insident bini aut terni flores *Iridis* variæ bulbosæ floribus forma propemodum similes, odorati, quorum tria folia deorsum reflexa, sessili parte, & quatenus bifido folio ligulam occultente teguntur, colore furuo sunt, reliqua parte (qua in nonnullis breuior & latior est, in aliis oblongior & angustior) nunc candicante, nunc purpureo, seu violaceo colore, venis intensiore purpura nitentibus per folij longitudinem excurrentibus, & sine fimbria: tria sursum erecta, angustiora sunt, & cum bifidis illis exalbidis ligulas tegentibus, purpurei saturatoris, siue violacei sunt coloris: breues deinde consequuntur filiquæ triangula,



triangula, fridi bulbosa flore luteo magnitudine pares, aut paulo maiores, qua per maturitatem nigricant, & aliquantulum dehiscent, semen inaequale, angulosum, nonnihil compressum & durum continentes: radix nigra, tenuis, dura, nodosa, fibris aliquot duris & tenuibus pradita est.

Sponte exit in quibusdam Viennensi agro vicinis pratis, veluti supra Himbergam, Eberstorf Magnifici Dn. Hieronymi Bec à Leopoldstorf, atque aliis Austriae pratensibus locis. Misit illam postea ad me siccam in Sudetum montibus eruta doctiss. vir Ludouicus Ioach. senioris F. Camerarius ex S. Anna monte. Anno verò 1579. frequentissimam circa Sakturnyam Ill. Comitibus de Zrinio arcem, aliisque locis inter Muram & Drauum, pratis uliginosis, quemadmodum etiam in Comitatu Saladiensi inter Lindwa fl. & Muram obseruavi. Floret Maio, semen Augustum maturum est.

POSTREMA angustifolia passim hic in pratis Viennen-  
 sis agri ad radices montium sitis provenit, uti apud Me-  
 deling, Gumpostkirche, Badenses thermas: nec differt ab  
 ea quam C. V. Dodonaeus Chamairidem appellavit,  
 quaeque iam multis annis in Belgicis hortis alitur, flore  
 maturè prodeunte, & Armeniaci mali odorem referen-  
 te. Eam Lobelius noster in stirpium observationibus  
 Iridem perpusillam siluestrem angustifoliam nominat.

XII.

Iris angustifolia minor.

Sed eius duae videntur esse differentiae, nam una pedale  
 interdum acquirit caulem, binosque aut ternos ple-  
 rumque in eo gestat flores, & deinde capita sine siliquis  
 admodum acutis angulis praditas, eaque in his pratis  
 vulgatior est: alterius caulis vix dodrantalem superat  
 altitudinem, et unicum magna ex parte florem profert:  
 utriusque radix tenuis, nigra, & firma est.

CETERVM Prior Constantinopoli missa est  
 Alàia



Alaia susani  
Alaga fuzame.

Alaia Susani & Alaga fuzame nomine, cum hac additione fiori belle pintate, anno buono odore, hoc est, eleganter picti flores, boni odoris, & fa fior bianco & negro, id est florem fert ex albo & nigro varium: elegantem sanè florem esse comperimus, sed gratum nullū odoremprehendimus. Lobelius noster in observationibus Chalcedonicam vocauit. Ego aliunde primum in hortos Constantinopoli vicinos ultra Bosphorū sitos illatam puto, aut, ex Perside, aut ut verisimilius est, Susa Susana provincia metropoli, ut nomē indicare videtur: itaq. mihi Susana Iris dicitur. Eius radix plurimum ad Galangæ maioris formam accedit. Illius nomine Secundam & Tertiam, ut dixi, consequutus sum, cum à Mag<sup>o</sup> Dn. Dauide Vngnad Alaia susani mihi mitti petissem: habet verò Secūda magnam affinitatem cum Dalmatica maiore Belgis nuncupata. Quartam variam cauliferam pannonicam cognomino: qua etiam appellatione donari Quinta poterit addita obsoletioris voce. Sexta Venetiis pro Illyrica allata est. Septima purpurea caulifera sit, ad sequentium differentiam. Octauam appello Chamairidem latifoliā pannonicam maiorem. Nonam Chamairidē latifoliam minorem, à cuius florum varietate singula species cognomē etiam mutuari poterunt, videlicet purpurea, cerulea, rubra, alba, pallida, varia, &c. Undecima mihi erit Iris angustifolia pannonica vario flore: Nam falluntur qui eam Constantinopoli allatam putantes, aut Illyrica maioris, aut siluestris Constantinopolitana cognomen illi in Belgica dederunt: cum ego non inde aduectam, sed in vliginosis pratis vrbi Viennensi vicinis erutam, & ipsius semina, Dn. Ioan. de Brancion, Dn. Ioanni vander Dilft, & aliis amicis primus hanc in Belgicā miserim. Inde factū est, ut cum hac, tum latifolia maior varia

apud

Iris dalmatica  
maior.



apud nobiles Matronas Belgicas, Iridis Clusii cognomen adquisiverint, & propter florum elegantiam præ ceteris quas nisi grata sint.

## DE ACORO.

## CAP. XXIX.

ALIQUOT iam annis hanc stirpem in hortulo alo, munere Ill. virorum D. Augery de Bonsbeque Ser<sup>m</sup> Elizabethæ Austriacæ Franciæ Reginae aulæ nunc summi Præfecti, & D. Davidis Vngnad Liberi Baroni in Sonneck, nunc bellici Consilij apud Cæsarem Præsidis, atque Magnifici D. Caroli Rym Dn. de Eeckebecke, qui omnes oratorio munere apud Turcarum Imperatorem Cæsaris nomine defuncti sunt. Quam, cum frigoris sit patientissima, nec hiemis iniuriis reformidet, sed mirum in modum adnatis se propaget, quamplurimis communicavimus, sic ut nunc apud plerisque fere omnes rei herbaria studiosos vulgaris sit.

Eius historiam ante sexennium in appendice ad Hispanicas observationes dedi: unâ cum iconè, cui, cum nondum tum temporis flores protulisset, nomenclatum non est additum, neque in eius historia floris est mentio alia facta, quàm ut ex D. Augery relatione intellexeramus. At cum annis 1577. & 1579. florentem viderimus, operæ precium me facturum existimaui, si hoc Capite illius historiam retexerem, eamque suis numeris absoluerem, atque florentis iconem quàm accuratè fieri possent ad vivum expressam oculis subiicerem.

ACORO igitur sunt folia Iridis tenuifolia maioris, Acori absoluteior historia. breviora multo, & elegantissimo virore nitentia, dorso aliquantulum utrimque extante, ut in Xyphij foliis, quorum formam admodum emulantur, & illorum aut paucis illius Iridis quæ luteum florem profert modo,

R

alia ex



alia ex aliis prodeunt, mediumque folium reliquis plerumque oblongius est: sunt autem gustu non ingrato, sed amaricante, tria que iucundo & aromatico spirant odore. sub h' emis inuicem marcescunt & siccantur, primo autem vere noua germinant quemadmodum in Iride anni folia: attamen etiam siccata & exsiccata vel post multos annos odoris gratiam retinent. porro nō ex medio foliorum caulem promit, sed ex latere exit folium potius quam caulis, eiusdem cum foliis longitudinis, bicubitalis videlicet nonnunquam, quod à medio ad summum usque planum est, & reliquis simile, infima verò parte crassius, angustiusque, & veluti in triangularem caulem efformatum. Vbi iam gracilescere et complanari incipit, unicum nucamentum in latere promit, coryli inlo haud maius initio, sed prominens et erectum, lincis-que obliquis & transversim sese secantibus distinctum, flosculis, cum sese explicat, pallidis, muscosis, inodoris, quatuor foliolis constantibus plenum, quod paulatim augetur, & amplitudinem crassitiemque humani fere digiti tandem adipiscitur, frequentibus tuberculis viridibus tam eleganti serie dispositis exornatum, ut recentem Pinastrum conum emulari videatur. Radices illi sunt oblonge, foris candidæ, vel si supra terram extent, virescentes, intus candidissimæ, frequenter sed inæqua iter geniculatæ, firmæ, odoratæ, gustu subamaro et acri, innumeris parte inferiore adnatis fibris albicantibus: serpant autem & summa tellure sese diffundunt, atque in obliquum aguntur, ex singulis fere geniculis alternatim noua germia producentes.

Nascitur autem ingenti quodam lacu ad radices montis præclsi iuxta Prusam Bithynia urbem. Sed retulit mihi doctissimus vir Bernardus Paludanus Frisius cum anno 1577. ex Polonia in Italiam hac iter fa-

ceret, co-

ceret, copiosè admodum etiam inueniri supra Vilnani urbem, in paludibus, extrema Lithuania Mosconia a spectate, & ab incolis Tattarsky appellari, quod a Tartaris eius usus primùm illis sit demonstratus. Circumferre verò plerumque hanc radicem, nec aquam bibere, quin prius Acori radix in ea fuerit macerata. Simile etiam quiddam de huius plantæ nomine tradit Matthæus a Michon Sarmatia lib. 1. c. p. 12.

Tattarsky.

RECENTES autem radices suo cortice delibratas et diligenter repurgatas condire solent Constantinopoli, atque in usum seruare: manè enim plerumq. edere solent aduersus corrupti aeris contagia, ut mihi. retulit Dn. Philibertus de Bruxella p. m. qui Constantinopoli rediens vasculo iis conditis pleno me donauit.

Cum verò Acori vires ac facultates Dioscorides, Galenus & alij plerique satis prolixè descripserint, lectorem ad eos ablegamus.

## DE PSEUDO-ASPHODELO PVMILO foliis Iridis. CAP. XXX.

AD quam potissimum classẽ hanc plantam referrem, diu dubitavi, nec adhuc satis certus sum quò referri debeat, foliis eius & floribus in diuersam sententiam me pertrahentibus. Quoniam vero perelecyon est & uulga, propter foliorum similitudinem Iridibus subungere potius malui, quàm nullum illi locum in nostra Historia concedere.

NUMEROSA autem sunt illi folia, sese mutuo amplectentia, frigidum modo, angusta, breuia, viridula, dura, amarifculo & calido sapore: è quorum medio cauliculus gracilis egreditur, pedali interdum aut m. ore altitudine, qui spicam fert flosculorum sex foliolis constantium instar Asphodeli, colore ex herbaceo pallescente,

Pseudoasphodeli historia.



sine odore: quibus succedunt trigona capitula, nonnunquam & tetragona atque pentagona, semen minutissimum & rufum continentia: radix vix corpus habet, sed tenuibus aliquot fibris duntaxat constat.

Nascitur in Snealben, atque in gramineo colle monasterio Neuberg imminente, in Escher, & quibusdam aliis pratis montanis. Floret Iunio: semen Julio maturescit.

## DE POLYGONATO.

## CAP. XXXI.

SATIS magnam varietatem in Polygonato deprehendi. Nam est vulgare illud omnibus Provinciis familiare, quod in Pannonia & Austria umbrosis abundanter sponte etiam nascitur. Est aliud illi planè simile, nisi quod in duplo maiorem altitudinem excrescit, crassioresque habet radices: id alibi videre non memini. Est præterea Polygonatum minus Herbariorum, foliis angustioribus, rubie modo caulem per intervalla ambiculis, fructu per maturitatem rubro: id etiam in montanis pratis loco umbroso copiosè nascitur.

Polygonatū  
vulg.

Polygonatū  
maius.

Polygonatū  
angustifolium.

Sed tria alia genera in Pannonia observavi nulli adhuc quod sciam descripta, tametsi tertium Matthiolo notum fuisse videatur, & primum fortè Cordus lib. 1. Historie de Plantis angulosi Polygonati nomine insigniat.

PRIMUM habet pedalem caulem striatum, firmum, non admodum inflexum, sed sere rectum: folia vulgari similia, eodèque modo, hoc est, alternatim circa caulem disposita, sed brevioribus quam in illo spatium, minora tamen, firmiter, neque mollia, sapore ingrato: ex singulis alarum sinubus duo aut tres flores exeunt, brevibus, magnæque ex parte singularibus in-

Polygonatum  
R. ac odore.



herentes pediculis, vulgare cum forma tum colore similes, verum maiores, & odore (qui in vulgari nullus est) oxyacantha: bacca deinde virides initio & sphaerica, quemadmodum in vulgari, maiores tamen, & postmodum nigricantes, semen continentes ossium, durum: radix oblonga, & obliqua, geniculata, initio & recenter eruta, candida, deinde pallescens, nonnunquam etiam purpurascens, praesertim circa germina, vulgari fere par, tamen si etiam aliquantulum tenuior inueniatur, interdum etiam amplior, ubi solum pinguius & bene subactum nata est.

Frequens est in montibus illis siluosis vulgo Leytenberg nuncupatis supra Manderstorf, Bruderstorf, & in plerisque aliis Pannonia montibus ultra Danubium, inter saxa, atque etiam in montibus interamnis Pannoniae ultra Drauum, praesertim ad arcem Greben. Floret Maio: bacca maturescunt Augusto, interdum etiam multa hieme e caule pendentes conspiciuntur.


ALTERVM superiori similem habet caulem, eiusdemque altitudinis, vel etiam maioris, non adeo rectum tamen, sed magis inflexum: folia duplo maiora quam in reliquis, ad foliorum Ellebori albi amplitudinem interdum accedentia, dura, nervosa, laeua, dilutiore virore praedita, neque subtilius incana ut superiora, sapore primum nonnihil acido, deinde paulum acri: flores alteri similes, inodoros tamen, neque ex singularibus pediculis singulos, sed binos aut plures ex oblongiore pediculo dependentes ut in vulgari, cui etiam fructum similem habet: radicem albam, oblongam, obliquam, geniculatam, superiori magnitudine parem.

Crescit hoc copiose locis umbrosis inter Brumam & Weyspach, aliisque vicinis montanis siluis. Floret cum superiore.

II.

Polygastum  
πλάτφυλλω.





TERTII caulis pedalis est, nonnunquam cubita-  
 III. *lis & amplior, rotundus, inflexus, Polygonati vulgaris* Polygonatū  
ramos. lanfo-  
lium.  
*modis, in unum aut alterum, interdum etiam tertium*  
*ramum diffusus: hunc folia alternatim Perfoliata sive*  
*modo amplectuntur, sed Polygonati foliis similia, mollio-*  
*ra tamen, subius aliquantulum incana, sapore primum*  
*dulci, deinde saluam ciente, & nonnihil acri: ad singu-*  
*lorum foliorum exortum, sub ipsis foliis, atque adeo ad*  
*illorum latus, eadem serie exeunt singulares pediculi, ob-*  
*longi, exiles & incurui, ex quibus flores propendent sin-*  
*gulares, concavi, Lily conuallium floribus persimiles, sed*  
*magis hiantes, atque in sex lacinias extrorsum inflexas*  
*secti, interiorēque parte nigricantibus quibusdam ma-*  
*culis aspersi, odore propemodū oxyacanthæ: fructus Po-*  
*lygonati minoris siue angustifolij fructui similis, trigonus*  
*immo & viridis, per maturitatem verò oblongior &*  
*rubeſcens, paruaque corna interdum equans, in quo*  
*multa grana albicantia congesta sunt: radix à Polygo-*  
*nati vulgaris radice differt: nam neque crassa est, neq.*  
*adeo candida, sed exilis & nodosa, siue in frequentes no-*  
*dos extuberans, plurimis crassis fibris constat, uti Tha-*  
*lietri quædam genera, quemadmodum pictor scitè ad-*  
*modum expreſſerat, sed sculptor sua negligentia & in-*  
*ſcitia corrumpit.*

Florentem unam aut alteram plantam in montis  
 Wechsel umbrosis siluis, deinde in Durrenstein inter  
 saxa & frutices mense Junio & Julio anni 1576. inue-  
 nit, quæ in hortum translata, fructum ad maturitatem  
 perducunt: frequentiore postea, magnamque &  
 multis alis brachiatam in scrobibus quibusdā umbro-  
 sis inter filicem in descensu Durrenstein, paulo supra  
 mapalia a montanis pastoribus habitata æstivis mensi-  
 bus, florentem Augusto 1578. Rami verò cum fructu  
 nobis ex



nobis ex Silesia vsque, ubi frequentem nasci audio, prius communi-  
cati sunt à D. Friderico Sibiſio, deinde etiam aliquot radices ex eadem transmissæ. Perſiſtit in hortis  
loco umbroſo reposita, florésque & ſemina ſuo tempore proſert.

His addo quartum quoddam genus elegantiffimum, mihi à doctiffimo viro Achille Cromero Sileſio, commu-  
nicatum anno 1580.

IIII.

Polygonati  
ramof. angu-  
stifolium.

Habet id cubitalē caulem, anguloſum, in multas alas  
tenuēs diuifum, quæ æqualiter ex ſingulis angulis exo-  
riuntur, quaternæ interdū, nonnunquam & quinæ pro  
angulorum numero: ramuli tenuēs oblongis & anguſtis  
foliis obſiti ſunt, binis, ternis, aut quaternis æqualiter in  
circuitu prodeuntibus: in quibus flores anguſtiſolij Po-  
lygonati floribus ſimiles, paulo tamen minores, breui pe-  
diculo dependentes inter foliorū alas ſparſi ſunt: quibus  
ſuccedit fructus rotundus, ruber, pulpa plenus, & ali-  
quot oſſea grana continens: radix vulgari ſimilis eſt,  
cādida, nodofa, propagines ad latera fundens, & candi-  
cantibus fibris obſita.

Iſdem locis quibus ſaxatile rubum eruiſſe aſſerebat.

NVLIVM nomen vulgare iſtarū plantarū nomi-  
mus, niſi quod duæ priores eodem cum vulgari Polygo-  
nato nomine à rhizotomis mulierculis nuncupantur,  
Wepſturts videlicet, Vngaris cū vulgari Salomon  
pocheti, .i. Salomonis ſcillum dicitur. Tertia illis, atq.  
etiam montanis paſtoribus & venatoribus planè ignota  
eſt. Eū videtur adūbrare Matthiolus Lauri alexādri-  
ne nomine: verū neq. effigies ſatis ſciè expreſſa eſt, neq.  
eius hitoriā ipſe tradit. Sine vero eam adumbret quam  
nos hic damus, ſive aliam, nulla ratione ad Laurū ale-  
xandrinam referri poteſt, quam Dioſcorides non inter  
folia fructum ferre dicit, ſed ἐν μέσσοις, in medijs folijs:

Laurus alexā-  
drina Ma-  
thioli.

Theophrastus

*Theophrastus* autem expressius ἐπιφυλλόκαρπον appellat lib. 1. cap. 16. & lib. 3 cap. 17. *Historia plant.* ubi eam *Oxymyrſines* sine *Rusci* modo fructum ferre ait, ἐπιφυλλόκαρπὸν ἔστιν ὥσπερ καὶ ἡ κεντρομυρσίνη; ἀμφότεραι γὰρ τὸν καρπὸν ἔχουσιν ἐκ τῆς ῥάχεως τῆ φύλλου. *Commodius* itaque meo iudicio *Polygonati* generibus adscribetur, quàm *Lauro alexandrina*. Nisi quis forte ad *Ideam* radicem *Dioscoridis* referendam putet: sed cum mutila admodum sit eius descriptio, difficile esse existimo aliquid certi posse statuere. Quarta sine dubio *Angustifolij* genus est, & *Polygonatum* ramosum angustifolium cognominari poterit, ut præcedens *Polygonatum* ramosum latifol.

Bislingua.

VERAM porro *Laurum alexandrinam* nunquam me vidisse ingenuè fateor, si ab ea qua vulgo *Bislingua* dicitur, & *Hippoglossum* *Dioscoridis* esse censetur, diuersa sit. *Theophrastus* enim nusquam *Hippoglossi* meminit, sed *Lauri* duntaxat alexandrina, locis suprà citatis, & lib. 1. cap. 16. expressè eam recenset inter καρποφόρα μετὰ τὸ περιιληθῆτα τὸν καρπὸν, id est, fructiferas quæ habent fructum quasi circumuolutum & interceptum.

Veterum  
Lauri alexandrina.

Præterea *Plinius* lib. 15. cap. ultimo, *Laurum alexandrinam* ab aliquibus *Ideam* vocari tradit, ab aliis *Hippoglotion*, & *Carpophyllion*, atque inter folia semen rubrum ferre. Ipse verò & *Dioscorides* eam in montibus nasci tradunt, *Hippoglossi* verò natales subtruerunt. Certe *Bislingua* in montibus nascitur, & abundanter quidem in monte *Dino Georgio* oppidulo in montem transdanubiana *Pannonia*, tribus ab urbe *Posnienſi* miliaribus inuenitur: unde *Rhinotomi* plurimam huc adferunt, et *Viennensibus* mulierculis vendunt: ma gno

circum

uenim illis est in usu, et præcipuè ad vnae procidentiam. Non minus deinde copiosam anno 1579. in montibus non procul à Zollonock obseruari. Vulgo auffenblat appellant.

## DE PSEVDODAMASONIO.

## CAP. XXXII.

CAVLIS huic singularis, peduli aut maiore am-  
 pitudine, firmus, aliquantulum lanuginosus, quem  
 quaterna aut quina ambiunt folia, venosa, Ellebori al-  
 bi foliis similia, alternatim ut in illo disposita, subhirsu-  
 ta nonnihil, & subamaro sapore: ex folij quod extremo  
 cauli insidet, quodque reliquis minus est, nonnunquam  
 & ex proximi sinu prodit flos unicus, oblongo pediculo  
 carens, quatuor foliis crucis forma decussatis, oblon-  
 gis et mucronatis, colore ex purpura nigricante constans,  
 quorum superius & inferius maiuscula sunt, lateralia  
 verò admodum angusta, & interiore parte lanuginosa,  
 ex quorum umbilico membranæ quidam & tumens,  
 intusque vacuus utriculus protuberat ovi columbini  
 magnitudine, superiore parte secundum umbilicū non-  
 nihil apertus & hians, instar calceoli ore patulo, colore  
 nunc luteo, nunc pallido, intus nonnihil villosus & in-  
 ferne lineis quibusdam purpureis secundum longitudi-  
 nem distinctus: hiatum illum tegit duplex ansula, qua-  
 rum superior alba est, & tenerior, purpureis maculis  
 confersa, inferior verò densa, colore herbido, & veluti  
 canrorum ocellos in lateribus habes: ipse flos odoris ex-  
 per non est omnino: siliqua illi succedens oblongior est,  
 minimi digiti crassitie, triangula, semen tenue & velu-  
 ti puluerem continens quem admodum orchideæ, et quæ  
 vulgo Elleborine nuncupatur, ad cuius genus potius re-  
 ferenda videtur: radix nigra est, non admodum crassa,  
 in longum

Pseudodama-  
 sonij historia.



in longum & obliquum summa tellure sese spargēs, multisque fibris donata, atque superiorum annorum caulibus vestigia impressa habens, ut in pseudocorallio fere conspicimus, extremitatibus semper in nouum germen exuberantibus: amariuscula est si degustetur.

Inuenitur nonnullis siluosis locis Leyteberg supra Bruterstorf: reperi et apud Closterneuburg prato quodam sub fruticibus coryli, & in siluis Entzeßtorf vicinis: sed omnium abundatissimè in Pannonica quadā silua, magno miliari ab arce munitissima Nemethwywar Ill. Dn. Balthasaris de Batthyan. In Hercinia item silua, plurimisque aliis Germania locis copiose nasci ab amicis intellexi. Floret Maio.

Sunt qui dicant flore albo inueniri, quod sanè nondum mihi videre contigit, quemadmodum nec id quod in cenipontinis montibus obseruauit doctissimus & diligentissimus noster Matthias de Lobel, utriculo purpureo.

Similis sanè cum Pannonico coloris florem ferremi hi retulerunt quod in Hercinia silua nascitur, & ab incolis Marien schuch appellari. Nec etiam colore differbat, quem è postremis Pannonia limitibus Dacia vicinis collectū ante paucos annos mihi ostendebat Ill. Dn. de Batthyan, cum ex ea peregrinatione redisset. Vngaris Ezerethgyw siu, id est millebona herba dicitur.

C. V. Gesnerus in epistolis frequentem in Heluetiis inueniri ait, illi verò luteum etiam florem tribuit, & ad Alismatis species refert. Cosmofandalos Pausania fortè fuerit, inquit, nam & sandaliū formam refert flos, & punctis ceu literis quibusdam notatur, etsi Pausaniae Hyacinthum esse coniicit, sed huic cum sandalio nihil. Quidam vir doctus Lonchitin primam esse putat. Inter fraven schuch appellant, hoc est calceolos Virginiis, à forma floris.



*Iosias item Simlerus ad calcem Commentarij de Al-  
pibus, illius etiam in hac verba meminit. Anckenbal-  
leni cabitum ferme aequat, folio Plantaginis aut Ellebori  
albi, terna aut quaterna per caulem folia habet, ex qui-  
bus erumpit ut in Perforata in summo vnus flos, raro  
duo, is luteus est, oblongus, luteum oni exprimens, con-  
cauus, quem ambiunt apices, seu folia potius ignita ru-  
tilantia: morionum habitus procul contuentibus refert,  
aut demonum laruas, cadente flore semen in siliqua  
continetur. Damasonij aliqua species.*

*Huius nullum vsum scio, aut apud aliquem Recen-  
tiorum legere memini.*

## DE ELLEBORINE RECENTIORVM.

### CAP. XXXIII.

Elleborine  
vulgaris varij  
generis.

*SUPERIORI sine dubio congener est ea planta  
que à Recentiorum nonnullis Elleborine cognominatur  
à foliorum cum Ellebori albi folijs potius similitudine  
quàm ab effectu. Nam licet dissimiles flores habeat, ut-  
potè orchidum generibus viciniore: reliquis tamen no-  
tis satis inter se conueniunt. Eius autem aliquot sunt  
genera cum foliorum amplitudine tum floris colore va-  
riantia.*

- I. PRIMVM, caulem habet pedale, aut ampliorem,  
firmum, quem per intervalla inuoluunt inordinata folia  
sena aut septena, neruosa, Hellebori albi folijs similia, sed  
angustiora, gustu ingrato & amaro: flores in summo  
caule denos aut duodenos, spicatim congestos, albos, qui-  
nis folijs constantes, & in medio veluti paruum galeam  
complexos subluteo labro, non multum ab orchidis flori-  
bus distantes, & ut illi, siliqua angulosa striata & con-  
torta inherentes, inodoros: semen in siliquis minutum  
scobis instar: radices crassiusculas, fibrosas, & ex vno  
velu

velut capite prodeuntes, & sparsas, colore subruffescēte,

Prouenit in opacis Gallia, Germania, Leytano saltu,  
& plerisque aliis Austria & Vngaria locis, quinimo  
in Pannonia etiam interamni, inter Drauum & Sa-  
uum flumina.

Hoc genus pracocius est reliquis, & Maio mense ple-  
rumque florere solet.

ALTERVM pari est magnitudine, foliis paulo la- 11,  
tioribus, floribus minoribus, qui etiam quinq foliis con-  
stant, & galeolam cum labro prominente amplectuntur,  
colorisque sunt foris herbacei, interius nonnihil candi-  
cantis, odoris nullius, atque torosa & contorta siliqua in-  
herent: eius radix priori similis est.

Inuenitur in quibusdam Pannonia & Austria sic-  
cioribus pratis: memini & in Noribergensi silua vrbis  
vicina ad latomias obseruare 1579.

TERTIO generi minor est altitudo, similia inter- 111,  
dum folia, nonnunquam multo latiora; flores aut omni-  
no purpurascētes, aut propemodum carnei, secundo ge-  
neri forma omnino similes; nec radix etiam differt.

Crescit id in pratis montanis, & in siluis caduis hu-  
ius provincie,

QUARTVM cubitali altitudine maius, amplis 1111,  
foliis, oblonga purpurascētiū florum spica nascitur in  
multis Pannonia siluis, praesertim vero vbi Pseudoda-  
masonium inueniri dixi.

SED & in eadem silua cum Pseudodamasonio, aliis- v,  
que Zollonock vicinis Quintum genus cubitali caule  
eruere memini, tenui tamen, rotundo geniculato, quem  
in singulis geniculis alternatim ambiunt angusta folia,  
primi generis foliis non dissimilia: summus caulis desinit  
in spicam florum sex, octo, aut plurium interdum, qui  
quinis foliis elegantissimo dilutoque purpura colore pra-



ditis constant, inter quæ latet veluti quadam galeola, muscarum proboscidi similis, labrum inferiore parte adnexum habens, equalis fere cum foliis longitudinis, candicans, intus striatum: sustinentur y flores angulosa, contorta, atque nonnihil etiam hirsuta siliqua: radix illi fibrosa, alba similis.

Florent omnia hæc, præter primum, genera Junio, nonnunquam etiam Julio.

CETERVM *Elleborus albus*, tam qui albo flore, quàm qui ex rubro nigricante præditus est, frequēs admodum nascitur in his regionibus. flore albo quidem in pratis urbi vicinis, & qui ad *Alpium* radices siti sunt, tum etiam plerisque *Vngariæ* pratis: at ex purpura nigricante, in omnibus fere caduis silvis editiore loco aut in collibus sitis. *Vtrumque Ungariæ* *hunyor* appellant.

*Elleborus albus* duorum generum.

## DE GENTIANA.

### CAP. XXXIII.

MULTA *Gentiana* genera alunt *Pannonici* et *Norici* montes: in his tamen magnam illam flore luteo *Veteribus* descriptam, mihi nondum observare licuit. Ex eorum autem numero quæ in *Pannonia* montibus & *Noricis* alpibus (*Noricas Veterum Geographorum* more appello, eas alpes quæ *Pannoniam* & *Austriam* inferiorem attingunt) proveniunt, quædã sunt aliis etiam provinciis communia, quædam verò his peculiaris, meo iudicio, quandoquidem à *Recentioribus* minimè descripta inueniam.

HARVM autem *Alpium* maxima, à vulgari maiore nequaquam differt forma: etenim ampla habet folia, *Ellebori* albi foliis haud multum absimilia, sed tene-

1.  
*Gentiana* maior flore purp.



rora, & saturatiore virore splendentia: caules digitali, aut pollicari interdum crassitudine, rotundos, cubitales, nonnunquā bicubitales, geniculatos, quos ambiunt similia folia, aliquantulū tamen angustiora ex aduerso semper sibi opposita: extremos caules ambiunt bina aut terna confertorum florum corona, qui non sunt lutei aut stellati, ut in vulgari maiore, sed purpurei, maiores, concavi, in senas aut plures lacinias obtusas per extremum secti, & punctis quibusdam purpureis, inferiore & interiore parte, qua candidiores & dilutiores sunt, distincti, odore nullo, totidem quot sunt lacinia staminibus oblongum & bifidum capitulum internē ambientibus, in quō continetur copiosum semen, planum, & paleaceum, minus quā in lutea illa maiore stellato flore, colore rufescente: radix crassa, longa, foris plerumque lutea, intus alba, impensē amara, fibris digitalibus subinde praedita, singulis annis noua germina (quemadmodum maior lutea) proferens, & multos caules ex eadem radice producens, praesertim ubi adoleuit, sed qui alternis duntaxat annis ut plurimum floriferi esse soleant, interquiescente nimirum uno anno à partu matre.

Exit sponte in Pannonicarum Noricarūmq. alpinum iugis abundantissimē. Floret Augusto: semen Septembri maturescit, nouis niuibz in ea iuga cadere incipientibus.

Variat autem mirum in modum floris colore. Nam in Styria superioris albis, veluti in Tauro & Indenberg, aliud eius genus inuenitur, nihil quidem à superiore aut forma, aut magnitudine differens: sed flores qui in alio sunt purpurei, in hoc omnino niuei conspiciuntur.

Verū neque hoc genus, neque illud purpureo florere cecurare unquam potuimus, aut vlla diligentia & cul-

2.

Gentiana maior flore albo.

tura efficere, ut in nostris permanere vellent, nedum flores proferre.

Gentiana maior pallida punctis distincta.

3. In Silesia verò mōtibus eruit doctissimus vir Achilles Cromerus Nissensis similem planè magnitudine & forma, cuius flores paulo (ut ex sicca quam ad me misit planta deprehendere licet) minores, colorem habent pallidum, siue ut idem ad me scripsit, obsoletum luteum, quamplurimis nigris maculis intus & foris aspersum.

Addebat, ab eo qui ipsum in montana illa loca deduxisset sibi relatum, in alio quodā monte præalto similem nec forma dispari reperiri quæ caruleo esset flore.

Gentiana asclepiadis folio.

- II. ALTERA cubitalibus constat ramis, pluribus ab una radice exeuntibus duris firmisque, in quibus multa folia, bina semper inter se opposita, mollia, quinq. nervis secundum longitudine excurrentibus insignita, mucronata, ad Asclepiadis vulgo credita folia nonnihil accedentia, sed colore dilutius virète: à medio fere caule sursum versus ex alarum sinu, singulares ex aduerso siti exiliant flores, interdum bini aut plures, oblongi, concavi, in quinque angulos acutos desinentes, & veluti sese complicantes, colore nunc purpureo siue caruleo saturatione, nunc dilutiore & veluti cinereo, quinque intus pallidis staminibus: siliqua subsequitur oblōga bicornis, quæ per maturitatem dehiscens, semen ostendit planum, paleaceum, superiore minus, colore cinereo: radix digitali-crassitudine, lutea, multas oblongas eiusdem coloris in latum spargit, singulis annis augescens, & noua germina proferens, gustu impense amaro. Fertior hac est superiore, nec interquiescit ut illa, sed singulis annis (quando vetusta est) multos caules floribus onustos producit.

Prouenit copiosè in utraque Pannonia, Styria, & Austria inferiore ad montium radices, collibus vmbrosis, nec vsquam





nec usquam in summis & apertis iugis. Floret Augusto: semen uti in superiore maturefcit mense Septembri.

Pertinax quidem hac est, & fere mitiora loca respuit: interdum tamen cura et diligentia fit, ut in hortis comprehendat, & singulis annis repullulet, & floreat: at tamen quasi natio aëre & pabulo priuata atque veluti compedibus vineta, ligere videtur, ac pristini vigoris & elegantia plurimum amittit.

Virag. hac Gesnero nota fuisse videtur, à quo Tragus se accepisse fatetur. Maiorem in descriptione Montis fracti klepne **Entian** vocat: alteram **grosse bitter wurts**/ hoc est, maiorem amaram radicem. Sclauonici rustici in transdanubiana Pannonia non procul Cassovia Swieczka appellant, quo vocabulo iudem candelam exprimunt, nimirum quia eius radices flauæ, longæ & tenues, cereis candelis (quæ in globum aut spiras conuolui solent) similes sint. Eius autem radices decoctum feliciter calculosis propinari, experimento se compertum habere affirmant: non minus quàm polygoni genus illud **Herniaria** vulgo **Herbariorum** appellatum, quod exsiccatum & in puluerem tritum boues equorum vulneribus atque vlceribus inspergere solent ad vermes in iis natos abigendos & enecandos.

Iosias Simlerus etiam **grosse bitter wurts** vocari secundam **Gentianam** tradit, eaque pastores uti ad vbera vaccarum, si à muribus, araneis aut aliis venenatis bestiis ladantur, curanda.

III. TERTIA est quæ vulgò **Cruciata** vocatur: à Germanis **kreutz wurts** & **modelget**: Ungaris verò **Zent Lazlo kiraly** siue, id est, S. Ladislai Regis herba. Quæ cum à Trago atque aliis sit descripta, non est necesse eius historiam hic repetere.

Eius tamen duas differentias obseruasse videor: alteram

Herniaria

Gentiana cruciata.

Gentiana III.



alteram ramis humi procumbentibus & minorem: alteram firmis & erectis caulibus, eamque maiorem. flores item alterius magis carulei spectantur, & illarum altera radicem in foramina sectam minimè habet. Nascentur verò ea per uniuersam Pannoniam cum in collibus montibusque apertis & gramineis, tum pratis siccioribus, & secundum itinera locis herbosis.

IIII. ALTITUDINEM Secunda nonnunquam

Gentiana angustifolia.

hac Quarta aequat, caulèmq; habet ut illa satis flexilem, tenuem, geniculatum: folia in singulis nodis inter se opposita oblonga & angusta proferentem, trinervia ut sunt omnium Gentianarum: circa summum caulem aliquot ex foliorum alis prodeunt ramuli, elegantes & caruleos atque in quinque lacinias extrema parte diuisos flores & aliorum modo concauos: radix crassiuscula est, & circa summum caput in aliquot lentasque & flavescentes fibras diuiditur secundo generi fere similes, sed minores.

Crescit in pratis ad radices montium sitis non procul à Staremburg arce Generosi Domini de Heysenstein, apud Badenses thermas, & in uliginosorum pratorum marginibus post arcem Eberstorf Mag. Domini Hieronymi Beck.

Floret Augusto.

2. Eius proculdubio genus est, quæ à Clariss. Dodonao Viola Calathiana aliquando vocata est, quod Augusto & Autumno floreat, Cordus Pneumonantem appellat: humentibus ericetis secundo ab urbe Bruggensi miliari, inter Maldeghem & Malam, frequentissima, ubi eam aliquoties cum Psendoasphodelo luteo folio Xyphij, Rorèque Solis duorum generum eruere memini: & nunc florem variantem aliquando conspexi.

Gentianella verna maior.

- V. Vt Postrema altera species Autumno duntaxat florere



florere conspicitur: ita subsequens verno tempore flores suos proferre solet. Sena verò aut octona habet folia supra terram expansa, bina semper ex aduerso sese spectantia, viridia, laeua, densa, dura & mucronata, Myrti latissima foliis fere aequalia, gustu impense amaro: ex horum medio cauliculus exilit pollicem trāsuersum longus, interdum paulo amplior, angulosus, quaternis plerumque foliolis multo minoribus, binis tamen alternatim semper cōtrario situ nascentibus obsitus, unde calyculus emergit unicum florem cōtinens, magnum, pro stirpis proportionem, calathi aut campanula modo concavum, oblongum, in quinque angulos desinentem, non obtusos quemadmodum pictura refert (quam optime à pictore expressam sculptor corripit) sed mucronatos cum duabus utrimque, ubi lacinia findi incipiunt, appendiculis, elegantissimo & viuidissimo carulea purpurea colore, pallido pistillo intus prominente, qui quinque veluti costis ex infima ipsius floris interiore sede prodeuntibus fulcitur: florem consequitur oblongum & acuminatum capitulum, quod sese in duas aequales partes aperiens, semen ostendit exiguum, striatum, terrei coloris: radix non admodum crassa, flavescentibus sine pallidis aliquot fibris donata, & propagines ex lateribus producens.

Crescit in Sneberg, & Etzcher abundantissime, aliisque alpibus continua serie sese producentibus perpetua quasi nunc obsitis; ubi Junio & Iulio, hoc est primo istic vere floret, sub Iulij verò finem & Augusto semen maturitatem consequitur. At in mitioribus locis, in quibus rarius inuenitur, & in hortos translata, Aprili & Maio floret.

Illius meminit Gesnerus in descriptione Montis fratii, et Witter wurtz appellat: meminit & Tragus capite de Gentia-

de *Gentiana*, eiusque quarta species est: describit illam etiam noster Lobelius in aduersariis, flos tamen in icone malè expressus est, & *lychnidis coronaria* florē magis representare videtur: sed in Flandrica editione quam anno 1581. in lucem edidit, aliquantum felicius expressit.

SEXTA etiam verna illi omnino similis est, quam in VI. *Hispanicarū stirpium historia* descripsi, & istic etiam Gentianella verna minor. annotavi: ideo illi *Gentianella verna minoris* nomen indidi, ad eius quam modò delineavi differentiam, quam *Gentianellam vernam maiorem* nuncupavi.

## Gentiana VI.



Abundo

*Abunde prouenit in celsissimis Sneberg, Snealben, Etſcher, & Durreſtein iugis herbido ſolo, ubi ſub Iuni finem floret: at in mitioribus vicinis collibus, & ſiccioribus pratis Maio, & ſemen ſub extremū Junium proferit. Minus hac hortum ferre poteſt quàm ſuperior, & omnem culturam reſpuere videtur.*

*Hanc Iofias Simlerus in Commentario de Alpibus Dimmeltſtergel appellare videtur à colore, ni fallor, celeſti elegantiffimo: niſi fortè undecimam qua poſtea deſcribetur eo nomine intelligat, qua celeſti etiam colore pradita eſt.*

CETERVM omnes illà viua & perenni radice ſunt, hoc eſt, prolato flore & ſemine interire non ſolent: ſed per multos annos durant, ſinguliſque annis ex eadem radice noua germina & caules producant. At quarum modò deſcriptionem dabimus, non ſunt durabiles: verum emarcido flore, diſperſoſque ſemel ſemine ingruente hieme planè ſolent interire, & ex deciduo ſemine renaſci. Earum autem plures ſpecies obſeruauimus, quas ſigillatim & ſerie quadam diſponemus, initium à maxima facientes.

## VII.

Gentiana fugaces ſive annua.

CUBITALEM habet Prima caulem, firmum,geniculatum, per quem ſecundum nodos ſparſa ſunt bina ſemper folia ſibi inuicem oppoſita, trineruia, lata ſede, & ſine pediculo cauli inharcentia, et ſenſim in oblōgum mucronem deſinentia: ab imo fere caule ex foliorum aliis enaſcuntur dodrantaes & palmares ramuli, tenues, minoribus foliis ſepti, quinos, ſeptenos aut plures flores inter folia proferentes, in quinque lacinias mucronatas diuiſos, colore ex caruleo purpureſcente, exiguos pro planta magnitudine: his ſuccedunt oblonga & anguſta ſiliqua tenui ſemine plena: radix ſingularis exigua pauciſſimis fibris pradita.

Nāſcitur

Nascitur in pratis herbidisque locis ad montium radices sitis: atque Iulio & Augusto floret.

ALTERA secundum radicem multa oblonga tri- VIII.  
neruia & in orbem disposita habet folia, è quorum medio caulis excrescit pedalis, quadrangulus, ab imo ad summum in singulis internodiis binis ex aduerso nascentibus ramulis praditus, qui binis geniculis intercepti, ternos aut plures singuli ferunt flores calathi aut campanule forma, quarto generi fere pares, in quinque etiam laciniis diuisos, sed colore purpureo dilutiore, singulis laciniis infima parte interius purpurea lanugine pubescentibus: iis succedunt oblonga cornicula, exili & rotundo semine pradita: folia quæ caulem & ramulos in singulis geniculis vestiunt, minora et angustiora sunt, magisque mucronata: radix exilis est, ex albido pallefcens, rarisque fibris donata.

Prouenit iisdem locis quibus Septima; atque eodem etiam tempore floret.

PARI ferme Tertia excrescit altitudine, nec minus IX.  
frequentibus ramis est pradita: caulis etiam quadrangulus, terni aut plures in singulis ramis flores superiori similes, sed breuiores amplioresque, virescente primum colore, deinde subcaruleo: quibus oblonga cornicula semine plena ut in superiore succedunt: folia in singulis nodis multo latiora, mucronata, trinervia, ex aduerso inter se opposita, colore viridi obscuro & nigricante: radix superiori similis.

Obuia est hac in omnibus pratis in sublimi sitis, & montium iugis, florètque serius nempe Augusto.

QUARTA dodrantem non superat, cauliculis & X.  
ramulis exilibus, minoribusque foliis Centaurio minori fere paribus: flores minores habet, licet forma superioribus similes, qui modò dilutè purpurascences, modò carulei colo-



rulei coloris elegantissimi sunt: cornicula exili & sub-  
flavo semine scatent: radix licet exilior, à duabus su-  
perioribus minimum differt.

Crescit iisdem quibus altera locis: memini & in Bri-  
tannia observare non procul Douera mense Septembri  
partim florentem colore dulciore, partim semine pra-  
gnantem.

Ei similis videtur quam Lobelius Gentiana minima  
describit.

- XI. SED Quinta longè exilior, vix trium unciarum  
altitudinem aequans, licet multis alis pradita: foliola  
Centaurij minoris in singulis geniculis, aliarum more  
sita habet: flores minori Gentianella verna persimiles,  
caruleo colore elegantissimo praditos: cornicula superiori  
similia, exili admodum & nigro semine plena: radicem,  
quàm in superioribus minore, sed frequentioribus fibris  
donatâ. Floret in Etseri iugis etiam Augusti initio.

Ea forsitan est, quam Iosias Simlerus, ut dixi, Com-  
mentario de Alpibus Himmelftengel appellat, quem-  
admodum octavam Helberschis.

Omnes impensè amara sunt.

- XII. MINIME verò pratermittendum fuit elegantissimum  
Gentiana genus, quod ego quidem in hisce iugis minimè  
observavi, sed cuius iconem & descriptionem cum Londi-  
ni esset anno 1581. C.V. Thomas Pennaus Londinen-  
sis medicus, pro nostra amicitia liberaliter communica-  
vit, & à punctorum, quibus flores obsui sunt, frequen-  
tia punctatam Gentianam cognominavit.

Caulem habet geniculatum, cubitalem, iuxta radi-  
cem parum rubentem, folia Gentiane similia, ex inter-  
uallis bina, sed multo minora, venosa, quorum inferiora  
maiora sunt & longiora, pediculos rubetes habetia, su-  
periora verò cauli sine pediculis adherent, eumque fere  
amplectun-

Gentiana pun-  
ctata Pennei.

Gentiana XI.





amplectuntur. A medio fere caulis, è foliorum caulis oriuntur flores pentaphylli, striati, ab utraque parte tres, rarius duo, nisi iuxta summum caulem, ex quinque foliolis constantes subcæruleis, punctisquæ nigricantibus elegantissimè notatis (unde nomen) quinque apicibus in extremo luteis pradi: floribus succedunt vascula cum seminibus Gentiana similia, sed minora: radix parua, valde fibrata, ex fusco lutea.

Provenit copiose in monte Bockemuto Suitensium, & floret Augusto. Gustu amaro est, cum acrimonia quadam subtili.

ANNVIS ego subieci, quod ex radice coniecturam faciam (quantum quidem ex pictura deprehendere licet) semine maturo planè perire, & eo deciduo renasci: alioqui quinto loco reponenda fuisset, & forsitan etiam quarto.

## DE CLEMATIDE cærulea pannonica.

### CAP. XXXV.

GENTIANIS hoc elegans Clematidis genus subiciio, propter foliorum cum secundo genere cognitionem.

CVBITALIBVS porro assurgit sarmentis quaternis aut quinis, rectis, duris, lignosis, fulvescentibus, quadrangulis, striatis: multa illi folia, Asclepiadis foliis propemodum respondentia, lata, venosa, non adeò dura, gustu feruido quemadmodum Flammula Matthioli, bina semper inter se opposita, qua initio sese mutuo amplectuntur, ut folliculi aut tumentis vesicula formam exprimant, deinde expanduntur: extremis sarmentis & ramulis lateralibus singuli propendent flores magni, quatuor foliis crucis in formam decussatis constantes, deorsum spectantes Clematidis alterius purpurea florum modo, mucronibus tamen aliquantulum exterius reflexis,

Clematis aetate pannonica flore cæruleo.





eleganti caruleo colore, foris saturatiore, intus dilutiore nonnihil odorati, meditullium occupantibus multis staminibus villosis ex luteo purpurascentibus, quibus maturis succedit semen planum, in capitula rotunda et veluti pillulas congestum, longa, villosa, reflexaque cauda exornatum, illius Clematidis, siue vitis siluestris, quam Galli Viornam vocant, glomerato fructui similes, nulla tamen preditum acrimonia: radix satis crassa, sarmentitia, multas obliquas & fulvescentes fibras spargens, quemadmodum Clematis flore purpureo. Rami singulis annis ad radicem usque marcescunt, & incun- te vere novelli & frequentiores ex ipsa repullulant.

Invenitur sponte nascens in pratis circa Stampfen duobus ultra Posonium miliaribus, & aliis pratis ad Danubij ripas sitis supra Posonium, medio quasi itinere inter eam urbem & Tuben. Floret Maio & Junio: semen maturum est Augusto.

Illius semen, cum primum Viennam appuli, mihi à C.V. D. Aicholzio Clymeni nomine communicatum fuit: eodem nomine, cum stirpem nondum vidissem, in Belgicam ad amicos misi, unde prognatae planta simile nomen apud eos retinuerunt, tametsi sedulo eos paulo post monuerim Clymenum non esse. Nam cum subsequenti anni videlicet 1574. mense Maio plantam florentem quo dixi loco deprehendissem, Clymenum minimè esse, sed ad Clematidis genera omnino referendam esse, faciliè animadverti.

Flammula  
Matthioli.

CETERVM Clematis illa siue Flammula Matthioli, cuius modò meminimus, adeò frequens est per Austriam & Pannoniam, ut nulla sint silva, praesertim circa ripas fluminum in Danubium delabentium, quae tumescetibus fluminib. inundantur, quae ea non abundant.

Duorum





1. Duorū verò generum esse deprehenditur. Nam Altera sarmenta habet rubescencia, quemadmodū et foliorū nervos & pediculos, ea maturius floret & odoratior
2. est. Alterius autem sarmenta cum pediculis virescunt florēque serius producunt. Humanam verò interdum altitudinem superant, & singulis annis quemadmodum in superiore, ad radicem usque marcescunt, resurgentibus novo vere aliis frequentioribus.

## DE LINO SILVESTRI.

## CAP. XXXVI.

MIRAM etiam in Lino silvestri conspici varietatem, satis ex mea Hispanicarum stirpium historia patet: præter ea tamen quæ istic descripta sunt, quæcūq; alij tradiderunt genera, in Austria & Pannoniis nonnulla observaui, quæ reliquis rei herbaria Scriptoribus minime nota fuisse existimo.

1. PRIMVM ex eadem radice, quæ crassiuscula est & candicat, unicum, interdum plures profert caules, nunc pedali, nonnunquā etiam maiore altitudine, crassos, firmos, hirsutos, superiore parte in plures ramulos diuisos: folia quæ eos ambiunt reliquis generibus maiora, venosa, hirsuta, digiti minimi latitudine, Lini silvestris primi inter Hispanicas stirpes descripti, foliis (uti & tota planta) admodum similia, gustu gummoso, deinde amaricante: ramuli ab infimo ad summum floribus quinque foliis constantibus onusti omnium maximis, Maluæ vulgaris fere æmulis, colore ceruleo nunc vegetiore, nunc diluore, cum quinque etiam interius apicibus & totidem staminulis: quibus succedunt capitula, dura, acuminata, quinque foliolis siue apophysibus tecta & quasi involuta, quæ maturitate dehiscunt, semēque continent lino satino simile, latum, nigricans; splendens:  
radix

Linum si la-  
tissol. flo. ca-  
rul.



radix perennis est & singulis annis repullulat, cauliculosq; etiam ante hiemem profert, tenellos foliis multa lanugine hirsutis onustos.

Frequens est multis superioris Pannonie & inferioris Austriae locis editioribus & siccioribus, gramineis tamen, uti apud Posonium, Petronellâ, Veterum Carnuntum creditam, Altenburgum Danubio vicinum, & non procul silua qua ex Leytestorf ad Entzeestorf iter est, tum etiam supra Lachn pagum cum tribus alijs generibus, & supra Manderstorf. Floret Junio & Iulio: semen maturum est Augusto.

- II. ALTERVM multos ex una radice fert caules superiori fere similes, plerumque tamen breuiiores, Hypericon non multum ab similes, aliquantulum rubentes, firmos, folijs maiusculis, latiusculis & crassiusculis, priori fere paribus septos, minimè tamen hirsutis, sed durioribus, sapore perquam amaro: flores in summis caulibus copiosi, magni, quinque etiam folijs constantes, colore luteo pereleganti, quinq; staminibus è medio prorumpentibus, & totidè gracilioribus breuioribusq; villis: semen in capsulis compressioribus, reliquis paulo minus, nigricans quidem, sed non splendens quemadmodum illorum: radix satis crassa, contorta, albicans, aliquot fibris donata, singulis annis repullulans, novosq; caules producat.

Exit abundanter in monte Badensibus thermis inminenti locis gramineis secundum sepes, & plerisq; alijs locis in serie illa montium ad Danubium usque excurrente: item ad siluulam Lachn cum reliquis generibus. Floret & semen profert cum superiore.

- III. TERTIO complures sunt cauliculi teretes, firmique, pedali longitudine, virides, frequentibus foliolis Lini satiui similibus, ex viridi quasi caruleis onusti, extrema parte in aliquot ramulos diuisi, quibus insident flores

Linum fil. latifol. flore luteo.

Linum fil. angustifol. flo. caeruleo.





flores intense carulei, è quinque foliolis conflati, satini lini floribus similimi, quinque in medio staminula, totidemq; apices separatos continentes: semen in capitulis crassioribus, rotundis, lino satino similibus, nigrum, oblongum, planum, satino fere par: radix candicans est, aliquantulum fibrosa, & perennis.

Variis circa Viennam locis sponte nascitur, praesertim in gramineis declinibus, & iuxta vias.

Floret Maio & Junio: semen verò maturatur Julio. Amariuscule est sapore, deinde suavi acrimonia praeedito.

**DODRANTALES**, nonnunquam etiam pedales IIII.  
habet Quartum genus cauliculos, graciles, firmos, erectos: Linum fil.  
angustif. Bo.  
alba.  
folia lini satini, angustiora, dura mucronata, virentia, amaricantia: flores in summis cauliculis multos, magnos, quinq. foliis albis praeditos, circa umbilicum quinq. purpureis lineis distinctos, totidem staminibus, & quinq. separatis apicibus ex medio umbilico prodeuntibus, odoratos, semine in vasculis rotundis plano, nigricante, splendente, satino lino simili: radicem candicantem, duram, aliquot fibris donatam, perennem, & singulis annis novos cauliculos proferentem.

Copiose nascitur toto Viennensi agro, et plerisque aliis cum Austria tum Pannonia editioribus locis, & secundum publicas vias, atque apud Lachn cum superioribus generibus.

Floret Junio: semen perficit Julio & Augusto.

Inuenitur in Austriacis Alpibus, praesertim verò in Sneberg, aliud genus huic omnino simile, cum cauliculorum & foliorum gracilitate & tenuitate, tum florum forma, atque etiam radice: in hoc verò à superiore differt, quòd eius flores minimè sunt ninei, sed colore caruleo in candidum languescente, & veluti cinereo: capitula etiam quae floribus succedunt longè ampliora, nec quàm in satino minora. 2.  
Linum Gr.  
angustif. Bo.  
cinereo.

Flore-



Florēbat verò iſtic ſub finem Iunij, atque ſemen ſub Iulij finem & Auguſto matureſcit.

Eius etiam ſine dubio genus eſt, ſecunda planta in 3.  
Hiſpanicarum ſtirpium hiſtoria Lini ſilueſtris nomine mihi deſcripta: minor tamen eſt hac, minoresq; fert flores, nec eos nuneos, ſed ex diluta purpura candicantes & quaſi carneos.

Omnium porrò non modò ſemina ꝑꝑrii viro D. Ioanni Brancioni reliquisq; in Belgica amiſis anno 1574. miſi: ſed ad ipſum ſiccis etiam plantas cum aliis quibusdam elegantibus & ſuis floribus onuſtis perferendas curavi, ut illarum formam ſtatim videre poſſet, neque donec è ſemine miſſo naſcerentur, expectare cogeretur: incertus eſt enim plurimarum ſtirpium è ſatione pro-nentus, & ipſe admodum erat valetudinarium. Ex illis quaſdam icones imitatus arbitror, non è plātis ex Narbonenſi Gallia petitis.

EXIII, rotundo, dodrantaliq; aut paulo maiore v.  
aſſurgit Quintum cauliculo, quem aduerſo ſitu, quem Chamælinū  
admodum in Hyperico bina ſemper amplectuntur ſoliola, Lini ſatiui ſoliis non minora fere: ſupremus cauliculus in aliquot ramulos diuiditur, qui in oblongis pediculis ſoſculos proferunt perpiſillos quinque ſoliolis albis cōſtantes, luteis intus ſtaminulis, quibus exigua ſuccedunt capitula, lini capitulis non abſimilia, niſi minora eſſent, in quibus ſemen: radix tenuis aliquot exilibus ſi-bris donata eſt, ſed an perennis & rediuiua ſit ignorare me fateor.

Prouenit in herbosis collibus & montanis Aſtrie & Pannonia: floreſq; Iunio & Iulio.

Similem aliquando ad nos Machliniam è Torna-cenſi vrbe Ioannem Moutonum doctiſſimum & dili-gentiſſimum Pharmacopœum mittere memini.



*Linum filuestre* v.

PRIORA duo genera *Linii siluestris latifolij* Pannonici nomine appellare licebit: posteriora duo mihi erunt *Linum siluestre pannonicum angustifolium* siue *tenuifolium*: atque ea denuo ex florum colore suas differentias accipere poterunt. *Quintum Chamalinū* pannonicum nuncupari poterit.

## DE LINARIA PANNONICA.

## CAP. XXXVII.

DVO, præter vulgo notam & omnibus fere provinciis familiarem, *Linaria* genera in Pannonia montanis, & vicinis urbi Viennensi montibus crescunt, quæ nusquam alibi videre memini.

*BICVBITALI* interdū excrefcit *Primum* magnitudine, rectum ferens caulem, lauem, viridem, multis foliis satino lino similibus circumseptum, qui superiore parte in multos tennes breuesq; ramulos diuisus est, ferentes raros flores, *Linaria* quidem vulgaris floribus respondentibus, sed minores & pallidiores, rectu non. i. bil hirsuto & aureo, semen obseruare nō licuit: radix oblonga, candicans, multis tenuibus & maiusculis fibris in latera expansis firmata, perennis, & summo capite singulis annis novos caules proferēs, at non ex lateralibus fibris ut vulgaris subinde germinans. Tota amariuscula est.

Crescit in montium decliuibus secundum publicas vias; & ubi nullum gramen est: supra Posonium ad Danubium, & Gumpoſtkirchen, atque in Leitenberg.


Floret Junio & Iulio.

*RAMVLIS* est dodrantalibus & humi fufis *Alterā*, quos ambiunt folia vulgaris *Linaria* quodammodo æmula, minora tamē & pinguis seu crassa, colore ex herbaceo candicante, & casio, non temerè per ramulos sparsa, sed ordine quodam & serie aut terna, aut quaterna

I.  
*Linaria pannonica maior.*

II.  
*Linaria alpina pusilla.*





eos amplectentia: flores vulgari sunt similes, sed colore elegantissimo praditi, ex violaceo quodammodo purpurascens, labro inferiore, ubi hiat aut rictu diducto aperitur, planè aureo, sapore amaro: capitula deinceps cedunt crassiuscula, qua maturitate dehiscencia duas cellulas ostendunt semine plano, compresso, nigro plenas: radix tenuis, alba, multos ex uno capite ramulos proferens, atque etiam summa tellure serpens.

Inueni in precipitio Suealben, qua ad monasterium Neuberger descensus est, loco salebroso florentem extremo Junio, qua deinceps in horto reposita, loco umbrato & tenui benèq; subacta solo, bonum semen eo adhuc anno protulit. Rara & elegans plantula est, nec ubiq; obuia.

Ex Gesneri tamen epistolis liquet non ignotam illi fuisse, sed in Helueticis atque Reticis alpebus crescere.

VULGARIS etiam hic copiose nascitur, & Unser from hat mulierculis rhizotomis dicitur: Vngaris vadlen, id est, Diua virginis linum, & siluestre linum. Aliarum nullum vulgare nomen intelligere potui.

## DE OSYRIDE AVSTRIACA.

### CAP. XXXVIII.

Osyridis Aur.  
historia.

CVBITALIBVS aut amplioribus interdum ex una radice assurgit virgis gracilibus, duris, nigricantibus, lentis, obsequiosis, fractuq; contumacibus: quas non quina aut scna (ut Dioscorides sua tribuit) sed numerosa ambiunt foliola, oblonga, angusta, lino similia, dura & mucronata, atro virore nitentia, & amaro sapore: extrema virga in multos tenues ramulos desinunt, quibus insidet singularia foliosa capitula, florem luteum, ex multis flosculis quinq; radiolis decussatis stiloq; in medio prominente constantibus compactum, amplectentia: deinceps semen nigricans, oblongiusculum, quale fere in

Hiera-



*Hieraciorū generibus, supernè villosū & papposū, quodq̃, leuissimo vento excutitur, cuiq̃, arbitrio fertur: radix dura est, lignosa, nigra, fibrisq̃, aliquot donata, singulis annis germinans, nouasq̃, virgas proferens.*

*Exit non procul à Phasianorum horto, editiore quodam & sicciore prato cum Lini siluestris generibus, & Cytiso primo, sed humilior: secundum uero sepes & frutices, altior & uberior. Inueni & multis Pannonia locis, atque etiam supra Dranum flumen. Floret Augusto: semen maturum est Septembri.*

*VIENNENSES Osyridem appellant. Sed an cum Dioscoridis Osyride conueniat, aliis diiudicandum relinquo. Tragus, apud quē in Latino exemplari perbellè depicta est, Linariā tertiā facit, atq̃. Linkraut à forma, & grosz siepnbium à floribus nūcupat, & ad Dioscoridis Heliochrysum refert. Nōnulli Chrysocomē Dioscoridis, & Chrysin Aristotelis esse arbitrantur.*

## DE ANONYMO LINIFOLIO.

### CAP. XXXIX.

*LINIFOLIORUM similitudo facit, ut hanc Lino siluestri congeneribusq̃, plantis coniungam: tametsi quo nomine appellare debeam planè incertus sim. Malui igitur ἀνώνυμον relinquere, quā eam nomine nō satis apto donare: illius tamen descriptionē negligere nolui, quandoquidem à nemine adhuc obseruatam videam.*

*PEDALES habet ramulos, duros, ex viridi pallentes, & in his multa folia temerè sparsa, & nullo ordine disposita, dura, angusta, oblongiuscula, lino similia, gustu primum nonnihil acido, deinde amaricante, colore respondentia illi qui in ipsius cauliculis, aut in ruta montana elucet: in extremis cauliculis multi ramuli, siue pedicelli, qui flosculos sustinent albicantes, quinque*

Linariatertia  
Tragi.

Anonymi li-  
nifolij histo-  
ria.





quinque foliolis stellatim decussatis constantes cum aliquot interioribus staminulis, qui tandem in singularia semina efformantur pentagona, duro putamine, medulla intus alba: radix candidans, multifida, perennis & vivax, annuatim novos ramulos seu virgulas producens: nonnunquam etiam serpens quarundam Linariarum more.

Copiose nascitur editioribus herbosisque locis agri Viennensis: tum etiam herbosis collibus Posonio vicinis, in declivi Hamburgensis motis qua Altenburg spectat, aliisque praterea plurimis cum Austria tum Pannonia montibus, tum etiam ultra Drauum in Pannonia interamni. Floret Maio. Memini & Madritiana silva, secundo ab urbe Lutetia miliari, cum Lino silvestri Hyacinthoque autumnali minore colligere: sed multo exiliorem.

## DE POLYGALA VULGARI.

### CAP. XL.

Polygala recentiorum.

Amarella  
Gesneri.

Πολύγαλον  
Diosc.

POLYGALÆ nomen apud plerosque Recentiorum obtinuit plantula quaedam ubiq. fere in siccioribus pratis obvia, foliis lini aut hyssopi vulgaris: quæ nunc caruleo flore conspicitur, nunc purpureo dilutiore, sine rubro, interdum etiam albo. Gesnerus in epistolis Amarellam ab amaritudine nuncupavit. Tragus Dioscoridis πολύγαλον et γλαυκὰ esse existimat. De ea cum à Recentioribus, præsertim à Trago descripta sit, vulgòq. satis nota, nihil hic agemus: sed de alio eius genere elegantissimo & maiore, quod in Austria & superiore Pannonia observavi: tametsi & vulgaris tribus florum coloribus discreta passim etiam in iisdem nascatur.

Polygala hifloria.

DURIVSCVLIS est virgulis quinque aut sex interdum ex eadem radice prodeuntibus, pedalis, gracilibus



cilibus, lentis, & obsequiosis, folia nullo ordine disposita, angusta, floris Tinctorij, aut vulgaris Hyssopi angustifolij & minoris quod ab Hispanis ylopillo vocatur, foliorum amula: flores conferti & spicatim nascentes summas virgulas occupant, sumiterra floribus haud multum ab-similes, longiores tamen, dilutioris purpurei coloris elegantissimi, siue dilutiore rubore pulcherrimo nitentes: his succedunt pendula siliquula plana, Bursa pastoris valgulis fere similes, quas membranea quadam veluti ala integunt, semina continentes plerumque bina, nigricantia, hirsuta, oblongaque, qua, aperiens se ad latera per maturitatem bursulis, decidunt: radix crassiuscula, brevis, dura, lignosa, vinax, aliquot fibris donata est: & tota planta amaricat.

Frequens est admodum in Leytenberg supra Manderstorf, circa Medeling, totaque illa montium serie, qua à Calemberg Danubia supra Viennam imminenti, ad Austriacas usque alpes excurrit. Nusquam etiam non occurrit per Pannoniam; sed etiam in Interamni ultra Drauum crescit.

Floret Maio & Junio. Aliquoties eam ob florum elegantiam & amoenitatem in hortos transtulimus, & cicurare volumus: sed operam haecenus lusimus.

2. Variat etiam quibusdam umbrosis & humidioribus locis, flore cum albo, tum caruleo, uti in minore vulgari: sed perinde assurgit atque modo descripta.

## DE CARYOPHYLLEIS,

### CAP. XLI.

NON carent altissimi montes praeruptique scopuli suis etiam deliciis: sed diuersi generis flosculis elegantissimis odoratissimisque saepissime exornantur. Porro Caryophyllei vulgo Herbariorum vocati, ob miram colorum va-

rum varietatem subeuntium ea inga oculos maxime recreant. Eorum verò præter vulgo cognita, istic multa genera observantur.

PRIORI dodrantes sunt cauliculi, teretes, geniculati: folia in singulis geniculis bina inter se opposita, oblonga, angusta, dura, colore quasi casto, mucronata: flos è calyculo rubente plerumque in singulis cauliculis unicus (interdum bini) quinque foliis constans lente simbratis, colore in diluta purpura rubente, circa umbilicum hirsutus, & saturatiore purpura nitens, & odor: ex medio umbilico duo brevia staminula prominent: semen in calyculis paleaceum, fuscum: radix oblonga tenues fibras spargens, è cuius capite plures cauliculi latè in circuitu, & confertim sese diffundunt, & subinde fibras agunt.

Caryophyl-  
leus fil. 1. flo.  
rubro.

Invenitur in Hamburgensi monte duobus supra Posonium miliaribus, & infra Viennam octo.

Floret istic Maio: in hortos verò translatus, etiam Aprili.

ALTERIVS breves etiam sunt cauliculi, tres un-  
cias rarò excedentes, geniculati: folia in singulis similiter geniculis bina, superioribus breviora, molliora, viridia, deorsum reflexa, splendentiæque, qua in novellis germi-  
nibus satis copiose ex eadem radice nascentibus mascula latioræque sunt: flos è calyculo crassiore & nigricante emicans, summis cauliculis insidet, unicus, superioribus maior, quinque etiam foliis constans paulo saturatior priore, circa umbilicum longioribus villis hirsutus, & eleganti ex saturo purpura & albo varietate gratus, inodorus tamen: semen in longis vasculis quamaturitate dehiscunt, paleaceum, fuscum, aliorum Caryophylleorum modo: radix superiori similis.

II.  
Caryophyl-  
leus fil. 1. flo. ru-  
bro.

Frequentissimè nascitur in Sneberg, monte ob perpe-



in insidentes illi nives sic appellato, & alijs Austriacarum Styriacarumq; alp:um iugis. Floret autem sub Iunij finem, & Iulio: sed in mitiora loca delatus, cum superiore floret, & semen profert Junio.

filii per omnia fere similis inuenitur in altissimo ingo 2.  
Etscher vocato, nisi paulo longioribus esset foliis & cauliculis: flos etiam plerumque maior est, & non unicus, verum in singulis cauliculis geminus, aut triplex: praeterea sub villis qui umbilicum ambiunt inaequalē quandam & in frequentes meandros excurrentem lineā impressam habet, humani cranij suturam referentem, colore rubro saturatiore praeitam quemadmodum & prioris.

In eodem ingo, anno Domini 1578. & in Sneberg 3.  
biennio antè, paucas quasdā huius generis, prioris praefertim speciei, plantas inueni, quae ab illa duntaxat flore differrent, qui licet alteri forma non dispar sit, colorem tamen album habet, circa umbilicum purpurascens villis hirsutum.

Florent istic primū Augusto, & maturum semen interdum praebent: sed in hortos translata, cum superioribus flores suos producant.

TERTIO cauliculi paulo maiores crassioresq; sunt, pedali plerūq. altitudine, geniculati, singula genicula amplectētibus binis similiter foliis primo genere longioribus & latioribus, coloreq; quasi arugineo: ex summis alis prodeunt bini aut terni singulatim tamen nascentes flores, priori non multū ab similes, quinque foliis per oras laciniatis, atque circa umbilicum carnea lanugine pubescentibus constantes, colore rubro, sine corniculis, odorati, qui cum primū ē calyculis emergunt, candidi futuri videntur: floribus succedunt cornicula satis crassa, semen nigrum, planum uti reliqui Caryophyllei conti-

III.

Caryophyll.  
fil. 3. no. rub.

nencia



mentia: radix oblonga, fibrosa, & à capite plures surculos in orbem diffundens, qui plerumque fibras agunt, & adeò sese propagant, ut breui totas areas occupent.

Colitur in hortis, & Maio mense cū reliquis floret.

QVARTVS radicem habet crassiusculam, nigro cortice tectam satis fibrosam, supernè in aliquot ramos diuisam, qui summa tellure multa capita gignunt è tenuibus gramineisq; & virentibus foliis constantia: inter quæ prosiliunt cauliculi aliquot tenues, geniculati, palmares, & ad singulos nodos bina exigua foliola: calyculi in singulis cauliculis singulares, masculi, è quibus flos ruber dilutior, quinque foliis nonnihil per ambitum crenatis constans, è cuius umbilico duo interdum albescencia cornicula (interdum nulla) cum aliquot staminulis prodeunt: semen, ut in reliquis, nigrū, pascaccum.

Crescit in Tauro Carinthia monte. Floret Iulio; semen Augusto maturitatem consequitur.

QVINTO crassa & nigra radix est, durag; & lignosa, multos ramulos humis parvos fundens, nigros item illos lentosq; & subinde fibras agentes: ex iis cauliculi exeunt dodrantates, geniculati, infima parte gramineis quibusdam breuibus, angustis, colore cæsis sive cinereis foliis, binis semper ex aduerso inter se oppositis, deinde secundum genicula aliis rarioribus onustis: extremis cauliculis insidēt oblongi calyces, uti in aliis Caryophylleis floribus silvestribus, florē continentés album, odoratum, quinque foliis admodum lacinjatis constantem, è quorum umbilico duo staminula emergunt corniculorum papilionis modo inflexa: semen deinde in oblongioribus capitulis planum, quale reliquorum Caryophylteorum est.

Proximitate sponte in Hamburgensi mōte inter saxa, quæ Austrum & Septentrionem spectat. Floret Maio.

IIII.

Caryophyll.  
fil. Tauricus.

V.

Caryophyl.  
fil. i. a. b. flo.  
re & lacinia-  
to.



2. Istius etiam genus inuenitur ibidē longioribus cauliculis, & plures flores proferens superiori quidem forma & candore similes, sed qui cornicula inflexa non habeant, verū eorum loco decem staminula ipsum florem paululum exuperantia: capitula etiam in quibus semen continetur, oblongiora.

Est & in hoc genere quod flores circa umbilicū purpurascente lanugine hirsutos proferat.

3. Alium tertium paulo maiorem inuenimus ad radices montis oppido Medeling imminentis, tertio fere à Vienna miliari: firmioribus tamen & longioribus cauliculis est: flore etiam maiore, tametsi similiter per oras profundē laciniato & odorato, colore nunc omnino albo, nunc dilutius quodammodo rubente, & ut vocant, incarnato, villis breuibus purpureis umbilici circumferentiam in utroque genere occupantibus, nullis similiter corniculis, sed decem staminibus ut in superiore prominentibus: alioqui & foliis, & radice, & flore diuturno conueniunt.

VI. SEXTVS plures ab una radice prodeuntes habet caules, cubitales, teretes, multis geniculis praeditos: & in his bina semper folia caulem amplectentia, graminea, mucronata, reliquis Caryophylleis fere similia, non tamen incana aut casia, sed virescientia: flores in summis caulibus copiosos, oblongioribus calyculis insidentes, quinque foliis praeditos, nunc candidos, nunc purpurascētes, atque in tenuissimas lacinias dissectos, odoris suauissimi, & è longinquo nares ferientis, umbilico virecente, & purpurascente lanugine hirsuto, è quo aliquot staminula prominent: in oblongis deinde corniculis semen feri paleaceum, planum, & nigrum, reliquorum Caryophylleorum more: radix uti reliquorum fibrosa. Habent autem nouelli surculi latiora paulo folia, Armerio-

Caryophyl.  
fil. 2. tenuissi-  
mè laciniato  
& albo flore.



rum foliis proxima: sed angustiora, nec adeo virentia.

Sponte nascitur in humidioribus Viennensis agri pratis, seriusq; reliquis floret, nempe Iulio, & toto interdum Augusto.

VII. SEPTIMI folium est minutissimū, gramineumq; & quasi pungens, atque viride: adeo autem se propagat, ut magnos interdum cespites tegat, non secus atque muscus quidā totos illos obsidens: flosculi in singulis propaginibus à medio foliorum conspiciuntur, quinq. foliis bifidis constantes, colore rubro diluto: ore siue carneo, qui tenuibus & vix digitum transversum altis pedunculis insident singuli, gratissimo spectaculo: semen in capitellis fuscis & splendentibus, renis forma (qua nota à reliquis Caryophylleis differt, & ad *Lychnidum* classē accedit) exiguum, subruffum: radix oblonga, nigricans, & multas propagines summa tellure faciens.

Summis Austriacarum & Styriacarum alpium iugis inuenitur nudo petrosq; solo. Floret Junio, semen Augusto plerumque maturitatem consequitur. At in hortos translatus hic Caryophylleus, etiam sub Aprilis finem floret: nonnunquam etiam secundo sub Septembris initium.

2. Colorē floris variat qui in Iudenberg celsissimo Styria monte interdum nascitur, qui totus niveus est: alioqui in reliquis per omnia similis.

VIII. OCTAVVS haud multum à septimo differt: folia tamen paulo sunt crassiora & succulentiora, illius plantae quae vulgo Gramen marinum vocatur (tamen si in montanis aliisque locis procul à mari diffitis etiam sponte nascens inueniatur) foliis fere similia, frequentissima & confertissima, amariuscule sapore: inter quae emicant pediculi verius quàm cauliculi, transversum digitum longi, geniculati, foliis binis inter se ad internodia oppo-

Caryophyl.  
pumilio alpi-  
nus.

Caryophyll.  
pumilio tau-  
ricus.

Caryophylleus VIII.



ad a oppositis: cauliculis insident praegrandes (pro stirpis proportionem) & laxi calyces, lanuginosi, ex viridi purpurascens, in quinque crenas diuisi, unde singulares emergunt flores, quinque foliis constantes, colore rubro dilutius, inodori: semen obseruare non potui: radix satis crassa, subsicca, aliquot fibris donata, verum circa caput sese summa tellure expandens, & in plures ramos diuidens, subinde nonas fibras agit.

Prouenit usdem quibus Quartum genus locis, solo tenui & arena splendens referto.

Floret sub finem Iulij & Augusto.

CARYOPHYLLEI nomen inuenit hac planta apud Herbariorum vulgus, quod eius flores plerumque aromatici caryophylli odorem amulentur. Sunt qui Vetonica appellare malint. Nec desunt qui ad Plinij Cantabricam referendam putent. Incola quinque priora genera Wild neglin/ Berg neglin & Z teinneglin indifferenter appellant, hoc est, siluestres, montanos & petraeos caryophylleos. Sextam genus peculiariter Zoder neglin/ id est, laciniatum sine dissectum caryophylleum Austriaca mulieres, quibus ob odoris fragrantiam in deliciis est, nuncupant. Anguillara libro Opinionum XI I. Theophrasti Diosanthos facere videtur. Gesnerius in epistolis septimum genus appellare videtur Muscum alpinum. Gallis omnia ista genera Oeillet & Gyroflées lauages dici poterunt. Caryophylleus vero flos in genere Vngaris vulgo Zék huius dicitur.

Passim in pratis, siluis, agrorum marginibus, aliisque herbosis locis hic sponte nascuntur & aliquot Caryophyllei siluestres sine Armerij floris genera. Sed quoniam ea, per reliquas Germania, Gallia, Hispania, atque etiam, ut arbitror, Italia provincias, obuia sunt: peculiarē illorum descriptionem dare hoc loco operae premium non videtur.

ARME-

Cantabrica  
Plini.  
Vetonica.

Diosanthos  
Theophr.

ARMERIVS porro ille multiplici florum rubrorum Armerius  
pleno flore.  
glomere constans, & Belgis kephens vernacula lingua  
appellatus abunde in quibusdam pratis Nemethwywar  
Ill. D. de Batthyan vicinis qua occidentem spectat, spon-  
te nascitur, atque ab Ungaris Isten nyla, id est, Dei  
sagitta nuncupatur.

HVC proculdubio referenda sunt duæ illæ plantæ Gramen ma-  
rinum.  
quæ à rei herbaria studiosis Belgis Graminis marini  
maioris & minoris nomine appellantur: tamen si pleris-  
que aliis locis procul à mari dissitis etiam sponte proue- malus.  
munt. Nam quod maius vocant, in summarum istarum  
Alpium herbosis iugis frequenter inueni: memini etiam vi-  
dere in viuario illo regio Madritiana silua vulgo nun-  
cupato, secundo ab urbe Lutetia miliari, unde copiosum  
erui, & amicis in Belgicam misi. Nusquam verò, quod  
sciam, maritimis locis mihi conspectum est. Quod au-  
tem minus vocant, non modò in maritimis Angliæ & minus.  
Belgiæ provenit: sed in Moravia collibus copiose nasci-  
tur, atque non procul Praga itinere Viennensi: Saxonie  
etiam quibusdam herbidis locis, præsertim agro Wite-  
bergenfi videre, & colligere memini ante multos annos.

Neutrius descriptio hic à me expectanda est, cum à  
Clariss. Viris Dodonæo & Lobelio cum suis iconibus  
edita sit: à Dod. quidem minor Graminis marini nomi-  
ne: utraq. verò à Lobelio Caryophylli marini & mon-  
tani appellatione. Ab illis ergo requirere poterunt rei  
herbarie studiosi.

CETERVM Caryophylleorum facultates (qui-  
bus hand dubiè præditi sunt nonnulli ex iis quorum hi-  
storiam hoc capite descripsi) diligentissimè persequutus  
est celeberrimus Matthiolus amplissimis suis in Dios-  
coridem Commentarius.

## DE LYCHNIDE SILVESTRI.

## CAP. XLII.

LYCHNIDIS silvestris magna est etiam varietas. Nam licet multa genera præter vulgaria, in Hispanica mea peregrinatione observata descripserim: aliquot adhuc alia in his provinciis sese mihi obtulerunt, quæ minimè silentio premenda videntur.

Lychnis St.  
fl. rubro.

- I. Cui, ob florū elegantiam, primum locū damus, unicus initio pedalis est caulis, geniculatus, mucagine glutinosa, præsertim in summo, aspersus, bina ex singulis geniculis sibi inuicē opposita proferens folia, oblonga, Armerio quarto Dodonæi fere similia, sed firmiora, crassiora, & viridiora: à medio fere ad summum multis floribus ex alarum sinu in oblongis pediculis prodeuntibus onustus est, qui quinis extremo diuisis sed in rotundum bifidis foliis constant, & elegantissimo colore rubro ad purpuram tendente rutilant, coronula elatiore medium umbilicum occupante, nullo tamen odore præditis: his succedunt membranæ, attamen duriuscula capitula, circa pediculum angustiora, & crassiore mucrone, quæ per maturitatem dehiscunt & semen ostendunt inclusum, minutum admodum, ex ruffo nigricans: radix crassiuscula, nigra, multas fibras spargit, & singulis annis novos, eosque numerosiores caules profert.

In omnibus fere Pannonia & Austria inferioris montanis silvis, editi: q<sub>3</sub> & herbidis locis inuenitur.

Floret Maio, semen Junio maturescit.

Lychnis sil.  
albo fl. s.

- II. MULTA secundum radicem habet Altera folia digitalis longitudinis, sensim in latitudinem sese explicantia, sub extremum mucronata, viridia, nonnihil hirsuta, ad Lychnidis silvestris flore albo, quæ in omnibus provinciis vulgaris est, folia quodammodo accedentia, longè ta-





longè tamen angustiora, sapore acidiusculo: caules deinde pedales, interdum cubitales, nodosos & geniculatos, qui summa parte cum suis ramulis lentò & viscido humore obfusi sunt, uti in priore: singula genicula latiore pediculo amplectuntur bina folia ex aduerso sita, superioribus breuiora, circa summum autem caulem adhuc minora & mucronata: summis alis innati oblongi ramuli, ternos plerumque vel etiam plures sustinēt flores, quinque bifidis & vsque ad umbilicum diuisis, binasq; appendiculas mucronatas circa eūdem umbilicum habentibus foliis constantes, candido colore, quinque staminulis oblongis medium umbilicum occupantibus: floribus qui iam marcescentes contrahuntur, & interiore parte conuoluuntur veluti in alba Hispanica lychnide, succedunt crassiuscula & mucronata capitula, semine exiguo, rotundo, cinereo plena: radix fibrosa et perennis, singulis annis nouos ex radice numerosioresq; caules proferens, qui secundum radicem fibras agentes facile pangi possunt.

Nascitur per uniuersam Pannoniam, Austriamq; infra Anisum, Morauiam, Bohemiam, ultraque Muram & Drauum, non modò in caduis siluis, sed etiam ad margines agrorum restibulum. Memini & in Belgica videre Lutzelburgensi ducatu. Floret Maio.

111.

Lychnis fil.  
albo flore 2.

TERTIÆ noui singulis annis ex eadem radice prodeunt cauliculi, per terram sparsi, & subinde circa internodia radices agentes, deinde sursum denuo sese erigentes palmari altitudine, graciles, geniculati, bina folia in singulis geniculis ex aduerso opposita ferētes, longiuscula, angusta, obtuso mucrone, viridia, prominente dorso, amaro sapore: flores in summis cauliculis & ramulis lateralibus (qui glutine quodam illiti videntur) elegantes, candidi, quinque laciniatis foliulis constantes, inodori,



cilibus, lentis, & obsequiosis, folia nullo ordine disposita, angusta, floris Tinctorij, aut vulgaris Hyssopi angustifolij & minoris quod ab Hispanis ylopillo vocatur, foliorum amula: flores conferti & spicatim nascētes summas virgulas occupant, sumiterra floribus haud multum ab-similes, longiores tamen, dilutioris purpurei coloris elegantissimi, siue dilutiore rubore pulcherrimo nitentes: his succedunt pendula siliquula plana, Bursa pastoris valgulis fere similes, quas membranacea quadam veluti ala integunt, semina continentes plerumque bina, nigricantia, hirsuta, oblongaque, qua, aperientibus sese ad latera per maturitatem bursum, decidunt: radix crassiuscula, brevis, dura, lignosa, vinax, aliquot fibris donata est: & tota planta amaricat.

Frequens est admodum in Leytenberg supra Manderstorf, circa Medeling, totaque illa montium serie, qua à Calemberg Danubio supra Viennam imminenti, ad Austriacas usque alpes excurrit. Nusquam etiam non occurrit per Pannoniam; sed etiam in Interamni ultra Drauum crescit.

Floret Maio & Junio. Aliquoties eam ob florum elegantiam & amœnitatem in hortos transtulimus, & cicurare voluimus: sed operam hactenus lusimus.

2. Variat etiam quibusdam umbrosis & humidioribus locis, flore cum albo, tum caeruleo, uti in minore vulgari: sed perinde assurgit atque modo descripta.

## DE CARYOPHYLLEIS,

### CAP. XII.

Non carent altissimi montes præruptique scopuli suis etiam deliciis: sed diuersi generis flosculis elegantissimis odoratissimisque sapissimè exarnantur. Porro Caryophyllei vulgo Herbariorum vocati, ob miram colorum va-

rum varietatem subeuntium ea iuga oculos maximè recreant. Eorum verò præter vulgo cognita, istic multa genera observavi.

**PRIORI** dodrantales sunt cauliculi, teretes, geniculati: folia in singulis geniculis bina inter se opposita, oblonga, angusta, dura, colore quasi casto, mucronata: flos è calyculo rubente plerumque in singulis cauliculis unicus (interdum bini) quinque foliis constans lente fimbriatis, colore in diluta purpura rubente, circa umbilicum hirsutus, & saturatiore purpura nitens, & odor: ex medio umbilico duo brevia staminula prominent: semen in calyculis paleaceum, fuscum: radix oblonga tenues fibras spargens, è cuius capite plures cauliculi latè in circuitu, & confertim sese diffundunt, & subinde fibras agunt.

Invenitur in Hamburgensi monte duobus supra Posonium miliaribus, & infra Viennam octo.

Floret istic Maio: in hortos verò translatum, etiam Aprili.

**ALTERIVS** breves etiam sunt cauliculi, tres uncias raro excedentes, geniculati; folia in singulis similiter geniculis bina, superioribus breviora, molliora, viridia, deorsum reflexa, splendentiaque, qua in novellis germinibus satis copiose ex eadem radice nascentibus masculula latioraque sunt: flos è calyculo crassiore & nigricante emicans, summis cauliculis insidet, unicus, superioribus maior, quinque etiam foliis constans paulo saturatior priore, circa umbilicum longioribus villis hirsutus, & eleganti ex satura purpura & albo varietate gratus, inodorus tamen: semen in longis vasculis quamaturitate dehiscunt, paleaceum, fuscum, aliorum Caryophylleorum modo: radix superiori similis.

Frequentissimè nascitur in Sneberg, monte ob perpe-

Caryophyl-  
leus fil. 1. flo.  
rubro.

II.  
Caryophyl.  
fil. 2. flo. ru-  
bro.



inò insidentes illi nives sic appellato, & alijs Austriacarum Styriacarumq<sup>3</sup> alpium iugis. Floret autem sub Iunij finem, & Iulio: sed in mitiora loca delatus, cum superiore floret, & semen profert Junio.

filii per omnia fere similis inuenitur in altissimo iugo 2.  
 Et scher vocato, nisi paulo longioribus esset foliis & cauliculis: flos etiam plerumque maior est, & non unicus, verum in singulis cauliculis geminus, aut triplex: praeterea sub villis qui umbilicum ambiunt inaequalē quandam & in frequentes meandros excurrentem lineā impressam habet, humani cranij suturam referentem, colore rubro saturatiore praeitam quemadmodum & prioris.

In eodem iugo, anno Domini 1578. & in Sneberg 3.  
 biennio antè, paucas quasdā huius generis, prioris praesertim speciei, plantas inueni, quae ab illa duntaxat flore differrent, qui licet alteri forma non dispar sit, colorem tamen album habet, circa umbilicum purpurascens villis hirsutum.

Florent istic primum Augusto, & maturum semen interdum praebent: sed in hortos translata, cum superioribus flores suos producant.

TERTIO cauliculi paulo maiores crassioresq<sup>3</sup> sunt, pedali plerūq. altitudine, geniculati, singula genicula amplectētibus binis similiter foliis primo genere longioribus & latioribus, coloreq<sup>3</sup> quasi arugineo: ex summis alis prodeunt bini aut terni singulatim tamen nascentes flores, priori non multū absimiles, quinque foliis per oras laciniatis, atque circa umbilicum carnea lanugine pubescentibus constantes, colore rubro, sine corniculis, odorati, qui cum primum è calyculis emergunt, candidi futuri videntur: floribus succedunt cornicula satis crassa, semen nigrum, planum uti reliqui Caryophyllei continensia

III.

Caryophyll.  
fil. 3. No. rub.

nensia



mentia: radix oblonga, fibrosa, & à capite plures surculos in orbem diffundens, qui plerumque fibras agunt, & adeò sese propagant, ut breui totas areas occupent.

Colitur in hortis, & Maio mense cū reliquis floret.

QVARTVS radicem habet crassiusculam, nigro cortice tectam satis fibrosam, superne in aliquot ramos diuisam, qui summa tellure multa capita gignunt è tenuibus gramineisq; & virentibus foliis constantia: inter que profiliunt cauliculi aliquot tennes, geniculati, palmares, & ad singulos nodos bina exigua foliola: calyculi in singulis cauliculis singulares, masculi, & quibus flos ruber dilutior, quinque foliis nonnihil per ambitum crenatis constans, è cuius umbilico duo interdum albescencia cornicula (interdum nulla) cum aliquot staminulis prodeunt: semen, ut in reliquis, nigrū, pascaceum.

Crescit in Tauro Carinthia monte. Floret Iulio, semen Augusto maturitatem consequitur.

QVINTO crassa & nigra radix est, duraq; & lignosa, multos ramulos humis paruos fundens, nigros item illos lentosq; & subinde fibras agentes: ex iis cauliculi exeunt dodrantates, geniculati, infima parte gramineis quibusdam breuib; angustis, colore caesis sine cinereis foliis, binis semper ex aduerso inter se oppositis, deinde secundum genicula aliis rarioribus onustis: extremis cauliculis insidēt oblongi calyces, uti in aliis Caryophylleis floribus siluestribus, florē continentes album, odoratum, quinque foliis admodum lacinatis constantem, è quorum umbilico duo staminula emergunt corniculorum papilionis modo inflexa: semen deinde in oblongioribus capitulis planum, quale reliquorum Caryophylleorum est.

Provenit sponte in Hamburgensi mote inter saxa, quæ Austrum & Septentrionem spectat. Floret Maio.

IIII.

Caryophyll.  
fil. Tauricus.

V.

Caryophyll.  
fil. s. a. b. Bo.  
re & lacinia-  
to.



2. Istius etiam genus inuenitur ibidē longioribus cauliculis, & plures flores proferens superiori quidem forma & candore similes, sed qui cornicula inflexa non habeant, verū eorum loco decem staminula ipsum florem paululum exuperantia: capitula etiam in quibus semen continetur, oblongiora.

Est & in hoc genere quod flores circa umbilicū purpurascente lanugine hirsutos proferat.

3. Alium tertium paulo maiorem inuenimus ad radices montis oppido Medeling imminentis, tertio fere à Vienna miliari: firmioribus tamen & longioribus cauliculis est: flore etiam maiore, tamen si similiter per oras profundè laciniato & odorato, colore nunc omnino albo, nunc dilutius quodammodo rubente, & ut vocant, incarnato, villis breuibus purpureis umbilici circumferentiam in utroque genere occupantibus, nullis similiter corniculis, sed decem staminibus ut in superiore prominentibus: alioqui & foliis, & radice, & floreandi tempore conueniunt.

VI. SEXTVS plures ab una radice prodeuntes habet caules, cubitales, teretes, multis geniculis praditos: & in his bina semper folia caulem amplectentia, graminea, mucronata, reliquis Caryophylleis fere similia, non tamen incana aut caesia, sed virescientia: flores in summis caulibus copiosos, oblongioribus calyculis insidentes, quinque foliis praditos, nunc candidos, nunc purpurascentes, atque in tenuissimas lacinias dissectos, odoris suauissimi, & è longinquo nares ferientis, umbilico virecente, & purpurascente lanugine hirsuto, è quo aliquot staminula prominent: in oblongis deinde corniculis semen fert paleaceum, planum, & nigrum, reliquorum Caryophylleorum more: radice vti reliquorum fibrosa. Habent autem nouelli surculi latiora paulo folia, Armerio-

Caryophyl.  
fil. 2. tenuissi-  
mè laciniato  
& albo flore.



rum foliis proxima: sed angustiora, nec adeo virentia.

Sponte nascitur in humidioribus Viennensis agri pratis, seriusq; reliquis floret, nempe Iulio, & toto interdum Augusto.

VII. SEPTIMI folium est minutissimū, gramineumq;

Caryophyll.  
pumilio alpi-  
nus.

& quasi pungens, atque viride: adeo autem se propagat, ut magnos interdum cespites tegat, non secus atque muscus quidā totos illos obsidens: flosculi in singulis propaginibus è medio foliorum conspiciuntur, quinq. foliis bifidis constantes, colore rubro diluto: ore siue carneo, qui tenuibus & vix digitum transversum altis pedunculis insident singuli, gratissimo spectaculo: semen in capitellis fuscis & splendentibus, renis forma (qua nota à reliquis Caryophylleis differt, & ad *Lychnidum* classē accedit) exiguum, subruffum: radix oblonga, nigricans, & multas propagines summa tellure faciens.

Summis *Austriacarum* & *Styriacarum* alpium iugis inuenitur nudo petrosq; solo. Floret Junio, semen Augusto plerumque maturitatem consequitur. At in hortos translatus hic Caryophylleus, etiam sub Aprilis finem floret: nōnunquam etiam secundo sub Septembris initium.

2. Colore floris variat qui in *Indenberg* celsissimo *Styria* monte interdum nascitur, qui totus niveus est: alioqui in reliquis per omnia similis.

VIII. OCTAVVS hand multum à septimo differt: folia

Caryophyll.  
pumilio tau-  
sicus.

tamen paulo sunt crassiora & succulentiora, illius plantae quae vulgo *Gramen marinum* vocatur (tamen si in montanis atisque locis procul à mari diffitis etiam sponte nascens inueniatur) foliis fere similia, frequentissima & confertissima, amariuscule sapore: inter quae emicant pediculi verius quàm cauliculi, transversum digitum longi, geniculati, foliis binis inter se ad internodia oppo-

## Caryophyllus VIII.



dia oppositis: cauliculis insident prægrandes (pro stirpis proportionem) & laxi calyces, lanuginosi, ex viridi purpurascens, in quinque crenas diuisi, unde singulares emergunt flores, quinque foliis constantes, colore rubro dilutiore, inodori: semen obseruare non potui: radix satis crassa, subsusca, aliquot fibris donata, verum circa caput sese summa tellure expandens, & in plures ramos diuidens, subinde nouas fibras agit.

Prouenit usdem quibus *Quartum* genus locis, solo tenui & arena splendente referto.

Floret sub finem Iulij & Augusto.

*CARYOPHYLLEI* nomen inuenit hac planta apud Herbariorum vulgus, quod eius flores plerumque aromatici caryophylli odorem amulentur. Sunt qui *Vetonica* appellare malint. Nec desunt qui ad Plinij *Cantabricam* referendam putent. Incole quinque priora genera *Wild neglin*, *Berg neglin* & *Zeinneglin* indifferenter appellant, hoc est, siluestres, montanos & petraeos caryophylleos. Sextum genus peculiariter *Zoddet neglin*, id est, laciniatum sine dissectum caryophylleum *Austriaca* mulieres, quibus ob odoris fragrantiam in deliciis est, nuncupant. *Anguillara* libro *Opinionum* xii. *Theophrasti* *Diosanthos* facere videtur. *Gesnerus* in epistolis septimum genus appellare videtur *Muscum alpinum*. Gallis omnia ista genera *Ocillets* & *Gyroflees* lauages dici poterunt. *Caryophylleus* vero flos in genere *Vngaris* vulgo *Zék* flos dicitur.

Passim in pratis, siluis, agrorum marginibus, aliisque herbosis locis hic sponte nascuntur & aliquot *Caryophyllei* siluestris siue *Armerij* floris genera. Sed quoniam ea, per reliquas Germaniam, Galliam, Hispaniam, atque etiam, ut arbitror, Italiae provincias, obuia sunt: peculiarẽ illorũ descriptionem dare hoc loco operæ precium non videtur.

ARME-

Cantabrica  
Plini.

Vetonica.

Diosanthos  
Theophr.

ARMERIVS porro ille multiplici florum rubrorum glomere constans, & Belgis hephkens vernacula lingua appellatus abunde in quibusdam pratis Nemerhwywar Ill. D. de Batthyán vicinis qua occidentem spectat, sponte nascitur, atque ab Ungaris Istén nyla, id est, Dei sagitta nuncupatur.

Armerius  
pleno flore.

HVC proculdubio referenda sunt due illa planta quæ à rei herbariæ studiosis Belgis Graminis marini maioris & minoris nomine appellantur: tametsi plerisque aliis locis procul à mari dissitis etiam sponte proueniunt. Nam quod maius vocant, in summam istarum Alpium herbosissimis iugis frequenter inueni: memini etiam videre in viuario illo regio Madritiana silua vulgo nuncupato, secundo ab urbe Lutetia miliari, unde copiosum erui, & amicis in Belgicam misi. Nusquam verò, quod sciam, maritimis locis mihi conspectum est. Quod autem minus vocant, non modò in maritimis Angliæ & Belgicæ prouenit: sed in Moravia collibus copiose nascitur, atque non procul Praga itinere Viennensi: Saxoniæ etiam quibusdam herbidis locis, præsertim agro Witebergeni videre, & colligere memini ante multos annos.

Gramen ma-  
rinum.

maius.

minus.

Neutrius descriptio hic à me expectanda est, cum à Clariss. Viris Dodoneo & Lobelio cum suis iconibus edita sit: à Dod. quidem minor Graminis marini nomine: utraq. verò à Lobelio Caryophylli marini & montani appellatione. Ab illis ergo requirere poterunt rei herbariæ studiosi.

CETERVM Caryophylledrum facultates (quibus haud dubiè præditi sunt nonnulli ex iis quorum historiam hoc capite descripsi) diligentissimè persequutus est celeberrimus Matthiæus amplissimis suis in Dioscoridem Commentarius.

## DE LYCHNIDE SILVESTRI.

## CAP. XII.

LYCHNIDIS silvestris magna est etiam varietas. Nam licet multa genera præter vulgaria, in Hispanica mea peregrinatione observata descripserim: aliquot adhuc alia in his provinciis sese mihi obtulerunt, quæ minimè silentio premenda videntur.

Lychnis fil.  
Rose rubro.

- I. CVI, ob florū elegantiam, primum locū damus, unicus initio pedalis est caulis, geniculatus, mucagine glutinosa, præsertim in summo, aspersus, bina ex singulis geniculis sibi inuicē opposita proferens folia, oblonga, Armerio quarto Dodonæi fere similia, sed firmiora, crassiora, & viridiora: à medio fere ad summum multis floribus ex alarum sinu in oblongis pediculis prodeuntibus onustus est, qui quinis extremo diuisis sed in rotundum bifidis foliis constant, & elegantissimo colore rubro ad purpuram tendente rutilant, coronula elatiore medium umbilicum occupante, nullo tamen odore præditi: his succedunt membranæ, attamen duriuscula capitula, circa pediculum angustiora, & crassiore mucrone, quæ per maturitatem dehiscunt & semen ostendunt inclusum, minutum admodum, ex ruffo nigricans: radix crassiuscula, nigra, multas fibras spargit, & singulis annis novos, eosque numerosiores caules profert.

In omnibus fere Pannonia & Austria inferioris montanis siluis, editioribus, & herbidis locis inuenitur.

Floret Maio, semen Junio maturescit.

Lychnis fil.  
albo Rose. s.

- II. MVLTÀ secundum radicem habet Altera folia digitalis longitudinis, sensim in latitudinem sese explicantia, sub extremum mucronata, viridia, nonnihil hirsuta, ad Lychnidis silvestris flore albo, quæ in omnibus provinciis vulgaris est, folia quodammodo accedentia,  
longè ta-





longè tamen angustiora, sapore acidiusculo: caules deinde pedales, interdum cubitales, nodosos & geniculatos, qui summa parte cum suis ramulis lento & viscido humore oberti sunt, uti in priore: singula genicula latiore pediculo amplectuntur bina folia ex aduerso sita, superioribus breuiora, circa summum autem caulem adhuc minora & mucronata: summis alis innati oblongi ramuli, ternos plerumque vel etiam plures sustinent flores, quinque bifidis & usque ad umbilicum diuisis, binasq; appendiculas mucronatas circa eundem umbilicum habentibus foliis constantes, candido colore, quinque staminibus oblongis medium umbilicum occupantibus: floribus qui iam marcescentes contrahuntur, & interiore parte conuoluuntur veluti in alba Hispanica lychnide, succedunt crassiuscula & mucronata capitula, semine exiguo, rotundo, cinereo plena: radix fibrosa et perennis, singulis annis nouos ex radice numerosioresq; caules proferens, qui secundum radicem fibras agentes facile pangi possunt.

Nascitur per uniuersam Pannoniam, Austriamq; infra Ansum, Morauiam, Bohemiam, ultraque Muram & Drauum, non modò in caduis siluis, sed etiam ad margines agrorum restibulum. Memini & in Belgica videre Lutzelburgensi ducatu. Floret Maio.

## III.

Lychnis fil.  
albo flore 2.

TERTIA non singulis annis ex eadem radice prodeunt cauliculi, per terram sparsi, & subinde circa internodia radices agentes, deinde sursum denuo sese erigentes palmari altitudine, graciles, geniculati, bina folia in singulis geniculis ex aduerso opposita ferètes, longiuscula, angusta, obtuso mucrone, viridia, prominente dorso, amaro sapore: flores in summis cauliculis & ramulis lateralibus (qui glutine quodam illiti videntur) elegantes, candidi, quinque laciniatis folioliis constantes, inodori,





tuò insidentes illi nives sic appellato, & alijs Austriacarum Styriacarumq; alp:um iugis. Floret autem sub Iunij finem, & Iulio: sed in mitiora loca delatus, cum superiore floret, & semen profert Junio.

filii per omnia fere similis inuenitur in altissimo ingo 2.  
 Et scher vocato, nisi paulo longioribus esset foliis & cauliculis: flos etiam plerumque maior est, & non unicus, verum in singulis cauliculis geminus, aut triplex: praeterea sub villis qui umbilicum ambiunt inaequalē quandam & in frequentes meandros excurrentem lineā impressam habet, humani cranij suturam referentem, colore rubro saturatiore praeitam quemadmodum & prioris.

In eodem ingo, anno Domini 1578. & in Sneberg 3.  
 biennio antè, paucas quasdam huius generis, prioris praesertim speciei, plantas inueni, quae ab illa duntaxat flore differrent, qui licet alteri forma non dispar sit, colorem tamen album habet, circa umbilicum purpurascens villis hirsutum.

Florent istic primum Augusto, & maturum semen interdum praeant: sed in hortos translata, cum superioribus flores suos producant.

TERTIO cauliculi paulo maiores crassioresq; sunt, pedali plerumq. altitudine, geniculati, singula genicula amplectentibus binis similiter foliis primo genere longioribus & latioribus, coloreq; quasi arugineo: ex summis alis prodeunt bini aut terni singulatim tamen nascentes flores, priori non multum ab similes, quinque foliis per oras laciniatis, atque circa umbilicum carnea lanugine pubescentibus constantes, colore rubro, sine corniculis, odorati, qui cum primum è calyculis emergunt, candidi futuri videntur: floribus succedunt cornicula satis crassa, semen nigrum, planum uti reliqui Caryophyllei continensia

III.

Caryophyll.  
fil. 3. No. rub.



mentia: radix oblonga, fibrosa, & à capite plures surculos in orbem diffundens, qui plerumque fibras agunt, & adeo sese propagant, ut breui totas areas occupent.

Colitur in hortis, & Maio mense cū reliquis floret.

QVARTVS radicem habet crassiusculam, nigro cortice tectam satis fibrosam, superne in aliquot ramos diuisam, qui summa tellure multa capita gignunt è tenuibus gramineisq; & virentibus foliolis constantia: inter quæ profiliunt cauliculi aliquot tennes, geniculati, palmares, & ad singulos nodos bina exigua foliola: calyculi in singulis cauliculis singulares, maiusculi, è quibus flos ruber ditior, quinque foliis nonnihil per ambitum crenatus constans, è cuius umbilico duo interdum albescencia cornicula (interdum nulla) cum aliquot staminulis prodeunt: semen, ut in reliquis, nigrū, palcaceum.

Crescit in Tauro Carinthia monte. Floret Iulio, semen Augusto maturitatem consequitur.

QVINTO crassa & nigra radix est, duraq; & lignosa, multos ramulos humisparfos fundens, nigros item illos lentosq; & subinde fibras agentes: ex iis cauliculi exeunt dodrantates, geniculati, infima parte gramineis quibusdam breuibus, angustis, colore caesis siue cinereis foliis, binis semper ex aduerso inter se oppositis; deinde secundum genicula aliis rarioribus onusti: extremis cauliculis insidet oblongi calyces, uti in aliis Caryophylleis floribus siluestribus, flore continentes album, odoratum, quinque foliis admodum laciniatis constantem, è quorum umbilico duo staminula emergunt corniculorum papilionis modo inflexa: semen deinde in oblongioribus capitulis planum, quale reliquorum Caryophylleorum est.

Proximitate in Hamburgerensi monte inter saxa, quæ Austriam & Septentrionem spectat. Floret Maio.

IIII.

Caryophyll.  
fil. Faucius.

V.

Caryophyll.  
fil. i. a. b. s. s.  
re & laciniato.

2. Istius etiam genus inuenitur ibidē longioribus cauliculis, & plures flores proferens superiori quidem forma & candore similes, sed qui cornicula inflexa non habeant, verū eorum loco decem staminula ipsum florem paululum exuperantia: capitula etiam in quibus semen continetur, oblongiora.

Est & in hoc genere quod flores circa umbilicū purpurascente lanugine hirsutos proferat.

3. Alium tertium paulo maiorem inuenimus ad radices montis oppido Medeling imminentis, tertio fere à Vienna miliari: firmioribus tamen & longioribus cauliculis est: flore etiam maiore, tametsi similiter per oras profundè laciniato & odorato, colore nunc omnino albo, nunc dilutius quodammodo rubente, & ut vocant, incarnato, villis breuibus purpureis umbilici circumferentiam in utroque genere occupantibus, nullis similiter corniculis, sed decem staminibus ut in superiore prominentibus: alioqui & foliis, & radice, & floreandi tempore conueniunt.

VI. SEXTVS plures ab una radice prodeuntes habet caules, cubitales, teretes, multis geniculis praditos: & in his bina semper folia caulem amplectentia, graminea, mucronata, reliquis Caryophylleis fere similia, non tamen incana aut casta, sed virescientia: flores in summis caulibus copiosos, oblongioribus calyculis insidentes, quinque foliis praditos, nunc candidos, nunc purpurascentes, atque in tenuissimas lacinias dissectos, odoris suauissimi, & è longinquo nares ferientis, umbilico virecente, & purpurascente lanugine hirsuto, è quo aliquot staminula prominent: in oblongis deinde corniculis semen fert paleaceum, planum, & nigrum, reliquorum Caryophylleorum more: radix uti reliquorum fibrosa. Habent autem nouelli surculi latiora paulo folia, Armerido-

Caryophyl.  
fil. 2. tenuissi-  
mè laciniato  
& albo flore.





rum foliis proxima: sed angustiora, nec adco virentia.

Sponte nascitur in humidioribus Viennensis agri pratis, seriusq; reliquis floret, nempe Iulio, & toto interdum Augusto.

## VII.

Caryophyl.  
pumilio alpi-  
nus.

SEPTIMI folium est minutissimū, gramineumq; & quasi pungens, atque viride: adeo autem se propagat, ut magnos interdum cespites tegat, non secus atque muscus quidā totos illos obsidens: flosculi in singulis propaginibus à medio foliorum conspiciuntur, quinq. foliis bifidis constantes, colore rubro diluto: ore siue carneo, qui tenuibus & vix digitum transuersum altis pedunculis insident singuli, gratissimū spectaculo: semen in capitellis fuscis & splendentibus, renis forma (qua nota à reliquis Caryophylleis differt, & ad Lychnidum classē accedit) exiguum, subruffum: radix oblonga, nigricans, & multas propagines summa tellure faciens.

Summis Austriacarum & Styriacarum alpium iugis inuenitur nudo petrosq; solo. Floret Junio, semen Augusto plerumque maturitatem consequitur. At in hortos translatus hic Caryophylleus, etiam sub Aprilis finem floret: nonnunquam etiam secundo sub Septembris initium.

1. Colore floris variat qui in Iudenberg celsissimo Styria monte interdum nascitur, qui totus niueus est: alioqui in reliquis per omnia similis.

## VIII.

Caryophyl.  
pumilio rau-  
ticus.

OCTAVVS haud multum à septimo differt: folia tamen paulo sunt crassiora & succulentiora, illius plantae quae vulgo Gramen marinum vocatur (tamen si in montanis atisque locis procul à mari dissitis etiam sponte nascens inueniatur) foliis fere similia, frequentissima & confertissima, amariuscule sapore: inter quae emicant pediculi verius quàm cauliculi, transuersum digitum longi, geniculati, foliis binis inter se ad internodia oppo-

## Caryophyllus VIII.



di a oppositis: cauliculis insident prægrandes (pro stirpis proportionem) & laxi calyces, lanuginosi, ex viridi purpurascentes, in quinque crenas diuisi, unde singulares emergunt flores, quinque foliis constantes, colore rubro diluuiore, inodori: semen obseruare non potui: radix satis crassa, subsista, aliquot fibris donata, verum circa caput sese summa tellure expandens, & in plures ramos diuidens, subinde nouas fibras agit.

Prouenit iisdem quibus Quartum genus locis, solo tenui & arena splendente referto.

Floret sub finem Iulij & Augusto.

CARYOPHYLLEI nomen inuenit hac planta apud Herbariorum vulgus, quod eius flores plerumque aromatici caryophylli odorem emulentur. Sunt qui Vetonica appellare malint. Nec desunt qui ad Plinij Cantabricam referendam putent. Incola quinque priora genera Wild neglin/ Berg neglin & Z teinneglin indifferenter appellant, hoc est, siluestres, montanos & petraeos caryophylleos. Sextam genus peculiariter Zoder neglin/ id est, laciniatum sine dissectum caryophylleum Austriaca mulieres, quibus ob odoris fragrantiam in deliciis est, nuncupant. Anguillara libro Opinionum XII. Theophrasti Diosanthon facere videtur. Gesnerus in epistolis septimum genus appellare videtur Muscum alpinum. Gallis omnia ista genera Oeillets & Gyroffees sauages dici poterunt. Caryophylleus vero flos in genere Vngaris vulgo Zék fiv dicitur.

Passim in pratis, siluis, agrorum marginibus, aliisque herbosis locis hic sponte nascuntur & aliquot Caryophyllei siluestris sine Armerij floris genera. Sed quoniam ea, per reliquas Germania, Gallia, Hispania, atque etiam, ut arbitror, Italia provincias, obuia sunt: peculiarẽ illorũ descriptionem dare hoc loco operæ precium non videtur.

ARME-

Cantabrica  
Plini.  
Vetonica.

Diosanthon  
Theophr.

ARMERIVS porro ille multiplici florum rubrorum glomere constans, & Belgis hephens vernacula lingua appellatus abunde in quibusdam pratis Nemethwywar Ill. D. de Batthyán vicinis qua occidentem spectat, sponte nascitur, atque ab Ungaris Istén nyla, id est, Dei sagitta nuncupatur.

Armerius  
pleno flore.

HVC proculdubio referenda sunt duæ illæ plantæ quæ à rei herbariæ studiosis Belgis Graminis marini maioris & minoris nomine appellantur: tametsi plerisque aliis locis procul à mari dissitis etiam sponte proueniunt. Nam quod maius vocant, in summâ istarum Alpium herbosis iugis frequenter inueni: memini etiam videre in viuario illo regio Madritiana silua vulgo nuncupato, secundo ab vrbe Lutetia miliari, unde copiosum erui, & amicis in Belgicam misi. Nusquam verò, quod sciam, maritimis locis mihi conspectum est. Quod autem minus vocant, non modò in maritimis Angliæ & Belgicæ prouenit: sed in Moraniæ collibus copiose nascitur, atque non procul Praga itinere Viennensi: Saxonie etiam quibusdam herbidis locis, præsertim agro Witebergensi videre, & colligere memini ante multos annos.

Gramen ma-  
rinum.

maius.

minus.

Neutrius descriptio hic à me expectanda est, cum à Clariss. Viris Dodoneo & Lobelio cum suis iconibus edita sit: à Dod. quidem minor Graminis marini nomine: utraq. verò à Lobelio Caryophylli marini & montani appellatione. Ab illis ergo requirere poterunt rei herbariæ studiosi.

CETERVM Caryophylleorum facultates (quibus hand dubiè præditi sunt nonnulli ex iis quorum historiam hoc capite descripsi) diligentissime persequutus est celeberrimus Matthiæus amplissimis suis in Dioscoridem Commentariis.

LYCHNIDIS silvestris magna est etiam varietas. Nam licet multa genera præter vulgaria, in Hispanica mea peregrinatione observata descripserim: aliquot adhuc alia in his provinciis sese mihi obtulerunt, quæ minimè silentio premenda videntur.

Lychnis fil.  
flore rubro.

- I. Cui, ob florū elegantia, primum locū dāmus, unicus initio pedalis est caulis, geniculatus, mucagine glutinosa, præsertim in summo, aspersus, bina ex singulis geniculis sibi inuicē opposita proferens folia, oblonga, Armerio quarto Dodonæi fere similia, sed firmiora, crassiora, & viridiora: à medio fere ad summum multis floribus ex alarum sinu in oblongis pediculis prodeuntibus onustus est, qui quinis extremo diuisis sed in rotundum bifidis foliis constant, & elegantissimo colore rubro ad purpuram tendente rutilant, coronula elatiore medium umbilicum occupante, nullo tamen odore præditi: his succedunt membranæ, attamen duriuscula capitula, circa pediculum angustiora, & crassiore mucrone, quæ per maturitatem dehiscunt & semen ostendunt inclusum, minutum admodum, ex ruffo nigricans: radix crassiuscula, nigra, multas fibras spargit, & singulis annis novos, eosque numerosiores caules profert.

In omnibus fere Pannoniæ & Austriæ inferioris montanis siluis, editi q̃, & herbidis locis inuenitur.

Floret Maio, semen Junio maturescit.

Lychnis fil.  
albo flore. s.

- II. MULTA secundum radicem habet Altera folia digitalis longitudinis, sensim in latitudinem sese explicantia, sub extremum mucronata, viridia, nonnihil hirsuta, ad Lychnidis silvestris flore albo, quæ in omnibus provinciis vulgaris est, folia quodammodo accedentia,  
longè ta-





inodori, quibus succedunt obtusa vascula, semine exiguo, nigricante, planoq<sup>3</sup>, (qua nota quandam affinitatem cum *Armeriis* floribus habere videtur) referta: radicē habet fibrosam, uti similes & congeneres planta.

Sponte provenit ad radices *Alpium Syriacarum* Snealben, supra monasterium Neuberg: sed copiose admodum in *Et scher*. Floret Maio & Junio, & subinde semen profert: loco verò nativo omnia ferius.

2. Aliud eius genus invenitur in scopuloso illo præruptoq<sup>3</sup>, iugo *Durrestain* nuncupato, secundo supra *Gamingam* miliari, multo minoribus & angustioribus foliis: flore etiam minore: in cæteris non dissar.

*Lychnides fil-  
alix promif-  
cux.*

PORRO, præter iam dictas, passim etiam hic occurrunt cum in silvis, tum montanis pratis vulgares *Lychnides silvestres*, flore albo, rubro, & virscente, & quæ *Flos cuculi* appellatur: quæq<sup>3</sup>, nunc *Ocimastris*, nunc *Ocimoidis*, *Polemonij*, *Papanerisq<sup>3</sup>*, spumæ nomen à variis auctoribus recentioribus adeptæ sunt, *Lobelius* affinitatem quandam cum *Melandryo* *Plinij*, quod iocinori mederi scribit lib. 26. cap. 7. habere putat. Sed cum brevem admodum & mutilam eius historiam tradat: an huic planta quadrare queat, difficulter quenkūq<sup>3</sup> iudicare posse existimo. Omnino autem ad *Lychnidum silvestrium* classē pertinere arbitror, cum eas forma pulcherrimè referat.

*Melandryum  
Plin.*

*Vngari* non modò priores duas, sed etiam reliquas vulgares silvestres *Lychnides* *Vad zëk* fiu, id est silvestrem *Caryophylleorum* herbam appellant: nonnulli tamen priorem *Nywl zëk* fiu, hoc est, leporis *Caryophylleam* herbam vocant.



## DE HESPERIDE.

## CAP. XLIII.

HESPERIDI nomen inditum, auctore Theophrasto lib. 6. de causis Plantarum capite 25. quòd nocte plus redoleat, quàm interdiu. Cui suffragatur Plinius Naturalis Historie lib. 21. cap. 7. Ad quam vero earum plantarum quæ hodie nobis sunt cognite, potissimum referri debeat, plerique adhuc dubitant, cum alias nullas notas reliquerint Veteres quibus dignosci queat.

Hesperis cus  
sic nuncupa-  
ta.

Communis tamen opinio obtinuit, ut ea quam nonnulli Matronalem violam vocant, & inter Leucoij genera referri debere videtur, Hesperidis nomen sibi proprium adscisceret: quoniam eius flos, sub vesperam præsertim, grato odore nares feriat, interdiu aut nullum, aut lenissimum spiret.

Viola Matro-  
nalis.

Nos ergo, vulgarem Herbariorum opinionem sequuti, Hesperidem appellamus, quæ Matronalis viola alio nomine dicitur, quòd matronis atque virginibus sit in deliciis. Eius vèrò duo alia genera, minime, ut arbitror, ab aliis hætenus observata in medium proferemus.

CYBITALI Prior excresecit altitudine, multisq; ramis prædita est, quos còfuso ordine ambiunt folia, Matronali violæ similia, latiora tamen nonnihil & crassiora, gustu primum acidiusculo, sed acri postea, & salinam cient e: extremis ramis in oblongis pediculis insident flores Leucoij aut Viola matronalis floribus formæ similes, quatuor foliolis ut illi constantes, sed non explicati, verum sese contorquentes, & colore ineleganti admodum & obsoleto, hæc est, pallido vel furno, infinitis venulis ex atro purpureis intercurstantibus, odore interdiu nullo, aut adeò tenui ut vix naribus percipi possit, sed sub

I.  
Hesperis odo-  
ratiss. monta-  
na.



sed sub vesperam gratissimo & suavissimo: flori succedunt oblonga, torosaque ut alterius cornicula, sed quadrangula, in quibus duplici serie continetur semen vulgari Hesperidi simile, subruffum radix fibrosa, quam tamen biennium superare non arbitror.

Sponte primum nascentem & semine pregnantem anno Domini 1576. inveni in Prellenberg Hamburgenſi mōti vicino, Vngarieque extremo, qua Austriam spectat, mense Iunio. Eius deinde semen terra cōmissum subsequente vere, plantas mihi protulit quæ altero anno primum floruerunt Maio, deinde hyeme perierunt. An verò quod amicis in Belgicam miſi semen natum sit, non intellexi.

ALTERA vulgari Matronali viola adeò similis est, ut ex utriusque collatione vix discrimen conspici possit: etenim folia habet secundum radicem non minus ampla quàm illa, subhirsuta, viridia, per ambitum serrata: caulem cubitalem, multis alis concanum, ad quas alia breviora & nonnihil ad pediculum laciniata nascuntur: flores in extremis ramis copiosos, quatuor foliis constantes, exalbidos, qui tēporis successu purpureſcunt: cornicula, semina, radix etiam ipsa cum vulgari omnino conveniunt: solo floris odore, cuius in hac nulla gratia percipitur, differunt. Solet etiam hac plerumque altero ab germinatione anno, & à maturo semine perire.

II.

Hesperis alba  
ra pannonica,  
inodora Glue-  
stris.

Crescit passim Viennensi agro ad montium radices, & vinetorum in collibus sitorum margines. Floret cum vulgari, nempe Maio & Iunio.

PRIOREM appellare licebit Hesperidem montanam: Alteram verò Hesperidem Gluestrem.

Matronalem autem violam rursi, convulsis, & difficulter spirantibus mederi tradunt: urinas insuper & sudores propellere, incidere, abstergere & digerere.

CETE-



CETERVM qua à nonnullis *Viola latifolia*, à floribus *Hesperidis* & *Leucoij* similitudine, vocatur, ab aliis autem *Lunaria Græca* & odorata, quòd siliqua semine excusso splendida sint, & eius flores *Leucoij* aut *Hesperidis* florum odorem referāt, in montanis siluis *Austria* & *Styria*, & vicinarum *Alpium* siluosis locis, atque etiam in *Pannonia* interamni sponte abundanter prouenit. Quacū à plerisque aliis sic descripta, eius historiam hīc retexere non est necesse.

*Viola latifolia.*

*Lunaria græca* siue odorata.

## DE LEVCOIO SILVESTRI.

## CAP. XLIIII.

MULTA secundum radicem habet *Leucoij*, quod luteum florem gestat, foliis similia, nisi angustiora essent, viridia, gustu amaricante, inter quæ vnicus, interdum plures assurgunt caules pedales aut ampliores, striati, carinatis foliis obsiti, multos sustinentes flores quatuor foliis constantes, luteos *Leucoij* flore luteo florum amulos, sed minores minuscq, odoratos: floribus succedunt oblonga siliqua siue cornicula ut in *satiuo*, semine plena: radix oblonga, candicans, & multis tenuibus fibris praedita est. Biennalem esse puto, & semine ad maturitatem perducto perire.

*Leucolum sil.*

Inuenitur in montibus illis supra *Badenses* thermas, & in *Leytenberg* locis meridiei obuersis & salebrosis. Floret Maio.

COMMODE *Leucoium* siluestre appellari posse censeo: *Rhizotoma* etiam muliercula wild gelbe bepl vocant. Vngari autem *satium* *Leucoium* luteum *Sarga* viola nuncupant, hoc est, luteam violam.



## DE PRIMULA veris, siue Herba paralyti.

## CAP. XLV.

TAMETSI in harum Provinciarum pratis, locisq;  
herbosis & montanis, atq. silvis nascantur aliquot eius  
herbae quae vulgo Herbariorum *Primula veris*, & Her-  
ba paralyti vocatur, genera, qualia sunt elatior utraq.  
flore luteo & pallido, atque humilis flore pallido, eaque  
simplici foliorum textura: peculiare tamē quoddam ge-  
nus alunt nonnulla Viennensis agri, atque vicina prata  
vliginosa, quod ob florum elegantiam & venustatem,  
ut eius descriptionem hic subiiciam, meretur.

*Primula ve-  
ris varia ge-  
nera.*

GERMINAT autem primo vere foliis denis aut  
duodenis, initio quasi in globum contractis, quae deinde  
cum tempore sese explicant, & humi sparguntur, suntq;  
exteriore parte incana, & veluti farina quadā aspersa,  
interna verò ex viridi pallentia, aliquantulum crispā  
dēsusculaque, Herba paralyti vulgari fere similia, sed  
minora angustioraque, & minus rugosa, sapore acri, ex  
horum medio unus aut plures assurgunt cauliculi do-  
drantales, interdum pedales, nudi, graciles, in summo  
incani, qui sustinent ex uno veluti capite atque in um-  
bella nascentes flores, octonos, denos, aut plures, *Primula*  
*veris* floribus forma similes, quinque bifidis foliis con-  
stantes, qui magna ex parte eleganti dilutioresq; purpu-  
ra nitent, aut carneo colore sunt, interdū satyre rubent,  
nonnunquam, (sed rarò) omnino cādidi sunt, omnes au-  
tem in umbilico luteoli & aliquantulum odorati: semen  
deinde in oblongis vasculis admodum exile, fulvescens.  
Illud autem in hoc flore observavi, ut qui intensius ru-  
beat, pistillum siue stilum prominentem habeat, quem-  
admodum nonnullarum *Primularum* flores: at dilutior  
minimè. Radices habet candicantes, fibrosas, ad qua-

*Primula ve-  
ris flore ru-  
bro.*







rum caput non a subinde alia plantula secundum matrem germinant.

Sponte magna copia provenit in vliginosis agri Vienneſis (ut ante retuli) & vicinis pratis, ad Himberg, W'altenſtorf, & Eberſtorf Mag<sup>i</sup> D. Hieronymi Beck à Leopoldſtorff arcē, Botenſtorf, ſupra Badenſes thermas verſus Neapolim Aſtria. Floret verò ſub finem Aprilis & toto fere Maio. Habui autem ex iſis quas in hortum tranſtuleram, plantā, qua anno 1577. ex media ſorum umbella canliculum uncialem & ampliorē produceret aliam umbellam elegantiffimis floribus onuſtam ſuſtinentem.

Hanc etiam ſiccā ad me miſit D. Ioachimus Camerarius, paſſim Tyrolenſi & Salzburgenſi agris, ut ipſe adſcribebat, naſcentem.

Anno verò 1581. dum Londini eſſem, de C.V.D. Pennæ intellexi copioſè admodum naſci in Angliæ Septentrionalibus locis pratis humidis & paſcuſis, atq; ab incolis Wyrdetn/ hoc eſt, animum oculos nuncupari: quæ adeò cauſa fuit, ut C.V. Dn. Richardus Garthex Hlexarchatæ Derby, ut Wybſey non procul Halyſure urbe aliquot eius plantis ſuis floribus adhuc onuſtas ante meum Londino diſceſſum adferri curaret, quibus etiam adiuncta fuerunt aliquot Pinguicula, (de qua poſtea) ſtirpes, cum Trollio flore. Verum eodem etiam apud illos nomine inſignitur Cardamine illa pratenſis vulgo ſlos Cuculi nuncupata.

Quantum ex guſtu deprehēdere licet, iſdem facultatibus præditam arbitror, quibus alia Primula veris prædite ſunt.

EANDEM omnino eſſe puto, quam Joſias Simlerius commentario de Alpibus, ex C.V. Conradi Geſneri collectaneis deſcribit in hunc modum. Kieperlin herba puſilla,

silla, albicās Bellidis minima forma, in summo plurimos confertos flores purpureos habet, tota herba candicat, & attrita manu puluerem exuit, aspectu elegans. Casar inter herbas aut *Regulus*.

VARIA autem apud rei Herbarie studiosos obtinuit nomina *Primula* veris vulgo nuncupata *Belgis*. Nam sunt qui *ελωίδες* *Dioscoridis* esse putent, *Fuchs*ius verbascula vertit. Alij *Dodecatheon* herbā, quam *Plinius* lib. 25. cap. 4. describit foliis septenis, lactucis similimis, è lutea radice exeuntibus. *Vulgus* Herbam paralytim, *Clauem S. Petri*, Itali *Lactucam siluestrem* appellat, Germani *Himelschlüssel* & *Schlüsselblumen*. *Vngari* humilem, & *ἐκαυλον* maxima copia ubique in siluis caduis apud eos nascentem, *Kacha verág*, hoc est, pultis ex panico aut milio confecta, (quam illi *Kacha* vocāt) florem. Hanc ego superiore anno in *Anglia*, ubi etiam in caduis siluis abunde provenit, flore omnino nixeo conspexi, & aliquot stirpes amicis in *Belgicam* misi. Sed quæ rubro flore est, à rusticis mulierculis quæ flores eius manipulatim colligatos *Vienam* in forum deferant, iisque vendunt, quæ ferta & corollas necant *Vireutzblumen* nuncupatur, eo quòd *Maio* mense circa id tempus quod *vulgari lingua Vireutzwochen* (cæ sunt rogationes) plerumque floreat.

*ελωίδες*  
*Diosc.*  
*Dodecatheon*  
*Plin.*  
*Herba paraly-*  
*sis.*  
*Clavis S. Pe-*  
*tri.*  
*Lactuca sil.*

## DE AVRICULA VRSI.

## CAP. XLVI.

NON dubium est quin ad *Primularum* classem referenda sit venusta hac planta, sic eas formæ & temperamento emulatur.

Eius verò multa genera observavi in *Alpinis* istis ingiis, quæ omnia suo ordine describemus, initium à vul-

## Auricula vrfi 1.



gatiore, sed omnium odoratiore facientes.

ILLIUS folia *Primula* veris foliis fere respondent, minimè tamen rugosa sunt, sed crassiora fabaria foliorum in modum, nunc quasi farina polline conspersa & omnino incana, modò leuiter canescentia, interdum omnino viridia & laeua, omnia nonnunquam per ambitum ferrata, aliquando nullis denticulis insignita, interdum nouella duntaxat, vetusta minimè, omnia autem gustu amara. Ex horum medio, aut è lateribus cauliculi prodeunt dodrantes, aut minores, nudi, veluti farina quadam conspersi, qui denos, vicanos, tricenos, interdum plures (praesertim si in hortis colatur, ubi admodum luxuriat) flores sustinent ex uno veluti capite aequaliter prodeuntes, & pediculis (quos veluti squammula quadam incana ab inuicem segregant) breuib'que calyculis inherentes, *Primula* veris similes, quinis aut senis diuisuris constantes, dulcem & melleum quendam odorem spirantes, nunc luteos, nunc pallentes, modò maiores & ampliores, modò minores, omnes interius circa umbilicum albo circulo insignitos, stilo inter stamina nonnunquam prominente, interdum autem nullo: semen deinde fuscum, inaequale, bullatis vasculis inclusum, quale *Primularum* veris: radix crassa est, & multis candidis oblongis'que fibris praedita, ex qua, si colatur & pangatur, plures planta enasci solent.

Crescit in Sneberg, Neuberg, Etzcher, & aliis vicinis Styriacis'que alpibus, monte'que Gleysenfeld imminenti: deinde multo latiore copiosè inuenimus in scopulo Medeling oppido (quod duobus aut paulo amplius miliaribus ab urbe Vienna distat) imminenti, qua Septentrionem spectat, unde rhizotoma muliercula, cum florum manipulos, tum ipsas interdum stirpes adferunt.

1.

Auricula vrb'  
luteo flore.

Auricula vrb'  
rubro flore.

11.

ALTERIUS folia breviora sunt, latiora plerum-

Y 5

que, &amp;



que, & initio quasi subrotunda, quæ temporis successu angustiora circa radicem redduntur, crassa quidem illa, sed minus quàm superiora, per ambitum serrata, superne viridia & lenia, infernè ex viridi pallescentia: inter quæ cauliculus exit nudus, duas uncias longus aut paulo amplior, cui insident seni, octoni, aut plures flores simul in capitulo aut in umbella congesti ut in superiore, illique forma similes, sed maiores, colore rubro nitentes, obscuriore initio, quasi mororum succo infecti essent, deinde eleganti & dilucida rubraque purpura gratissimi, intus circa umbilicum pallescentes & exalbidi, odorati quidem illi, sed minus superioribus: semen nigrum inaequale, minus & in capitulis longè minoribus: radix priori similis.

HANC frustra per istarum Provinciarum altissima iuga quasi: primum autè mihi cõspecta est in cultissimo horto C. V. D. Joannis Aicholzj Medici & Professoris Viennensis amici mei veteris & hospitis charissimi, quam à Nobili quadam matrona antè acceperat, sed unde illi primum communicata fuisset, ipse ignorabat. In Oenipontinis tadem et vicinis alpibus copiosè nasci postea intellexi.

IN Tyrolensibus verò iugis, præsertim in Kitzspil inueniri audio Tertium genus foliis quàm superioris minoribus, tenerioribus, minusq; crassis, subhirsutis, & per ambitum undique serratis, inter quæ nascitur cauliculus superiori similis, florèsque ferens in umbella persimiles, & rubros, exalbidis tamen quibusdam maculis respersos, cuius radix similiter fibrosa, & è lateribus novas propagines fundens.

Eam primum mihi ostendit cum multis aliis raris stirpibus quas in exculto suo horto alit C. V. D. Ioachimus Camerarius inclytæ Reipub. Noribergensis primarius

III.

Auricula urfi  
Borevario.

*marius Medicus, dum anno 1579. in Belgicam proficisceretur, & deinde tum eodem anno reduci, cum anno 1581. ex Anglia Viennam reuertenti, illius paucula adnata communicauit: sed priora perierunt, neque altera satis firma sunt, sed quasi contabuerunt. Eodem cum aliis generibus tempore florere mihi dixit.*

## IIII.

*Auricula vrsi  
carnei colo.  
flo.*

*QUARTA minoribus est quàm Secūda etiā foliis, carnosis, mucronatis, & per ambitū minimè serratis, superne lanibus & splēdentibus, inferne cādicantibus & venosis, minore acrimonia & amaritudine præditis quàm aliarum folia: flores illi superiori similes, profundioribus incisuris secti, colore dilutius rubente, intus circa umbilicum incana quadam lanugine hirsuti, stilo prominenti, inodori, ex longioribus calyculis bini, terni, aut ad summum quaterni nascentes, quos sustinent unciales cauliculi, rarò longiores: semen in capitulis paruis, reliquis maius & fuscum: radix minor & nigricans, atque adeò numerosa interdum sobole se propagans, ut latissimos cespites occupet.*

*Inuenitur in Sneberg, reliquisque vicinis iugis & Styria alpibus frequentissima.*

## V.

*Auricula vrsi  
angustifolia.*

*QUINTA nititur crassiuscula radice, Quarta haud dissimili, multis fibris candicantibus capillata: ex qua angusta folia quina aut sena, succulenta & pingua, proxima descriptæ foliis multo angustiora, à medio ad extremum vsque per ambitum serrata, gustu amaro prodeunt: cauliculus inter ea nascitur digitalis longitudinis, nudus & lauis sustinens capitulum. è foliolis compactum, vnde quaterni aut quini flores elegantissimi, colore dilutius rubente, quinque foliis, vti reliquorum constantes: semen non obseruari, capitula tamen proxime similia habere conspexi.*

*Crescit*





Crescit hac in quibusdā alpibus Carinthia, & Styria superioris, praesertim verò Tauro monte & Iudenbergi ingis. Floret sub finem Iulij, hoc est, nubibus in summis illis ingis liquefcentibus. Rara hac, quoniā ex procul dissitis montibus delata, in vnius Aicholtzij hortopaucos annos perduravit, omnem cultum ita respiciens, ut nunquam ad frugem pervenire, imò ne florem quidem proferre voluerit.

## Auricula vrsi v i.



VI.  
Auricula vrsi  
minima.

SEXTAE folia unguem magnitudine vix aequant, infernè circa sedem angustiora, supernè & in extremo latiora fimbriataque, viridia, nervosa, superioribus minus densa, gustu amaro: pedicellus inter folia exilit vix digitum transversum altus, qui unicum, interdum alterum sustinet florem, quinis bifidis foliis constantem, colore dilutius rubente, siue carneo, Quarta flori non multum

multum ab simili, è calyculo fimbriato sed obtusiore prodeuntem, inodorum, intus etiam circa umbilicum candida lanugine pubescentem nullo prominente stilo: neq. huius semen observare mihi licuit, cum non quovis tempore istud iugum ubi nascitur conscendere propter difficultates potuerimus, nec in hortos translata ad frugem unquam pervenerit: simile tamen reliquis esse existimo: adnatis mirum in modum se propagat, & interdum totum cespitem densissimè occupat, candicantes fibras è singulis propaginibus demittens.

In summo Sueberg iugo primus istam observavi anno 1574. neq. vlllo alio vicino iugo postea mihi sese obtulit.

Invenitur, sed rarissimè, in supra memoratis iugis 2. Tauro & Iudenberg aliud genus per omnia simile, sed paulo candidioribus foliis, quod flore omnino niueo est.

Auricula vrgi  
minima flore  
niueo.

Florent omnes Junio, interdum Iulio & Augusto, videlicet statim post solutas, in iis iugis ubi crescunt, niues, interdum etiam sub ipsa quasi niue, & concamerata niuis crusta, reliqua Solis percussione & radiis circum soluta. In hortos verò translata Aprili florent, & aliquando iterum Autumno, si aura sit temperatior. Tertiam & Quintam excipio, qua vel statim cõtabuerrunt, vel nulla, ut dixi, diligentia ad florem perducipotuerunt.

OMNIA ista genera, præter tertium, primus omnium Belgica communicavi, missis ad Ill. v. Ioannem de Brancion p.m. amicum fratris loco mihi carissimum, & post eius obitum ad Magnific. V. Ioannem vander Dilst eius agnatum, & complures alios amicos, eorum plantis, primulaq; veris rubro flore, & rarissimis alijs alpinis stirpibus: prior autem species iam antè Belgicæ inquilina facta fuerat liberalitate C. V. Alphonsi Pancij Ferrariensis medici.

Iosius Simlerus cōmentario de Alpibus, aliquot eius genera recenset, ex Gesneri collectaneis, ut ipse refert, desumpta: nempe flore luteo, pallido, purpurascēte, rubescēte sanguinis modo, cinereo & atro colore: quas postremas duas nunquam mihi conspēctas esse ingenue fateor, nisi per cinereum intelligat quartum genus, cuius flos marcescens veluti cinereum colorem contrahit; & per atrum, secundi generis florem primum sēse explicantem, quem obscuriorem, & veluti mororum succo infectum initio esse dixi.

QVO nomine veteribus dicta sit hac planta, ignoramus: Recentiores autem varia illi indiderunt nomina. Matthiolus enim inter Sanicula genera recenset, & Herbariis Auriculam vrsi vocari tradit. Gesnerus libello de Lunariis herbis, Lunariam Arthriticam appellare maluit. Alij Paralyticam alpinam nūcupant: vulgarius tamen apud rei herbaria studiosos nomen est Auricula vrsi. Heluetiis Flublumle, hoc est, rupium flosculus dicitur. Harum Alpium incolis prior Crafftkraut, & Schwindelkraut ab effectu dicitur, commendant enim eius radices vsum, ad roborandum caput, ne vertigine in precipitiis tētetur, ideōq; caprearum & ibicum venatoribus nō minus familiaris quā Doronici radix. Medlingenses, apud quos copiose nasci dixi, Wolsmechende Schlüssel blumen, id est, odoratam primulam appellant: secundum genus & tertium. Vierte Schlüssel blumen ab incolis vocantur: Quartum genus, St aintrollin, hoc est, petream rosulam, ob elegantem & roseum colorem, quodq; in scopulis nascatur, montani pastores nūcupant. Quinta apud Styria superioris incolas montanos Hofs speick nomen inuenit, id est, equina nardus seu spica, ad differentiam Nardi sine spica Celtica, quae abundanter in eodem ingo Judenberg na-

Lunaria ar-  
thritica.

Paralytica al-  
pina.

berg nascitur, ut in eius historia dicemus.

GESNERVS libro de Lunariis herbis, prioris radicem vinum suo odore commendare scribit, manducata verò, dentium dolores, præsertim à frigida defluxione obortos iuuare, capiti frigido, & partibus nervosis prodesse, putrida ulcera emendare, scissuras in cute hiantes, ventorum, frigoris, aut alia quapiam iniuria, succum eius instillatum breuissimè sanare.

Matthiolus ad enterocelas & thoracis vulnera, si quotidie in potu sumatur, utilem esse, quin & ad alia vulnera tam intus sumptam, quàm exterius illitam.

Hic soli, ut dixi, mōtani venatores eius radice utuntur, à reliquis negligitur, præterquam à mulierculis, qua ex eius floribus ferta & corollas conficiunt.

## DE SOLDANELLA ALPINA.

### CAP. XLVII.

NATALIVM communio & floris venustas facit, ut superioribus subiungam hanc elegantissimam plantam, cum aliquot aliis.

HABET verò sena aut octona folia, crassa, in orbem fere circinata, brassica marina, quã vulgo soldanellam vocant, amula, sed duriora, supernè viridia, infernè dilutiore virore splendentia, gustu primùm exiccante, deinde acri & ingrato: flores gerit in laxi, nudo, gracili, subrubro, dodraptaliq, cauliculo binos, ternos, aut plures, purpurea colore nunc saturatiore, nunc dilutiore, inodoros, campanula modo efformatos, deorsum spectantes, & propendentes, unico folio in quinque profundas crenas (quæ aliquantulum laciniatæ sunt) & totidem alias singulares diuiso, constantes, è medio protuberante veluti quodam umbone cum lōgo stilo, qui in caputellum euadit, vel corniculum potius, oblongum, durum, membraneum,

Soldanellæ  
alpinae histo-  
ria.



*braneum, mucronatum, semen continens paruum, durum, virescens, simul congestum: radices fibrosæ candicantes ex uno veluti capite dependent, quod adnatis se propagat.*

Copiose nascitur in Austria & Styria alpibus perpetua niue obsitis: nusquam verò latiore aut abundantiore conspexi, quàm in iugo Wechsel nuncupato supra Aschpang Magnifici Dn. Erasmi à Khunigsperg, p. m. liberi Baronis; ubi anno 1576. unicâ plantam flore omnino niveo inueni.

Floret istic Iunio, interdum etiam Iulio & Augusto, quemadmodum nives maturius aut serius liquecunt & dissoluntur. In hortos verò translata etiam Aprili cum primula veris rubra floret: difficulter autem cicurari potest.

EST & aliud genus minore folio, neque circa pediculum ad eò circinato, sed paulatim ab ipso pediculo in latitudinem excrecente, brevioris gracilioreq; pediculo. 2.

Inueni etiam anno 1578. in ascensu montis Herren alben (unde postea iter est ad celsissimum iugum & scopulum Darrenstein duobus supra Gamingam miliaribus) locis umbrosis quoddam genus amplius foliis, sed tenellis admodum, quæ parte inferiore non virebant superiorum modo, verum non minus rubescebant quàm Cyclamini flore odora: o folia. 3.

SOLDANELLE nomen inditum, quod eius folia Soldanella marina folijs sint admodum similia: vulgare nomen nullum ediscere potui ab alpinis Pastoribus & Venatoribus.

Sed neque vllas ipsius facultates notas habent. Noster verò Lobelius, Empiricum quendam folijs usum ad aquas in ascite educendas, vulneribusq; cicatricem obducendum, asserit.

## DE VIOLIS MONTANIS.

## CAP. XLVIII.

DVO Viola rara nec antè mihi conspecta genera in Austriacis & Styriacis alpidibus inueni, quæ propter venustatē studiosis rei herbaria nota facere non dubitavi.

- I. **FOLIA** habet Prior nigra viola fere similia, minora tamen, breuiora, & è viridi colore pallescentia, gustu calido; angulosos cauliculos, in quibus bini aut terni sunt flores ex alarum sinu prodeuntes, viola minores, colore luteo, inodori, quinque foliis constantes, quorum infimum manifestum est, & quinque radiolis siue nervis nigris interiorē parte distinctum, reliqua verò exteriorē parte: semen in triangulis capitulis, quæ per maturitatem dehiscunt, exiguum, nigricans, aliis violis simile, præsertim tricolori: radix alba, crassiuscula, multas propagines è lateribus procreat, candidisq; fibris hirsuta est.

Viola montana flore luteo.

Abundanter nascitur in omnibus Austria & Styria alpidibus: & floret Iunio atque Iulio, in cultis autem Aprili. In Borealis Anglia montibus inueniri etiam intellexi.

- II. **EXIT** Altera in summi Sneberg ingi vertice, foliis perquam exiguis, & quasi circinata rotunditatis, per ambitum leniter serratis, crassiusculis, oblongo pediculo, inharerentibus: cauliculus assurgit è medio foliorum duas uncias longus, unicum florem sustinens purpureum, vulgari similem, sed multo maiorem, & inodorum: cui succedit siliqua triangula: radix nonnihil serpit, & aliquot fibris donata est: floret sub finem Junij.

Viola arborescens Matthioli.

FREQVENS in harum Provinciarum nemoribus occurrit elatior illa maritima Viola, cauliculis firmiter erectis, quam cur Matthioli arborescentem cognominavit, nullam rationem video.

CETE-





CETERVM non potui elegantissimi huius floris nec ante annum 1579. mihi conspecti descriptionem hoc loco non inserere: licet in Pannonia non sit mihi observatus, sed eius cognitionem acceptam feram C. V. Ioachimo Camerario, in cuius horto alebatur.

III.

Viola tricolor  
odoratissima.

PLVRIMOS porro ex una radice pedales profert caules angulosos, & admodum ramosos, quos per interualla ambiunt folia tricoloris viola foliis fere similia, longiora, crassiora q̃, & succi plena, leniter & rarius dentata, apophysis ad latera oblongis, & profundè lacinatis, sapore amarissimo, & nonnihil acri: ex summis alis oblongi oriuntur pediculi, triangulares tenelli, sustinentes singuli florem omnium quos in hoc genere viderim maximum, quinque foliis, ut vulgaris, constantem, quorum duo superiora extremis oris ex caeruleo purpurascunt, & circa umbilicum pallidi sunt coloris, duo in latera expansa illis minora; colore luteo maculis ex caeruleo purpurascensibus resperso, trinisq; purpureis radiis ex umbilico emicantibus insigniuntur, inferius latissimum est aurei fere coloris, septenis radiis purpureis ab umbilico intercurrentibus, maculaq; ex caeruleo purpurascens infimo labro notatum, odor suauissimus: capitula crassiuscula, quae in ternas partes dehiscentia semen ostendunt uti alia, pusillum rotundum, per maturitatem fuscum, tricoloris viola semini proximum: radix fibrosa est & perennis: facile etiam ramulis in terram defixis propagatur.

Sponte in Helveticis montibus nasci ferunt, unde Ill<sup>ma</sup> Princeps à Cassel erutam accepit, ipsaq; Camerario communicauit. Floret propemodum tota aestate.

2. ALIUD autem genus per omnia ei simile, floris colore excepto, apud Illustrissimū Principem Wilhelmum Landgrauium Hassia, &c. in cultissimo ipsius Cel<sup>dinis</sup> horto



horto Cassellis anno 1581. observavi: nam qui in superiore varius est color, in hoc omnino flavus est, radius purpurantibus ex umbilico emicantibus magnam gratiam flori adferentibus: aliquantulum etiam odoratior videtur.

## DE PINGVICULA.

## CAP. XLIX.

Pinguicula  
Gesneri.

VENUSTA & elegans etiam est hac planta, quae quaterna aut quina habet foliola, Gentianella fere similia, circa radicem latiuscula, deinde in mucronem desinentia, satis densa, & pinguis, succulentaq<sup>ue</sup>, tenella tamen, & colore dilutius virente, sapore amaricante: ex horum medietullio unus aut plures oriuntur cauliculi, nudi, dodrantes, tenelli & exiles, quibus insidet singulares flores, interdum albi, nonnunquam purpurei, cauda siue calcar prominente, quemadmodum in Consolida regalis vulgo dicta siue Cymbalaria flore: his succedunt rotunda capitula mucronato apice, minutum, oblongum & nigricans semine continentia: radices tenues sunt, fibrosae & candicantes.

Qua albo est flore sponte provenit non modo in Sneberg, Durrenstein, alijsq<sup>ue</sup> alpium iugis in locis à solutà recens nunc adhuc madentibus sed etiam permixta illi qua purpureo est flore in omnibus fere pratis uliginosis, in quibus crescit Primula flore rubro: ubi Maio floret, & Iunio semen profert: in Alpibus vero serius hac omnia.

Quo nomine dicenda esset hac plantula diu amebimus: placuit tandem id illi relinquere, quo à C. Gesnero, in descriptione montis Fracti non procul à Lucerna celebri Helvetiorum urbe sita, donata est, donec commodius aliquod reperiramus.



PINGVICULA, inquit, ut ficto à nobis nomine appellatur, florem caruleum ut viola maritima profert, inodorum: folia humida, mollia, laeua, absque nervo (ni fallor) ut lingulaca vel ophioglossus: nascitur in palustribus. Hec ille.

Lingulaca Plin.  
m.

Quid si verò Lingua vel Lingulaca Plinij sit, quam lib. 24. cap. 19. & lib. 25. cap. 11. circa fontes nasci tradit? Verum nos nihil hic asserimus, sed inquirendi duntaxat causa hac scribimus. Nullum vulgare nomen à montanis pastoribus, neque à Viennensis agri incolis, quod intellexerim, obtinuit. Et haud scio an apud illos aliquo medico in usu sit.

Retulit mihi anno 1581. C.V. Pennaeus Londinensis medicus hanc plantulam tam quae flore caruleo est, quam quae albo, plerisque Anglia locis inueniri (in ipsa experientia verum esse postea me docuit, quemadmodum capite 46. huius libri annotauimus) & à Borealibus, apud quos Primula veris rubro flore permixta crescit, Butterwort/ id est, butyri radicē à pinguedine butyro simili qua fissuras in vaccarum vberibus sanare solent, appellari: à Meridionalibus verò Anglis (apud quos etiam crescit) Whipt root vocari, quia oves interficit, si ob cibi penuriam illa vescantur.

## DE RANUNCVLIS MONTANIS.

### CAP. I.

NASCUNTUR in utraque Pannonia Noriciq, parte varia Ranunculi genera, quae passim in aliis Prouinciis crescunt. Sed aliquot alia in harum prouinciarum altissimis ingis conspeximus, quae à reliquis herbariae rei Scriptoribus vix obseruata esse animaduerto. Itaque omnibus medica materia studiosis gratum me facturum existimaui, si eorum historiam illis etiam communicarem.

MULTA

MVLTAE parva, rotunda & quasi circino circum-  
scripta habet Prior folia, aliquot crenis divisa, & per  
ambitum serrata, atro virore superne splendentia, cras-  
sa, carnosaq; & gustu feruidissimo: ex horum medio flos  
emicat quinque a bis foliis constans, staminibus in radio  
croceis, inodorus, qui pediculo tenui, singulari, vixque  
dodrantem aequante innascitur: quo defluente succedit  
capitulum quemadmodum in aliis ranunculis imma-  
turo frago simile, quod ex minuto semine simul congesto  
constat. radix multis albicantibus fibris pradi-<sup>ta</sup> est.

Ranunculus  
minimus Bo.  
albo.

Eius altera species est, cuius folia in tres profundas 2.  
lacinias divisa, caq; denuo aliquoties incisa sunt: flos  
amplior, & interdum quasi duplici foliorum ordine con-  
stans: alioqui & colore, & florendi tempore superiori  
par: radix etiam quemadmodum in illo superna parte  
nonnihil extuberat, & fibris donata est.

Exit utraque species in summis Sneberg & vicina-  
rum Alpium iugis confragoso solo, & fere in ipsis scopulo-  
rum fissuris: Iunioq; interdum floret, nonnunquam se-  
rius, statim post solutas istic nives: in hortis verò matu-  
rè admodum, & ante alios ranunculos Aprili.

ALTER quina aut sena promit folia, magna, viri-  
dia, dura, Ranunculi foliis qui Trollius flos à nonnul-  
lis vocatur, haud absimilia, nonnihil hirsuta, tribus cre-  
nis ad umbilicum usque, deinde aliis minus profundis  
divisa, sapore primum dulci, deinde nonnihil amaro, pe-  
diculis firmis & crassis innitentia pedalis longitudinis:  
caulem cubitalem, nudum, nullis ramis brachiatum, fir-  
mum, hirsutū aliquantulum, intus cauum, qui in sum-  
mo trina habet folia contigua, profunde laciniata, Ane-  
mones fere modo, deinceps dividitur in quatuor aut  
quinque oblongos pediculos, singulos unicum florem su-  
stinentes album, quinis foliis satis magnis constantem.

II.

Ranunculus al-  
pin. albo flo-  
re.

multis





Ranunculi montani 1. species altera.





multis in medio staminibus luteis, utcumque odoratum: flore excusso, capitula apparent semine plano & magna onusta: radix veluti premorsa, & multis nigricantibus fibris prædita est.

Frequens est in Sneberg, Snealben, aliarumq; Alpium pratis: floretq; Iunio, semen maturitatem adipiscitur Augusto.

In celsioribus tamen earundem Alpium iugis nascitur multo humilior & hirsutior, pedalem altitudinem non excedens, flore paulo maiore, & qui Narcissi medio lutei florem æquare possit, atque odoratiore, foliis amarioribus & acrioribus, tametsi gustata, initio quandam dulcedinem præseferant. Serius floret altero.

PROXIME huc sequi debet pulcherrimus ille Ranunculus alpinus, cuius iconem & descriptionem D. Thome Pennai liberalitate consequutus sum.

Quatuor autem, quinque vel sex à radice profert folia longis pediculis nitentia, in quinque, sex, vel aliquando septem præcipuas partes Ranunculi more diuisa, parte prona fere castia, supina verò ex nigro viridia: ex horum medio unicus caulis ab radice oritur, longitudine pedem æquans, nudus, folia in summo fere emittens oblonga, maxima ex parte in tres lacinias per extremum diuisa, è quorum medio pediculi tres, quatuor, quinque, interdum sex vel septem oriuntur, duos digitos transversos longi, unico vel duobus foliolis subinde ornati, quorum singuli florem susinent pulchrum, ex quinque foliis orbicularibus constantem, quæ inferius purpurascunt, superius iuxta latera ex albo purpurea sunt, reliqua parte albissima, multis luteis staminibus medium occupantibus, calycæque ex quinque foliolis herbaceis constante: semina ut in ranunculis compacta, ex nigro purpurea & mucronata, parum compressa, paulo

2.  
Ranuncul. al-  
pin. Narcissi  
flore.

III.

Ranuncul.  
mont. purpu-  
rascente flore.



paulo quàm in aliis ranunculis maiora: radix in summo setosa, multipliciter diuisa, sapius cruciata modo dissecta, & in multas fibras diuaticata. Tota verò planta pilosa est.

Crescit copiose in monte Iura, è regione urbis Genevensis. Floret Junio & Iulio, semina Augusto matura.

**FOLIA** Quarto magna in quinque lacinias secta, viridia & per ambitum serrata, inferne dilutiora & splendentia, dura, nervosa, quæ præmorsa nullam manifestam acrimoniam, sed amarorem potius exerunt: caulis cubitalis, firmus, licet tenuis, laevis, nodosus aut geniculatus, in multas alas à medio ad summum sparsus: in quibus flores utcumque magni, secundo tamen minores, quinque foliis constantes, tenelli, toti lactei, aliquantulum odorati, staminibus in medio pallentibus, capituli rudimentum ambientibus, quod ex seminibus aliis ranunculis fere similibus simul congestis constat: radix præmorsa videtur quemadmodum secundi, multasq; longas & candicantes fibras habet.

Provenit copiose in ascensu Wechsel, Sneberg, aliorumq; vicinorum montium locis siluosis. Floret cum Secundo: sed in cultis Maio, semen verò maturescit Iunio.

Isdem quoque locis invenitur Ranunculus ille albo flore, quæ Clariss. Dodonæus libro de Deleteriis & Perniciosis descripsit. Sed ab isto differt: etenim humilior est, folia habet leniora, & nonnihil atriora, flores variores & minores, in obliquum nascentibus pediculis inhaerentes: maturius etiam floret.

Huic congenerem flore pleno nuncio, ut aiebatur à Mag<sup>o</sup> D. Ioanne vander Dilft amico mihi observando, qui illius iconem è Belgica usq; mihi huc misit, nusquam in istis iugis observare potui. Arbitror illi natam fuisse

IIII.

Ranuncul. al-  
pin. maior  
albo flo.

Ranunculus  
flore poly-  
phylo albo.



fuisse ex iis plātis, quæ paulo ante quàm à Cesare Maximiliano II. huc accersitus, è Belgica discederem, Illi viro D. Joanni de Brancion eius consanguineo ex Burgundicis alpihus misse fuerant. Eius deinde planta à C. V. Ioachimo Camerario mihi communicata est.

QVINTVS, omnium quos unquam viderim max-  
 ximus, multa admodum ampla & densa habet folia, fi-  
 culneis haud minora, quinque profundis incisuris diui-  
 sa, per ambitum nihilominus serrata, colore d. luteus vi-  
 rente splendentia, subhirsuta, acria admodum & lin-  
 guam vellicantia: cubitales caules, digiti crassitie, fir-  
 mos, hirsutos, superiore parte in aliquot ramos diuisos:  
 qui multos flores sustinent quinque foliis constantes re-  
 liquorum ranuncolorum modo, & luteo auri splendore  
 fulgentes: semen reliquis vulgaribus simile, in capitulis  
 congestū: radicū loco multas candicātes fibras habet.

Crescit in nemoribus & umbrosis locis atq; decliui-  
 bus omnium istarum alpium iuxta riuulos è liquescen-  
 te niue profluentes: in nonnullis item umbrosis pratis ad  
 Viennensem saltum, & ultra Drauum. In hortis &  
 pratis Maio floret: in Alpibus verò Iunio aut ferius.

IOSIAS Simlerus cōmentario de Alpibus Prio-  
 ris meminisse videtur, quem ab Helueticarum alpium  
 accolis Jegerkraut, hoc est, Venatorum herbam appel-  
 lari scribit: Montani isti pastores & venatores, fieber-  
 kraut vocant, & ad febres pellendas (unde nomen) con-  
 tusis foliis carpo admotis vtuntur. Secundo & Quarto  
 venatores Abbeis, et Teuffel abbeis, id est, Premorse  
 & Diaboli morsus nomen indiderunt. Quintus nullam  
 peculiarem appellationem quod intellexerim habet: non  
 incommode tamen meo iudicio πλάτυφυλλος à foliorum  
 amplitudine cognominabitur. Vngari Ranunculum in  
 genere Beka siu vocant.

Ranunculus  
 placyphyllus  
 Bo. luteo.

Trollius flos.

PORRO *Ranunculi* illius quem *Gesnerus* in descriptione *Montis fracti* *Trollium* florem vulgo dici scribit, quig<sup>3</sup> quintus inter externos est *Dodonao* lib. 4. de *Deleterius* & perniciosis herbis, flore in globum collecto, duo in istarum alpium pratis observavi genera: maius

1. unum, ampliore flore & aureo: alterum minus, flore paulo minore & colore quasi ex viridi pallecente, foliorū alioqui forma, capitulis, semineq<sup>3</sup> nigro & radicibus inter se conveniunt. Eum etiam superiore anno in *Anglia* inter *primulas* flore rubro erutum vidi.

*Ranuncul. illyric.*

Eius *Ranunculi* quem vulgo *Illyricum* cognomināt, quemq<sup>3</sup> primus in *Hamburgensi* monte sponte nascentem deprehendi anno 1574. *historiam* lib. 2. *Rariorum stirp.* a me per *Hispanias* observatarum dedi.

*Thora Valdensum.*

ETIAM inter *Ranunculi* genera referenda videtur ea planta, quæ apud rei herbaria studiosos *Thora Valdensum* nomen obtinuit, & a Doctiss. *Gesnero* plerisque locis *Aconitum* primum *Dioscoridis* esse censetur: de quo peculiaris *Asseneratio* post ipsius epistolas opera *Casparis Wolfij* editas, inserta est, ubi *Plinii Cyclaminum* tertiam lib. 25. cap. 9. & *Limeum* eiusdem lib. 27. cap. 11. descripta, esse contendit.

Illum etiam anno 1578. observavimus in *Etcheri summi iugi* *pracipitiis* atque *scopulis* tenui terra coopertis, ad meridiem obuersis mense *Augusto*: atque paulo post in alio iugo *Sneberg* vicino frequentiore & uberiore. Folio tamen brevior esse quàm *Valdensum Thora*, siue illius quæ ex monte *Baldo* eruitur, superna etiam parte magis inciso & latiore deprehendi. Huius præterea flos quinis foliis constat, cum illorum quaternis duntaxat foliis exprimatur. cetera satis conveniunt.

DE RA-



## DE RANUNCULO BYZANTINO

sive Asiatico. CAP. LI.

QUONIAM de Ranunculis iam egimus, non incommode in hunc locum reuocari posse existimo elegantis illius et verè rari Ranunculi cuius in Appendice ad Hispanicas observationes memini, historiam: quoniam post aliquot tandem annos Constantinopoli planta missa est illius quidem nomine insignita, sed quam ab ipso nonnihil differre experientia nos docuit, ut ex eius historia cuilibet patebit.

PEDALEM igitur ille, quemadmodum diximus, habet caulem, in duos aut plures ramos diuisum, quorum extremitatibus insident flores magni, multiplicique foliorum glomeratione constantes (ut in Ranunculo vulgari tuberoso flore multiplici) sed pulcherrimo cocci colore rubentes: folia circa radicem quina aut sena diluto virore nitentia, media forma inter palustris & echinati Ranunculorum folia: qua verò per caulem sparsa sunt, minora, nec adeo incisa, nec admodum frequentia: multe illi radices simul congestæ, Lusitanici Ranunculi radicibus persimiles, asphodeliformes, flavescentes.

1.  
Ranuncul. polyphyll. flore cocineo.

Hanc descriptionem concinnavi non ex viva planta, sed ex iconè vivis coloribus expressa, quæ generosus Dn. Carolus Rym Dn. de Eeckebeke defuncto quinquennali Cæsarei Legati apud Turcarum Imperatorem munere Constantinopoli rediens mihi liberalissimè communicavit.

RANUNCULI autem Constantinopolitani sive Byzantini cognomen illi dedi, quod quibusdam hortis Byzantio vicinis & in eius Urbis conspectu, ultra tamen Bosphorum sitis inueniri intellexissem; qua fortè ratione Asiaticum vocare præstaret.

Huius iconem tamen si ego & alij aliquot Constanti-

polim postea miserimus, ut plantam quam hac pictura referebat, ad nos perferendam curarent; nunquam consequi potuimus. Sed Anemonem latifoliam pleno flore miserunt, negantes eum ranunculum aut notum, aut unquam sibi conspectum.

ANNO tamen 1580. curante Mag<sup>o</sup> Dn. Wolfgango Christophoro ab Entzestorf, qui iconem Cōstantinopolim precedente anno miserat, aliquot rudices allatae sunt Ranunculi Constantinopolitani, & Tarobolos catamer nomine insignita.

Tarobolos catamer.

VERVM ex duabus plantis quas mihi reliquit fur domesticus & fugitiuus (qui meum hortulum, dum superiore anno absui, suo decore spoliauit) vna hoc anno 1582. quo mea historia descriptionē absoluo, binos flores Maio mense protulit, quorū alter vitium fecit, nec ad frugem peruenit: alter autem magna cum mea letitia sese explicauit, cuius historiam & iconem rei herbariae studiosis hoc loco communicandam esse censi.

II.

Ranunculus Byzantin. simpl. rubro flore.

ALIQVOT à radice producit folia unciam lata, duabus paruis laciniis diuisa, atque in ambitu serrata, oblongis pediculis nitentia, vicumq. densa & succulenta, glabra, aut quam minimè hirsuta, & venis ex viridi pallescentibus praedita, gustu initio subacido & ingrato, postea tamē acri & linguam vellicāte: foliū quod imum caulē amplectitur maius est ceteris, atq. in tres altiores laciniis diuiditur, quarū singula reliqua folia equant, atq. tribus minoribus laciniis ut illa diuisa sunt, & in ambitu serrata. Ex horū medio pedalis assurgit caulis, teres, viridis, quāadā tamē lanugine obsitus, quem per internalla bina aut terna ambiūt folia minora magisq. laciniata quā id quod imo cauli adharebat, summa sui parte amplius sustinēs florē, Pannonicū magnitudine quiddē superantē, at eiusdē quodāmodo formae, quinq. aut sex foliis



PINGVICULA, inquit, ut ficto à nobis nomine appellatur, florem caruleum ut viola maritima profert, inodorum: folia humida, mollia, lenia, absque nervo (ni fallor) ut lingulaca vel ophioglossus: nascitur in palustribus. Hec ille.

Lingulaca Plin.  
m.

Quid si verò Lingua vel Lingulaca Plinij sit, quam lib. 24. cap. 19. & lib. 25. cap. 11. circa fontes nasci tradit? Verum nos nihil hinc asserimus, sed inquirendi duntaxat causa hac scribimus. Nullum vulgare nomen à montanis pastoribus, neque à Viennensis agri incolis, quod intellexerim, obtinuit. Et haud scio an apud illos aliquo medico in usu sit.

Retulit mihi anno 1581. C.V. Pennaeus Londinensis medicus hanc plantulam tam quae flore caruleo est, quam quae albo, plerisque Anglia locis inueniri (ut ipsa experientia verum esse postea me docuit, quæ admodum capite 46. huius libri annotauimus) & à Borealibus, apud quos Primula veris rubro flore permixta crescit, Butterwort/ id est, butyri radicem à pinguedine butyro simili qua fissuras in vaccarum vberibus sanare solent, appellari: à Meridionalibus verò Anglis (apud quos etiam crescit) Whipt root vocari, quia oves interficit, si ob cibi penuriam illa vescantur.

## DE RANUNCULIS MONTANIS.

### CAP. I.

NASCUNTUR in utraque Pannonia Noriciq, parte varia Ranunculi genera, quae passim in aliis Prouinciis crescunt. Sed aliquot alia in harum prouinciarum altissimis ingis conspeximus, quae à reliquis herbaria rei Scriptoribus vix obseruata esse animaduerto. Itaque omnibus medica materia studiosis gratum me facturum existimaui, si eorum historiam illis etiam communicarem.

MULTA

MVLTA parva, rotunda & quasi circino circum-  
 scripta habet Prior folia, aliquot crenis divisa, & per  
 ambitum serrata, atro virore superne splendentia, cras-  
 sa, carnosaq; & gustu feruidissimo: ex horum medio flos  
 emicat quinque albis foliis constans, staminibus in medio  
 croceis, inodorus, qui pediculo tenui, singulari, vixque  
 dodrantem aequante innascitur: quo defluente succedit  
 capitulum quemadmodum in aliis ranunculis imma-  
 turo fragosimile, quod ex minuto semine simul congesto  
 constat. radix multis albicantibus fibris praeclata est.

Ranunculus  
 minimus flo.  
 albo.

Eius altera species est, cuius folia in tres profundas  
 lacinas divisa, eaq; denuo aliquoties incisa sunt: flos  
 amplior, & interdum quasi duplici foliorum ordine con-  
 stans: alioqui & colore, & florendi tempore superiori  
 par: radix etiam quemadmodum in illo superna parte  
 nonnihil extuberat, & fibris donata est.

Exit utraque species in summis Sneberg & vicina-  
 rum Alpium ingis confragoso solo, & fere in ipsis scopulo-  
 rum fissuris: Iunioq; interdum floret, nonnunquam se-  
 rius, statim post solutas istius nives: in hortis verò matu-  
 re admodum, & ante alios ranunculos Aprili.

ALTER quina aut sena promit folia, magna, viri-  
 dia, dura, Ranunculi foliis qui Trollius flos à nonnul-  
 lis vocatur, haud absimilia, nonnihil hirsuta, tribus circ-  
 nis ad umbilicum usque, deinde aliis minus profundis  
 divisa, sapore primum dulci, deinde nonnihil amaro, pe-  
 diculis firmis & crassis innitentia pedalis longitudinis:  
 caulem cubitalem, nudum, nullis ramis brachiatum, fir-  
 mum, hirsutum aliquantulum, intus cauum, qui in sum-  
 mo trina habet folia contigua, profunde laciniata, Ane-  
 mones fere modo, deinceps dividitur in quatuor aut  
 quinque oblongos pediculos, singulos unicum florem su-  
 stinentes album, quinque foliis satis magnis constantem,  
 multis

II.

Ranunculi al-  
 pin. albo flo-  
 re.



Ranunculi montani 1. species altera.







multis in medio staminibus luteis, utcumque odoratum: flore excusso, capitula apparent semine plano & magna onusta: radix veluti premorsa, & multis nigricantibus fibris prædita est.

Frequens est in Sneberg, Snealben, aliarumq; Alpium pratis: floretq; Iunio, semen maturitatem adipiscitur Augusto.

In celsioribus tamen earundem Alpium iugis nascitur multo humilior & hirsutior, pedalem altitudinem non excedens, flore paulo maiore, & qui Narcissi medio lutei florem æquare possit, atque odoratiore, foliis amarioribus & acrioribus, tametsi gustata, initio quandam dulcedinem præferant. Serius floret altero.

PROXIME hūc sequi debet pulcherrimus ille Ranunculus alpinus, cuius iconem & descriptionem D. Thoma Pennai liberalitate consequutus sum.

Quatuor autem, quinque vel sex à radice proferunt folia longis pediculis nitentia, in quinque, sex, vel aliquando septem præcipuas partes Ranunculi more diuisa, parte prona fere casia, supina verò ex nigro viridia: ex horum medio unicus caulis ab radice oritur, longitudine pedem æquans, nudus, folia in summo fere emittens oblonga, maxima ex parte in tres lacinias per extremum diuisa, è quorum medio pediculi tres, quatuor, quinque, interdum sex vel septem oriuntur, duos digitos transuersos longi, unico vel duobus foliolis subinde ornati, quorum singuli florem sustinent pulchrum, ex quinque foliis orbicularibus constantem, quæ inferius purpurascunt, superius iuxta latera ex albo purpurea sunt, reliqua parte albissima, multis luteis staminibus medium occupantibus, calycæque ex quinque foliolis herbaceis constante: semina ut in ranunculis compacta, ex nigro purpurea & mucronata, parum compressa, paulo

2.

Ranuncul. al-  
pin. Narcissi  
flore.

III.

Ranuncul.  
mont. purpu-  
rascens flore.



paulo quàm in aliis ranunculis maiora: radix in summo setosa, multipliciter diuisa, sæpius cruciata modo dissecta, & in multas fibras diuaticata. Tota verò planta pilosa est.

Crescit copiose in monte Iura, è regione urbis Geneuensis. Floret Junio & Iulio, semina Augusto matura.

FOLIA Quarto magna in quinque lacinias secta, viridia & per ambitum serrata, inferne dilutiora & splendentia, dura, neruosa, quæ præmorsa nullam manifestam acrimoniam, sed amarorem potius exerunt: caulis cubitalis, firmus, licet tenuis, laevis, nodosus aut geniculatus, in multas alas à medio ad summum sparsus: in quibus flores utique magni, secundo tamen minores, quinque foliis constantes, tenelli, toti lactei, aliquantulum odorati, staminibus in medio pallentibus, capituli rudimentum ambientibus, quod ex seminibus aliis ranunculis fere similibus simul congestis constat: radix præmorsa videtur quemadmodum secundi, multasq; longas & candicantes fibras habet.

Prouenit copiose in aspersu Wechsel, Sneberg, aliorumq; vicinorum montium locis siluosis. Floret cum Secundo: sed in cultis Maio, semen verò maturescit Iunio.

Isdem quoque locis inuenitur Ranunculus ille albo flore, quæ Clariss. Dodonæus libro de Deleteriiis & Perniciosis descripsit. Sed ab isto differt: etenim humilior est, folia habet læuiora, & nonnihil attriora, flores rariores & minores, in obliquum nascentibus pediculis inhaerentes: maturius etiam floret.

Huic congenerem flore pleno nunc, ut alebatur, à Mag<sup>o</sup> D. Ioanne vander Dilft amico mihi obseruando, qui illius iconem è Belgica usq; mihi huc misit, nusquam in istis iugis obseruare potui. Arbitror illi natam fuisse

IIII.

Ranuncul. alpin. maior albo flo.

Ranunculus flore polyphyllo albo.



fuisse ex iis plātis, quæ paulo ante quàm à Cesare Maximiliano II. huc accersitus, è Belgica discederem, Illi viro D. Joanni de Brancion eius consanguineo ex Burgundicis alpibus misse fuerant. Eius deinde planta à C. V. Ioachimo Camerario mihi communicata est.

QVINTVS, omnium quos unquam viderim maximus, multa admodum ampla & densa habet folia, ficulneis haud minora, quinque profundis incisuris diuisa, per ambitum nihilominus serrata, colore dilutius vi-  
rente splendentia, subhirsuta, acria admodum & linguam vellicantia: cubitales caules, digiti crassitie, firmos, hirsutos, superiore parte in aliquot ramos diuisos: qui multos flores sustinent quinque foliis constantes reliquorum ranuncolorum modo, & luteo auri splendore fulgentes: semen reliquis vulgaribus simile, in capitula congestum: radicum loco multas candicantes fibras habet.

Ranunculus  
platyphyllos  
fl. luteo.

Crescit in nemoribus & umbrosis locis atq; decli-  
vibus omnium istarum alpium iuxta riuulos è lique-  
cente niue profluente: in nonnullis item umbrosis pratis ad  
Viennensem saltum, & ultra Drauum. In hortis &  
pratis Maio floret: in Alpibus verò Iunio aut ferius.

IOSIAS Simlerius cōmentario de Alpibus Prioris meminisse videtur, quem ab Helueticarum alpium accolis Fegetkraut, hoc est, Venatorum herbam appellari scribit: Montani isti pastores & venatores, fieberekraut vocant, & ad febres pellendas (unde nomen) contusis foliis carpo admotis vtuntur. Secundo & Quarto venatores Abbeiss, et Teuffel abbeiss, id est, Pramorse & Diaboli morsus nomen indiderunt. Quintus nullam peculiarem appellationem quod intellexerim habet: non incommode tamen meo iudicio πλατύφυλλος à foliorum amplitudine cognominabitur. Vngari Ranunculum in genere Beka sive vocant.

Trollius Bos.

- PORRO *Ranunculi* illius quem *Gesnerus* in descriptione *Montis fracti* *Trollium* florem vulgo dici scribit, quiq<sup>3</sup> quintus inter externos est *Dodonao* lib. 4. de *Deleterius & perniciosis herbis*, flore in globum collecto,
1. duo in istarum alpium pratis observavi genera: maius
  2. unum, ampliore flore & aureo: alterum minus, flore paulo minore & colore quasi ex viridi pallecente, foliorū alioqui forma, capitulis, semineq<sup>3</sup> nigro & radicibus inter se conveniunt. Eum etiam superiore anno in *Anglia* inter *primulas* flore rubro erutum vidi.

*Ranunculi* lync.

Eius *Ranunculi* quem vulgo *Illyricum* cognomināt, quemq<sup>3</sup> primus in *Hamburgensi* monte sponte nascentem deprehendi anno 1574. *historiam* lib. 2. *Rariorum stirp.* a me per *Hispanias* observatarum dedi.

*Thora* *Valdensium*.

ETIAM inter *Ranunculi* genera referenda videtur ea planta, quæ apud rei herbaria studiosos *Thora* *Valdensium* nomen obtinuit, & à Doctiss. *Gesnero* plerisque locis *Aconitum* primum *Dioscoridis* esse censetur: de quo peculiaris *Asseneratio* post ipsius epistolas opera *Casparis Wolfij* editas, inserta est, ubi *Plinij Cyclaminum* tertiam lib. 25. cap. 9. & *Limeum* eiusdem lib. 27. cap. 11. descripta, esse contendit.

Illum etiam anno 1578. observavimus in *Etcheri* summi iugi precipitibus atque scopulis tenui terra coopertis, ad meridiem obuersis mense *Augusto*: atque paulo post in alio iugo *Sneberg* vicino frequentiore & uberiore. Folio tamen breviorē esse quàm *Valdensium Thora*, siue illius quæ ex monte *Baldo* eruitur, superna etiam parte magis inciso & latiore deprehendi. Huius præterea flos quinis foliis constat, cum illorum quaternis duntaxat foliis exprimatur. cetera satis conveniunt.

DE RA-

## DE RANUNCULO BYZANTINO

sive Asiatico. CAP. LI.

QUONIAM de Ranunculis iam egimus, non incommode in hunc locum renocari posse existimo elegantis illius et verè rari Ranunculi cuius in Appendice ad Hispanicas observationes memini, historiam: quoniam post aliquot tandem annos Constantinopoli planta missa est illius quidem nomine insignita, sed quam ab ipso nonnihil differre experientia nos docuit, ut ex eius historia cuilibet patebit.

PEDALEM igitur ille, quemadmodum diximus, habet caulem, in duos aut plures ramos divisum, quorum extremitatibus insident flores magni, multiplicique foliorum glomeratione constantes (ut in Ranunculo vulgari tuberoso flore multiplici) sed pulcherrimo cocci colore rubentes: folia circa radicem quina aut sena diluto virore nitentia, media forma inter palustris & echinati Ranunculorum folia: qua verò per caulem sparsa sunt, minora, nec adeo incisa, nec admodum frequentia: multa illi radices simul congesta, Lusitanici Ranunculi radicibus persimiles, asphodeliformes, flavescentes.

Ranuncul. polyphyll. flore coccineo.

Hanc descriptionem concinnari non ex viva planta, sed ex icone vivis coloribus expressa, quā generosus Dn. Carolus Rym Dn. de Eeckebeke defuncto quinquennali Cæsarei Legati apud Turcarum Imperatorem munere Constantinopoli rediens mihi liberalissimè communicavit.

RANUNCULI autē Constantinopolitani sive Byzantini cognomen illi dedi, quòd quibusdam hortis Byzantio vicinis & in eius Urbis conspectu, ultra tamen Bosphorum sitis inueniri intellexissem; qua fortè ratione Asiaticum vocare præstaret.

Huius iconem tamen si ego & alij aliquot Constanti-







foliis constantem qui foris phœnicei sunt coloris, interius  
 verò miniati elegatis & splēdentis, mediū florē occupan-  
 tibus plurimis crassiusculis staminib. initio pullis, deinde  
 cinereis, pediculo tamē tenui & rubro nūctibus, extube-  
 rante intermedia stamina capitulo purpure nigra villis  
 obfita, quod in semuncialem tandem longitudinem ex-  
 crescit, & seminis frequentis rudimento obfitū est, quod  
 an fertile futurum sit, subsequēs mensis docebit: flos pla-  
 nē inodorus est, multas habet radículas ex uno capite  
 dependentes breves & crassiusculas, à Lusitanici ra-  
 nunculi, siue Pannonici (qui Illyrici cognomen vulgo  
 adeptus est) radiculis non multum differentes, extrema  
 tamen parte non obtusas, sed singulas in tenuem fibrā  
 paulatim definētes, solidas, colore exteriori fusco, interiori  
 albo, gustu initio ingrato, deinde acri. Porro cum Pāno-  
 nico tuberoso ranunculo illud fere cōmune habet, ut sub  
 caule inter medias radices veluti crassiusculus ramulus  
 enascatur, qui in latus per radicū interstitiū se porrigēs,  
 in novū caput extuberet, unde multa alie radices paulo  
 superioribus minores dependunt, è quarum medio caulis  
 exilit, sub quo deinde altius similiter ramulus prodit, in  
 obliquū uti superior per radicū spacia se spargēs, & no-  
 vā radicularum congeriem generans : qua sanē ratio-  
 ne satīs feliciter se propagat: sed et albas quasdam fibras  
 habet per crassiorum rad: cum spacia sese explicantes &  
 spargentes.

Tarobolos catamer, ut dixi, nomine, vel Tarobo-  
 los catameralé (quod Tripolitanum plenum florem  
 significat) missa est Byzantio hac planta: sed hac etiam  
 appellatione superiore autumno nonnulli ex amicis semen  
 inde acceperunt, quod mihi communicatum, nono elapso  
 Vere terra credidi. Verū non ranunculus, uti spera-  
 bam, sed legitima Vrtica, siue Romana nuncupata ena-  
 ta est.

Tarobolos ca-  
tameralé.

## DE RANVNCULO Thalictri folio.

## CAP. LII.

AD quam potissimum classem hanc herbã referrem, diu mecum deliberavi, & adhuc dubito Ranunculinẽ an Thalictri vulgo existimati generibus adscribere debeat: etenim aliquot notas cum utrisque convenientes habet. Eius verò descriptionem minime negligere volui, quoniam elegans est planta, & à nemine, quod sciam, adhuc observata: liberum cuique relinquens nomen illi pro arbitrio imponendi, & in quam velit classem referendi.

Ranunculi  
Thalictri folio  
historia.

PEDALI assurgit altitudine, gracili caule, ex viridi rubescente, in quo terna, quaterna, aut quina folia, maioris Thalictri flore albo foliis forma & colore admodum similia, sed minora & teneriora, gustu amaro: flosculi in singulis alarũ sinubus singulares, candidi, quinque foliolis constantes, suis pediculis innitẽtes: quibus decidetibus semẽ succedit, in duobus aut tribus corniculis, rotundum, subruffum, Acoliti hiemalis semẽ referens: è radice exeunt bina aut terna folia, singularibus dodrantalibusq; pediculis, eiusdem cum caule coloris, innitentia: radix verò impense amara est, multis albis fibris hirsuta, ex quarum capite alia propagatur radícula nodosa, subinde ad singula internodia novas fibras agens, & repens, ideoq; perennis. Verum primaria duntaxat radix à pictore expressa est, reliquis omiſſis.

Copiose nascitur in saltu Leytenberg vicino Manderstorf ultra Leytam flumen, quinto ab urbe Viennamiliari, & quibusdam aliis umbrosis silvis Viennensi agro: inveni etiam apud Zollonock Ill. Herois Dn. Balthasaris de Batthyán oppidum. Floret Aprili: semen Maio, nonnunquam Iunio matureſcit.

SED



Thalietri va-  
ri genera.

- SED quoniam in Thalietri mentionem incidimus: proueniunt in harum Prouinciæ prætis, siluis, & montanis, varia eius genera, omnia videlicet ea quæ in Belgicis hortis aluntur, præter Hispanicum, quod etiam his prouinciis mea opera vulgare factum est. Eius autem folia, licet in modum aliorum diuisa & incisa, Aquilina seu Aquilegia foliis adeo respondent, ut ab imperitis planta discerni nequeant, ante quam caules in flores abeant: flores verò muscosi ut reliquorum, sed coloris lutei sunt. Tria genera montana foliis inter se conueniunt: sed unum altius excrescit, floreque candido est, ad modum grauis odoris: alterum paulo humilius, flore etiam albo, minus tamen ingrati odoris, à quo tertium differt solo floris colore qui purpurascit. Pratensis duo foliis sunt longioribus & atrioribus, & quodammodo splendens: alterum pallido colore floris, elatius: alterum candicante & humilius. Septimum omnium minimum foliis minoribus, cinerei coloris. Omnium radices flauæ sunt, & serpunt, subinde noua germina producentes: sed minoris omnium maximè.

## DE ANEMONE SILVESTRI

### CAP. LIII.

RANUNCULOS proximè sequi debere Anemone videtur, propter formam & facultatum cognationem. Eius verò cum ab aliis, tum à me varia genera descripta sunt. Non inutilem tamen rem me facturum existimauimus, si siluestris duas species, ab aliis licet obseruatas, paulo diligentius describerem, quoniam in his prouinciis sæpius à me sunt eruta, & illarum semina collecta.

- I. PRIMÆ ex una radice multa germinant folia, Ranunculi cuiusdam palustris foliis fere similia, tribus usque ad umbilicum incisuris, deinde aliis minoribus laciniata,

Anemone sil-  
uestris Ra-  
nunculi folio.



laciniata, viridia, mollia, & hirsuta, gustu primum ingrato, deinde nonnihil acri: caulis palmaris, interdum etiam pedalis, nudus, satis crassus, cādida lanugine pubescens, tria alia folia sustinēs prioribus fere similia, sed minora: ē quorum medio flos exilit oblongiore pediculo insidens, unicus (rarissimē bini) primum, ante quā aperiat, lanuginosus, deinde ubi expāsus est, parte interiore lauis, colore lacteo, quinq. foliis maxima ex parte cōstans, Pulsatilla paulo minoribus, cuspidē orbiculata, in cuius medio capitulū rotundum extuberat multis croceis staminibus cinctū, quod tandē resoluitur in exiguum semen, planum, alba quadam lanugine inuolutum, quemadmodum in ea Anemone latifolia secunda, cuius historiam lib. 2. Rerū stirpiū Hispanicarū dedi: radix ex vno capite multas nigricantes & capillares fibras spargit, nonnullas etiam crassiores, quæ serpentes, subinde nouas ex lateribus plantas procreant: est verò ingrato & acri sapore.

Vicinis vrbi Viennæ pratis, & plerisque montanis vtriusque Pannoniæ locis, atque etiam inter amnis ultra Drauum nascitur. Floret Maio: in hortis etiam Aprili: semen Iunio facili mē vento excutitur, nisi quis maturē colligat.

11. SECUNDA ex villosō summoq; radicis capite multa fundit folia, quemadmodum id Anemones siluestris genus, quod vulgus Pulsatillam appellat, illius foliis quod dilutiore praeocioreq; flore prae ditum est, fere similia, latiora tamen, & in tres foliorum alas diuisa, supina parte viridia & lenia, prona autem paulo candidiora & villosa, sapore ingrato & acri admodū: inter quæ caulis emergit palmaris, firmus, hirsutus, quem circa summum terna ut in Anemones generibus coniunctim amplectuntur folia, laciniata, & multis diuisuris





nisuris secta: flos in summo caule sex foliis constat intus lacteis, foris nonnihil interdum purpurascentibus & villosis, minor quam in pulsatilla, sed non paucioribus, quam illius flos, luteis staminulis scatens, qua tandem in plumati seminis congeriem, quemadmodum in pulsatillis, transeunt: radix oblonga, minimi digiti crassitudine, paucis fibris praedita, foris nigro cortice tecta.

Crescit hac in celsioribus Etscher & Durrenstein iugis, inter scopulos, tenui & leui terra tectos: plerumque verò inter scopulorum fissuras, et commissuras adeò altè radices agit, ut summa difficultate, & vix unquam, nisi anulsis scopulorum fragmentis, integras mihi eruere licuerit. Floret autem istic Iulio, interdum etiam Augusto, pro ætatis maturius aut serius incipientis natura, solutis videlicet niuib: nam ex primis floribus est: semen maturum est plerumque sub Augusti finem. Difficulter autem cicurari vult, & mitiorem aërem ferre potest, quemadmodum & pleraque alia elegantes stirpes in summis istarum Alpium iugis nata, quas aliquoties frustra in hortis conservare studuimus, tametsi omnem curam & diligentiam adhibuerimus.

Anemone L.  
Matthioli.

ANEMONES tertia nomine Priorem exhibere videtur Matthiolus, iconem tamen negligentius expressit pictor. Alterius iconem Lobelius reddit in Plantarum historia. Vtraque autem Belgicorum hortorum inquilina mea opera facta est, missis hinc ad Dn. Brancionem & Dn. Ioannem Dilsam plantis & seminibus. Est verò posterior sine dubio Anemones siluestris siue Pulsatilla species, & Pulsatilla alpina flore niuco appellari potest.

Eius etiam meminit Gesnerus in descriptione Montis fracti libello De Lunariis herbis in hunc modum. Anemone quadam alpina, radice nigra, capitulo seminis  
birsuto,

hirsuto, & lanugine instar vitis siluestris caustica referto, Pulsatilla, quam Itali vocant, cognata. Pastores aliqui Bitzwurtz appellant, quod cataplasmatibus instar venenatis morsibus imposita, pecori salutaris sit.

CETERVM Pulsatilla vulgaris passim hic inueniuntur duo genera: unum praecocius crassiore folio, flore ampliore & dilutior, quod ab Ungaris lo kewkewrchin, id est, equina Pulsatilla dicitur: alterum non adeo praecox, folio minutius inciso, floreque minore & saturatius purpurascens, quod Ungari lean kewkewrchin, hoc est Virginis Pulsatillam appellant. Inuenitur hac posterior interdum flore omnino niueo. Vtraque autem flores primo Vere.

Pulsatilla vulgaris.

dilutior

• saturation.

albo flore.

VULGARES sunt in Pannonia & Austria silues illa stirpes multis aliis Provinciis communes, quae inter siluestres Anemones proculdubio recensenda sunt, & à nonnullis silvarum Ranunculi nuncupantur, foliis prope modum Anemones tenuifolia flore caruleo.

Eae autem primo ineunte Vere florere solent, floremque habent aut omnino niueum, aut purpurascens, aut cui in candore leuiter aspersa sit dilutior purpura, vel carneus color, aut totum luteum, atque is plerumque aliis minor est & praecocior.

Anemone siluestris vulgaris varij generis.

De ANEMONE flore polyphylo & pleno.

#### CAP. LIIII.

SED longè omnium elegantissima sunt duo illa Anemones genera, quae singulis fere annis, ab eo quo huc concessi tempore, Constantinopoli perferuntur. Quorum historiam licet in Appendice ad Hispanicas observationes dederim, eam tamen huc reuocare libuit, quod

b

non-





nōnulla poſtea de his ſtirpibus obſeruauerimus, qua mi-  
nimè tunc mihi fuère cognita: deinde quòd hinc primum  
mea opera Belgicæ prouincia magna ex parte commu-  
nes ſint facta.

**I.**  
Anemonela-  
tifolia poly-  
phylo flore.

**PRIOR** igitur multa ex una radice promit folia,  
latifolia prima mihi in Hiſpanic. obſeruat. deſcripta fo-  
liis initio ſimilia, deinde alterius latifolia flore purpu-  
reo, aut Sanicula foliorum quodammodo emula, dura,  
neruoſa, in tres lacinias altius diuiſa, ac inſuper per am-  
bitum ſerrata, ſupina parte nigricantia, prona candi-  
diora, ſeruidiſſimo ſapore, & ſi guſtentur, illico linguam  
vrente, ante hiemem etiam germinantia, quemadmo-  
dum in nonnullis aliis Anemones generibus. Nouo iam  
vere unus aut alter caulis inter folia prodit palmaris,  
nonnunquam etiam pedalis, nudus, ſubhirſutus, qui cir-  
ca cacumen tria exigua folia minimè, aut quam rariſ-  
ſimè laciniata ab eodem ſere exortu prodeuntia, & ſi-  
mul caulem amplectentia proferit, deinde in ſummo bi-  
nas uncias ſupra iam dicta foliola, magnum ac latè ex-  
panſum florem, numeroſis foliis conſtantem, quorum ex-  
terna & maiora dena & duodena colore viridi prædita  
ſunt, mucronibus eorum purpura leuiter & virgatim  
inſectis, interna verò minora & anguſtiora, dilutiore  
purpura ex rubronitent, & quæ medium florem occu-  
pant, ad umbilicum reflexa & glomerata euſdè etiam  
ſunt coloris. Radix crassa, & in aliquot capita extube-  
rans Anemones latifolia purpureo flore in modum, foris  
nigra & ſcabra eſt, intus alba & ſolida, guſtu ingrato  
& fauces corſtante, multis tenuibus fibris capillata.

**II.**  
Anemone te-  
nuifolia flore  
polyphylo.

**ALTERIVS** folia numero quina, ſena, aut plura  
ſunt, multiſida, & Oenāthes prima, ſine Bulbocaſtani  
ſere foliorum inſtar, in multas tennes lacinias diuiſa, di-  
lutius quàm ſuperioris virentia: caulis etiam pedalis,

priori



priori similis, sed minus crassus, quem item circa summum tria tenuius incisa ambiunt folia, florem etiā (quē admodum in omnibus *Anemones* generibus) ante quā aperiatur, occultentia, qui summo cauli supra minora illa folia, ad binas uncias succrescenti insidens, in dena aut plura hirsuta longaque, latiuscula, & maiuscula folia explicatur cocci modo rubentia, quæ numerosa tenuiaq; foliola colore coccineo saturatiore nitentia amplectuntur. Radix non multum à superiore discrepat, paulo oblongior interdum, & licet foris nigricans, nitidior tamen est, & tenuibus capillamentis fibrata, intus etiam candida, & eiusdem cum superiore gustus: Tenuior hæc est radix prior, & facilius corrumpitur. Vtraque etiam temporis diuturnitate quemadmodum latifolia flore purpureo cariosa fit; & nisi interdum alternis videlicet ad minimum annis, in fragmenta rumpatur, atque ea ratione pangatur, prorsus plerumq; perire solet.

Vtraque Vere cum aliis *Anemones* generibus floret, aut paulo serius interdum. Sed prior apud nos rarissime, cuius per id octennium quo Vienna vixi, semel duntaxat florem conspicere licuit: anno sanè 1581. Cassellis in cultissimo horto Ill<sup>mi</sup> Principis Wilhelmi Landgraviæ Hassiæ &c. utraque maximum & amenissimū florem protulit, quem suis coloribus ipsius iussu expressum, dum apud ipsius Celsitudinem superiore Octobri essem, mihi conspiciendum præbuit.

Tenuifolia sanè in proferendo flore liberalior esse solet, nec ut altera vitium facit, aut certè rarissime. Illa autem interdum florem tam amplum mihi præbuit, qui Germanicum tallerum fere magnitudine aquaret, & ternos aut quaternos crassitie, hoc est duas fere uncias latum, et unam densum. In neutra autem semen hætenus observavi, & an seminifera sint, plurimum dubito.

NOBIS

NOBIS primum eas comunicarunt Constantinopoli quidem usque missas Ill. Dn. David Vngnad Casareus apud Turcarum Imperatorem orator et Liber Baro in Sonneck: atque Constantinopoli redeuntes Generosus Dn. Carolus Rym Casaris Consiliarius, et usque affinis Dn. Philibertus de Bruxella p.m. Tenuifolia vero alia quot annis Constantinopoli etiam delatam acceperat Ill. Dn. de Brancion p. m. amicus mihi fratris loco semper habendus. Deinde, ut dixi, singulis fere annis eodem Byzantio utraque Viennam missa fuit, cum Generosis viris, tum Nobilibus matronis, quibus exotica stirpes & elegantes flores nunc sunt in deliciis, modò Giul vel Gul catamer appellatione, qua, ut iam antè retulimus, roseos propemodum omnes flores & multiplici foliorum textura constantes exprimunt: at Tenuifoliam plerumque Lalé benzedé & Galipoli lalé proprio nomine vocant.

Giul catamer.

lale benzedé  
Galipoli lalé.

Quod autem Anemones aliquod genus ad Adonidis florem Ouidio lib. 10. Metamorph. descriptum referendum est, nullum hætenus conspiciere memini, quod eius descriptioni proximius accedat, quàm quod secundo loco hic exhibemus: etenim sanguini còcolorem habet florem, siue prematuri mali prunici, cuius præsertim quod dulce seu vinosum est, succo similem.

Adonidis Ros

PORRO superiore Autumno Constantinopoli accepit Generosa Dn. de Heyfenslein cum Cyclamino illo antè memorato, quem verno tempore florentem esse non dubito, aliisq; multis exoticis plantis aliquot Anemones radices, quas mihi retulit fuisse integras adhuc, & minimè rugosas, planeq; Anemones tenuifolia flore polyphyllis similes; quas qui mittebat, adscribebat florè habere etiam polyphyllum, sed coloris carulei: illa terre conc redita, folia adhuc ante hiemem produxerunt tenuifolia

Anemone tenuifolia flo.  
polyphyllæ  
carul.



nuifolia qua flore pleno coccineo est omnino similia, & multifida, præter colorem qui in hac vegetior & saturatius virens mihi esse videtur quàm in coccinea: Binifante nomine missa est.

Accepit etiam (quam tamen Constantinopoli prius missam non memini) Anemonem latifolia secunda flore purpureo, à me in Hispanicis observat. descripta omninoparem. An verò similem florem dabit, proximum ver nos docebit, quemadmodum, & an superior ceruleum proferet.

Anemone latifolia Byzantina simp. flo.

ALTERAM porrò latifoliam Anemonem qua anno 1581. Autumno, ut dixi, ἀνώνυμος Byzantio allata fuit, initio dum folia è terra prodeuntia conspicerem, similem illi esse existimaui, qua in Belgicis hortis latifolia flore purpureo 12. aut pluribus foliis constante alitur. Sed flos subsequēte Aprili, & hoc anno 1583. cum reliquis sese explicans, diversam esse, illiusque duo diversa inueniri genera me edocuit. Vtriusque igitur historiam subiicere hîc libuit.

Anem. latifo. carneo flore.

I. ALIQVOT autem Primum genus etiam ante hiemem folia profert Latifolia flore purpureo apud Belgas nascentis foliis fere similia, aut certè non magnopere ab eis differentia: inter qua caulis, ut in illa, exoritur palmaris, nudus, lanugine pubescens, tribus foliis minimè, aut quam leuissimè incis, tamquam inuolucro florem primum (quod in Anemones generibus vulgare est) occultentibus preditus, qui tandem ad binas uncias, siue binos pollices supra illa folia excrescens, in octona aut plura folia vulgaris latifolia floris foliis paulo latiora expanditur, elegantissimo rubro, dilutiore tamen & ad carneum quodammodo tendente colore interius nitētia, albicantibus vnguibus, foris autem obsoletè rubescentia & lanugine pubescentia, multis in umbilico violaceis stami-

staminulis hirsutum capitulum ambientibus: radix tuberosa & nodosa est, foris nigricans, intus candida, Latifolia belgica similis, & tenuibus aliquot fibris donata.

SVPERIORI respondet Alterum genus cum foliorum forma & colore, tum caulis lanuginosi crassitie & altitudine, atque etiam radice nigra & nodosa: at illius flos octonis latiusculis foliis constans (quorum ungues ex parte flavescent atque ex parte rubent, tandem etiam maiores fiunt et exalbidi) longè elegantissimo coccineo colore interius nitet, foris autem quadam lanugine pubescit, plurimis in umbilico nigricantibus staminulis hirsutum capitulum cingentibus, quod an in semen abeat, nondum observare potui.

QVAM verò foliis tenuifolia polyphylo flore fere similem esse dixi Binizate & Binizade, vel Binizante nomine missam: ea non ceruleum plenum florem, ut adscriptum fuerat, protulit; sed diuersum omnino, eumq; colore in diuersis plantis variantem.

PRIOR multa ante hiemem promit folia, Bulbo castani, aut Anemones tenuifolia polyphylo flore foliis quodammodo similia, paulo tamen atriora, & multifida, inter quæ caules exeunt terni aut quaterni, singulares, pedales, firmi, purpurascens atque lanugine pubescentes, tribus foliis valde dissectis & laciniatis ut in Anemone tenuifolia pleno flore, tanquam inuolucro florem initio occultantibus pradi, qui deinde, ut in Polyphylla, aut quæ purpureo siue violaceo est flore, ad dodrantalem longitudinem supra ea folia succrescentes, unicum singuli sustinent florem, magnum, illi qui violaceus est aequalem, simplici sex foliorum textura constantem, quæ elegantissimo coccineo colore, ut in eo qui polyphyllus est, interius nitent, forisq; lanugine etiam pubescunt, exalbidis, ubi senescunt, foliorum vnguibus,

II.

Anem latifol.  
coccineo flo-  
te.

Anemonete-  
nuifolia Sy-  
zantina simp.  
flo.

I.

Anem tenui-  
fol. coccineo  
flore.



& multis purpurascensibus siue violaceis staminulis medium capitulum ambientibus: radix nodosa, tuberosa, polyphylo flore *Anemones* radici similis.

RADICE atque foliis Altera huic respondet, licet II.  
folia paulo crassiora & magis succulenta videantur, at- Anem. tenui.  
que auersa parte splendeant: inter qua caulis nascitur fol. carneo  
palmaris, tenuis, firmus, lanuginosus, terna etiam folia flore.  
florem initio obuoluentia, sed superioris ternis foliis mi-  
nora, minusque laciniata obtinens, è quorum umbilico  
excrescit pediculus, uncialis, aut paulo longior florem  
sustinens, magnitudine inferiorem superiore, seu tamen  
ut ille foliis latioribus constantem, colore primum exal-  
bido, deinde nonnihil ad carneum tendente, multis in  
umbilico staminulis carnei coloris nigros apices susti-  
nentibus, & hirsutum capitulum cingentibus.

Omnes Aprili flores inodoros proferunt: easq; in cul-  
tissimo Mag<sup>r</sup> Dn. de Heysenstain horto, annis 1582.  
& 1583. primum florentes non sine voluptate cōspexi.

DE HACHAL Indi, siue Admirabili Peruana.

CAP. LV.

QUANQUAM huius stirpis descriptionem & ico-  
nem in Notis ad Aromaticum Garciae historiam supe-  
riore anno exhibuerim: attamen cum illa mihi & ple-  
risq; aliis superiore æstate Vienna elegantissime florue-  
rit, opera precium me facturum existimaui, si qua cir-  
ca eam postea obseruaui, & ab aliis obseruata intelle-  
xi, omnibus rei herbarie studiosis patefacerem, & illius  
historiam retextam ad calcem Lib. I. I. Pannonica-  
rum mearum Observationum adicerem.

PRIMUM igitur emergit Ocymi quod Cercale non- I.  
nulli cognominant, aut Circea Lutetiana fere modo, Hachal indi  
deinde caulem promit cubitalem, interdum etiam bicu- historia.  
bitalem

bitalem aut ampliorem, pollicari crassitudine, succulentum, firmum, ex viridi flavescentem, frequenter, uti Balsamina femina, geniculatum, & infrequentes ramos eisdemque similiter nodosos diuisum, qui ex ipsis procedunt, non bini utrinque & ex aduerso oppositi, sed singulares duntaxat, alternatim modo in unam, modo in alteram partem vergētes, & quem primum seruarunt ordinem aut seriem, perpetuò deinde retinentes, hoc est, ut tertius, quintus, & septimus ramus in eandem partem spectent quam primus, quartus verò, sextus & octauus (si modo tot primariis ramis planta sit praedita) eodem latere nascantur quò secundus: folia in singulorum ramorum geniculis bina ex aduerso semper nascentia, Siliquastri fere foliis similia, viridia, satis carnosae & succulenta, circa basim ampla, per extremum mucronata, quae trita Siliquastri grauem odorem, gustata verò ingratum saporem, et tandem illius vel foliorum Tabaci etiam acrimoniam propemodum referunt: flores in extremorum ramulorum alis singuli, oblongi, concaui, in quinque sinus ante quam aperiuntur complicati, at ubi explicati sunt Tabaci floribus fere similes, nequaquam tamen in mucronatos angulos, ut illi, desinentes, sed in obtusos quemadmodum Conuolnoli flores, Tabaci floribus etiam ampliores, elegantissima interdum purpura siue kermesino colore nitentes, nonnunquam latericei, aliquando flauis aut pallentes, interdum obsoletè rubentes aut flavescentes, nonnunquam etiam exalbidi, & saepissime binis coloribus simul elucescentibus, vel purpureo mediam floris partem occupante, vel virgatum totum florē intercurrente, vel radiis alternis modo flauis, modo purpureis totum distinguētibz, aut interdum magnis nonnunquam exiguis purpurantibus maculis vario suu & mixtura toto flore vel flavescente, pallecente uel

teve aut exalbescente, aut obsoleto aspersis, odoris suavis & Narcissinum quiddam referentis, sex oblongis staminulis, stiloque paulo longiore è medio flore emergentibus: caduci verò admodum sunt flores, nam nocte explicantur, & postridie sub horam octavam ante meridianam, per astus præsertim, sese contrahere incipiunt florum convolvuli modo: ac temperatiore aura integro nonnunquam die expansi permanent, & sub nocte duntaxat contrahuntur: ephemeri nihilominus cum sint, nec ultra diem perdurent, singulis tamen diebus recentes explicantur, qui cum pridie decerptis atque inter chartas repositis collati, iisdem quidem coloribus constare quibus illi deprehenduntur; ac eorundem situ & mixtione ab iis variare quisquis diligenter observauerit animadvertet: tertio item die & reliquis subsequenter similitur. Quæ sanè insignis varietas quotquot istum florem observant, in summam admirationem non immerito rapere debet: etenim diutissime viret, & ab Iulio ad Octobrem usque mensem, primasque pruinas numerosa florum sobole luxuriare solet. calyculi flores amplectentes in quinque mucronatas lacinijs sunt divisi, virides, & quasi membranei, in quibus unicum semen nulla membrana siue pericarpio inclusum, mucrone, cui flos insedit, obtuso, infima verò qua calyculo adhaeret parte, tamquam exigua corona ornatum, pentagonum, baccæ myrtifere magnitudine, initio viride, deinde ubi maturuit, fuscum, & quibusdam veluti tuberculis obsitum, spote, vel lenissima agitatione excedens, nucleumque continens album, qui tritus in candidissimam & amyli instar niueam friabilemque pulpam resolvitur: radix satis crassa, & pæcarōns, foris nigra, intus alba, aliquot fibris prædita, gustu nonnihil acri, cui admixta sit superficialis quadam dulcedo. Eam licet hætenus annuam censuerimus, vi-

nacem tamen esse ab optimo & peritissimo viro Sebastiano Volmaro Ill<sup>mo</sup> Ducis Wirtembergici pharmacopœo et horti præfecto, superiore Augusto candidè sumus admoniti. Is enim cum superiore anno sub Autumni exitum aliquot plantas eruisset, & caule præciso ex illis vnâ propter formæ elegantiam exsiccandam seruasset, initio autem Martij cuidam amico ostendere vellet, eam succulentam & quasi reuirescentem deprehendit, terra igitur in fictili ab ipso obruta, paucos post dies folia proferre cœpit, atque circiter Cal. Iulij subsequēntis etiam flores. Cuius rei, Deo volente, nos quoque hoc anno periculum faciemus.

Admirabilis  
vnicoloru-  
braque.

- II. ALIUD autem genus habuimus, quod licet à superiore caulis magnitudine & crassitie, ramorumq<sub>3</sub> situ, & foliorum florumq<sub>3</sub> forma non differat, caulis tamen atque etiam florum color dissimilis est: etenim dum primum terra emergit, cauliculi foliorumq<sub>3</sub>, pediculi, uti beta rubra iam recens nascentis purpurasunt, manetq<sub>3</sub> is color in adulta etiã caule & ramis, flores verò ex rubente & elegantissima purpura infecti sunt, sex etiam tenuia stamina longioremq<sub>3</sub> stilum cōtinentes, eiusdemq<sub>3</sub> cum superiore odoris. Hi verò non mutantur, sed vnius perpetuò sunt coloris, & quem primi habuerunt, reliqui deinceps retinent. semina item in singulis calyculis singularia, superioribus respondentia, paulo tamen minor: radix non dissimilis.

Hoc genus è superioris semine cui rubri flores insederunt, originē trahere arbitror: seorsim proximè sequente anno, si Deus vitam concesserit, utrinque generis semina terra mandabo, ut diligentius istam varietatem obseruare queam.

Admirabilis  
tertia Iasmin  
rosso.

- III. TERTIUM porro genus superiore Vere ex Italia allatum fuit Iasmin rosso, hoc est, Iasmini rubri nomine. Bre-

ne. Breuiore crassioreq; id constabat semine, non minus tamen quàm superius anguloso tuberculisq; obsito. Quo terra commissio nata sunt nobis planta, in fictilibus quidem pusilla & humiles, latè nihilominus ramos fundentes: in horto autem superioribus generibus longè ampliores, & latissimè ramos spargentes, qui eadem serie quæ in superioribus alternatim nascuntur, eundemq; ordinem seruantes alternis in idem latus semper vergunt & spectant, ipsi similiter cum suo caule succulenti admodum, & frequentibus nodis geniculisq; cincti, atque purpurascetes magna ex parte: folia in hoc genere atriora, magis splendentia, atque etiam interdum maiora, altera parte magis prominula, & inferius suum exortum in nervo habentia; similis tamen cum superioribus & odoris & saporis: flores aliis forma pares, eodemq; modo ex postremarum alarum sinubus nascentes, oblongiores tamen, tenuiores, & colore dilutius rubente, minusq; extrema parte ampli, sex similiter staminula cum stilo in medistulio continentes, suauemq; odorem spirantes.

Serotina admodum nobis fuit hac planta, nec ante Septembris finè flores explicare cepit, qua de causa minimè ad frugem peruenire potuit. Mihi tamen adhuc in horto cum utroque altero genere nunc Cal. Nouembr. viret: at flores caloris Solis inopia haud quaquam explicantur, licet noctu tegā, & ab æris iniuria muniam, atque sub horam nonam ante meridiem retegā.

Illud autem in his omnibus plantis mirum & observatione dignum, quòd dum contabescere incipiunt, primum folia, deinde integri articuli simul decidant, & circa iam nuda remanentia genicula interdum candida quedam efflorescētia adnascatur, quæ temporis successu concreta, salis saporem referat: cuius postrema no-

Admirabilis  
mira natura.





te C. V. D. Ioachimus Camerarius pro nostra amicitia  
me primus admonuit.

CETERVM peregrina & perelegans hac planta  
varia pro regionum diversitate obtinuit nomina: etenim  
ex Hispanis semē primum missum est Marabillas dei  
Petu appellatione, propter admirabilem florum in ea-  
dem stirpe varietatem: ex Italia nunc Indici nūc Me-  
xicani Iasmini nōmine, ob suā quē videlicet eius florum  
odorem: Belga Solanum odoriferum, à foliorum cum  
solani foliis similitudine, & florum odoris gratia appel-  
larunt: Peruanos, à quibus initio semen ad Hispanos  
peruenit, Hachal indi crassa & in palato formata  
pronuntiatione nominare intelligo: Muliercula Vien-  
nenses apud quas nunc in deliciis est, Geschehet in-  
dianische blumen, hoc est, versicolores Indicos flores  
nuncupant.

Marabillas  
dei Peru.

Iasminum  
indicum siue  
mexicanum.  
Solanum odo-  
riferum.

Hachalindi.

Geschehet in-  
dianische blum-  
men.

AN apud incolus ubi sponte nascuntur hæ stirpes  
medico in usu sint, nondum intelleximus, magisque ele-  
gantia & hortos exornandi causa ab omnibus ali arbit-  
ror, quā facultatū ratione. Scripsit tamen ad me  
Patauio usque amplissimus vir Iacobus Antonius  
Cortusus, eius quæ vario est flore radice b. nas dra-  
chmas introsumas egregiè aqua educere. Cuius rei  
berbarū cognitione sese oblectā: ex etiā admonitos volui.

Admirabilis  
facultates.

## DE PÆONIA BYZANTINA rubro flore.

### CAP. LVI.

ELEGANS porro Pæonie genus semine natum,  
quod à quibusdam Nobilibus Matronis alitur, haud-  
quaquam prætermittendum est. Id Pæonie vulgaris  
femina, aut eius quæ πολυανθή est, foliis similia fere  
habet folia, paulo tamen crassiora, atque cum prona  
tum supina parte lania & splendētia: caules alteri si-

Pæonia flo.  
rubro simpli.

miles, cubitales, aut ampliores: florem in summo susti-  
nentes unicum, simplici 8. 10. aut plurium interdum  
foliorum textura constantem, non purpureorum ut το-  
λυφάλλανθης, sed saturatius rubentium & elegantissi-  
morū, multis staminulis carnei coloris luteos apices sus-  
tinentibus medias siliquas sine cornicula ambientibus:  
semen ex quo nata est hac planta Byzantio mitti solet  
Schakaick nomine, nigrum, splendens, vulgaris Pao-  
nia semini respondens.

*Floret Maio mense cum aliis Paonia generibus.*

CAROLI



## CAROLI CLVSII

## RARIORVM STIRPIVM

## PER PANNONIAS

## obſeruatarum Hiſtoriæ

## LIBER TERTIVS.



**B**VLBOſAS, & Coronarias, atque nonnullas illis congeneres ſtirpes Secundo libro deſcripſimus. Iis reliquas addere animus erat: ſed quoniam in iuſto maiorem molem excreuiſſet, illas in plures libros diſtribuire commodius eſſe duximus.

## DE ACONITO LYCOCTONO.

## CAP. I.

**V**ARIA admodum naſcuntur in his Prouinciis Lycoctoni genera nuſquam alibi mihi conſpecta, quæ omnia ordine hoc primo Tertijs libri capite deſcribemus, nonnullis etiã additis, quæ aliunde miſſa, in hortis aluimus. Initium autem faciam ab eo, quod Lycoctono palente flore (plerisquæ huius regionis montibus umbroſis, præſertim verò quodã iugo ſupra Petelſtorf ad Septentrionem obuerſo, ſecundo fere à Vienna miliari copioſiſſimè creſcenti) foliorum ſimilitudine maximè reſpondet, & florum elegantia inſigne eſt.

Aconit Lycoctoni  
genera.

**P**RIVM igitur cubitali aut ampliore aſſurgit caule, firmo, leui intus cauo, foris ex purpura virescente, & quaſi farina polline leniter aſperſo, ſine eo coloris

1.  
Lycoctonum  
Bo. delphinij  
earulo.



flore qui in prunis & plerisque aliis fructibus, tuliparumq; foliis & caule elucescit, leuissimq; contactu detergitur: folia longis pediculis inherencia, confuso ordine caule ambiunt, longè ab eius Lycotoni quod flore Delphinij vulgo cognominatur, foliis diuersa, subhirsuta, minoribusq; & minus profundis incisuris diuisa, Lycotoni pallido flore foliis similia, supernè tamen attriora: summum caulem exornat oblonga florum spica, quæ pediculis inherentes, ante quàm aperiantur, locustas aut paruos lacertos amulantur, oblongis candidis & sub extremum incuruis insignes, aperti verò quaternis foliis, quemadmodum aliorum aconitorum flores constare deprehenduntur, duobus ad latera, binis parte inferna, & superiore quinto, quod in oblongum corniculum rugosum & extrema parte inflexum desinit, omnibus foliis parte externa rugosis purpureisq; internè verò laniatis & ceruleis elegantissimis, atque singulorū oris parte anteriore introrsum nonnihil reflexis, coloreq; è viridi pallescente: medium florem occupant quatuor alia foliola fusca & nigricantia, duo superiora dura & quasi in unum coëuntia fornicem referentia, duobus aliis infernè propendentibus mollioribusq; & partim luteo villo, partim candido hirsutis, multis staminibus capilla-ceis subtus delitescentibus: flore excusso succedunt ternæ siliquæ simul iunctæ ut in aliis aconitis, in quibus semen inæquale, fuscum, rugosum: radix crassa, tuberosa uti alterius Lycotoni flore Delphinij quod apud Belgas alitur, nigra, rugosa, concava, grauitè olens, multis tenuibus fuliginosaq; lanugine pubescentibus fibris prædita, ad cuius latera secundum infimum caulem singulis annis noua germina repellulant.

Nascitur referente eruditissimo viro Achille Cro-mero, qui eius plantas anno 1578. nobis misit, frequens

in montibus territory Freywaldensis in Silesia, & ab incolis **Wolfwurtz**; id est, lupina radix appellatur, ubi in tricubitalem interdum altitudinem excrefcere & Augusto florere ait: quod ab eo certè missum in horto colimus, Iunio floret, & sesquicubitalem altitudinem anno 1579. non superauit, at subsequētib; bicubitalem aut maiorem attigit.

- II. FOLIA** Secundo emergunt ineunte vere satis crassa, quinque incisuris vsque ad pediculum diuisa, & in multas deinde profundas lacinias dissecta, minus tamen quàm Napelli vulgaris folia, atro virore supernè prædita, infernè minime, sed utrimque splendentia: quæ alternatim caulem ambiunt, tenuius aliquantum incisa sunt, eodem tamen modo splendentia: caulis cubitalis aut sesquicubitalis plerumque, firmus, medullosus, lauis & splendēs, superiore parte in aliquot ramos diuiditur, qui paucos flores ferunt, vulgari Napello forma similes, quatuor videlicet foliis cōstantes et humili galea, sed colore viola saturatissimo, & elegātissimo: succedunt deinde uti in vulgari tria cornicula nigricātia, angulosum, fuscum, rugosum semen continentia: radix exigui napi magnitudine, multis longis fibris, quæ plerumque tenui fuliginosiq; coloris lanugine pubescunt, prædita est; atque in lateribus alias similes radices promit, quæ singulis annis nouos caules proferunt.

Inuenitur in Tauricis ingis non procul à Salisburgo: florētque istic Iulio, sed in cultis multo maturius, præcociusque reliquis Lycōtonis, nempe Maio interdum.

- III. LATIORA** vulgari Napello habet Tertium folia, licet similiter incisa & laciniata, atriora item & splendentia: caulem rectum, firmum, rotundum, trium interdum cubitorum altitudinem aquantem, & in multos sæpenumero ramulos superiore parte diuisum, qui flores in

Lycōtonum  
præcox tauricum.

Lycōtonum  
neubeigense.







flores in spica modum congestos ferunt, purpureos, Napellus vulgaris floribus planè respondentes, hoc est, quatuor foliis constantes, quinto veluti galeola supereminente, & duo circumvoluta cornicula occultente, staminum tamen media congeries magis fusca est: florum spica quæ in extremo caule nascitur, reliquis oblongior est, & supereminet: singulis floribus terna succedunt cornicula, interdum quaterna & quina, semen atrum & inæqualè continentia: radicem habet vulgaris Napelli modo, paruo napo similem, cui in lateribus adherent alij napi fibræ præditi, quibus se propagat.

Crescit in montis Neuberger Ducatus Styria ingo, ubi vaccarum æstivo tempore istic pascentium stabula sunt. Floret paulo post vulgarem, videlicet Iulio.

VULGARIS aut Napellus frequentissimus est in Suealben & aliorum quorundam montium iugis, ubi trimestri illo æstivo Iunio, Iulio, & Augusto, boves & vacca sua stabula habent, sic ut simi pinguedine & stercoreis elunie cum precedente delectari videatur.

MEDIUM quodammodo inter vulgarem Napellum, & proximè descriptum Lycostoni quartum genus est, etenim folia illis simillima obtinet: caulis inter illos mediæ est, sed infirmior, & superiore parte aliquantulum nutans: flores utriusque floribus planè responderent, nisi galea supra quatuor folia magis subleuaretur & hiarèt, atque rostro magis mucronato esset: semina in ternis corniculis simul iunctis similia: radix etiã non multum variat.

Assumit hoc genus à C.V.D. Stepio p.m. è Lyncei montanis erutum, quod postea in hortis cum reliquis generibus aluimus. Floret cum superioribus aut paulo serius. Videtur proximè accedere (si ex icone indicare licet) ad id Aconitum quod Matthiolus septimo loco depingit.

V.

*Lycoctonum*  
*maximū nu-*  
*stante coma.*

*TRIVM* interdum cubitorum altitudine assurgit Quintum genus, caule tamen satis gracili; rotundo, superiore parte in multos ramos diuiso & nutante: summo caule oblongam florum spicam fert *Lycoctoni* carulei vulgaris siue *Napelli* floribus similiū, sed paulo dilutius purpura splendentium, quibus singulis succedūt uti in aliis *Lycoctoni* generibus terna oblogiuscula. cornicula, semine inaequali fusco plena: folia ampla & oblonga, in multas profundas tenuēsque lacinias magis diuiduntur, quā in ullo alio *Lycoctoni* (præter id quod à Belgis flore *Delphini* nomine alitur) genere, quæ supernè atro virore prædita quidem sunt, non tamen splendent: radix crassa & oblonga napi magnitudine, foris nigricans, & per intervalla multis fibris donata, superiore parte in multa capita extuberat, unde caules emergunt: subinde tamen novos napos exiguos ad latera adnatos habet, quibus se propagat.

*A Cl. V. Friderico Sebizio* medico primū ex Italia huc delatum est, & nobis communicatum.

*Floret Julio. Fortè IX. erit Matthioli.*

VI.

*Lycoctonum*  
*Iudenbergen-*  
*se.*

*HABET* etiam Sextum *Lycoctoni* genus folia in quinque profundas lacinias (quæ denuō in ambitu diuisa sunt) scissa, Thora Italica foliis adeò similia, ut si quis plantas, ante quā in flores abeant, conferat, nullum ferme discrimen deprehendere queat, nisi Italica folia splenderent, huius minimè: caulem bicubitalem interdum, rotundum, non admodum crassum, firmum tamen & rectum, atque ex viridi purpurascens, qui supernè quinos aut senos fert flores inter omnia *Lycoctoni* genera maximos, quatuor foliis constantes, ut *Napellus* vulgaris, supereminente galea longè maiore & uncialis longitudinis, elegantis ex caruleo purpurei coloris, sub qua oblonga duo cornicula superiore parte latiora, &





tiora, & litui veterum Romanorum fere more inflexa, colore dilutius purpurascente occuluntur, stamina nigra medium florem occupant: illis succedunt tria ve plurimum cornicula, interdū etiam quaterna & quina simul iuncta, ut in tertio genere, sed longè maiora, semen inaequale, fuscum, continentia: radix parui napi similitudinem emulatur, & nigricantibus fibris praeclata est: alias insuper similes radices in lateribus adnatas habet, tenuioribus adhuc fibris praeclatas, quae singulis annis novos caules proferunt: adnascuntur etiam infimi canalis nodis tubercula, quemadmodum in Italica Thora.

Sponte provenit in Iudenberg, altissimo totius Styriae monte, ubi Spica celtica legitur: floretq; istic Augusto, in hortis sub Iulij fine, seruis reliquis superioribus.

Thora Italica

ITALICA Thora (quo nomine aliquando ad nos in Belgicam misit Cl. V. Alphonsus Pancius) huic admodum, ut retuli, similis, florem minorem dilutiorēq; habet, cuius galea licet ceteris altior sit, ad sexti tamen longitudinem & amplitudinem minimè accedit.

Ubertum ea nascitur ad monasterium Neuberg secundum torrentem qui monasterium alluit, & proximè altissimum illum lacum magno supra Gammigam miliari, ad Zeehof villam (quae ab ipso nomen sumsit) situm. Floret istic Augusto. Forte VII. erit male pictum Matthioli aconitum.

SEPTIMI folia media quodammodo sunt inter VII.

hoc & tertium genus, huius quidem foliis quodammodo similia, nonnihil tamen ad tertij generis similitudinem accedentia, nec illis minus ampla, atro virore splendentia supernè: caulis bicubitalis, crassius, firmus, striatus, virescens & splendens: summa sui parte florum spicam tertio generi similem fere gestans, quibus etiam succedunt pares siliqua siue capita, & simile semen: radix

Lycodonum  
autumnale.

tertio



tertio generi par, perennis & multis ad latera adnatis se propagans.

Aluimus hoc genus diu in Belgica, à Petro de Ouerstraete diligenti pharmacopola Bruxellensi primū communicatum, & deinde mea opera huc delatum, Vienneſes hortos ornare cœpit. Floret Augusto, qua de causa Napellum autumnalem appellare ſolebamus.

Illius haud meminisse, niſi à noſtris, qui de re herbaria scripserunt, neglectum animaduertiſſem.

## DE GERANIO MONTANO.

### CAP. II.

FECIT ſimilitudo foliorum huius Gerani cū nonnullorum Ranunculorū foliis, ut poſt Anemones, quas à Ranunculis ſeiungere non potui, collocare cuſperem. Sed cū illa Secundum noſtra Hiſtoria librum clauſerit, in hunc Tertium poſt Lycoſtoni deſcriptionē reſiciendum fuit. Eius verò plura ſunt genera.

CVBITALES frequentesq; ex una radice producit Primum caules, firmos, geniculatos, aliquot alis brachiatos, virides, ſanguineis tamen veluti guttis aſperſos, hirsutos: in quorum ſummitatibus ad ſingula genicula oblongi enaſcuntur pediculi, in quibus bini flores, quinque foliolis (prater reliquorum Geraniorum uſitatam formam) laciniatis conſtantes, colore ſaturatius rubente & quaſi atro, medium florē occupantibus multis ſtaminibus circumuolutis cum ſtilo prominente: ſemen deinde ſuccedit in ſalcatis valvulis (que maturitate uti in reliquis Geraniis diſſiliunt) ſuſcum: folia illi ex radice multa, ampla, mollia, lanuginosa ſeu hirsuta, exteriori parte neruoſa, Geranio batrachiodi ſimilia, quinis, ſenis, aut ſeptenis profundioribus incifuris diuiſa, non tamē uſque ad umbilicum, deinde per ambitum ſerrata,

1.  
Geranium  
montanum ſive  
pullo Roſe.





ferrata, qualia etiam in singulis geniculis ex aduerso ramorum enascuntur, atque subinde ad singulas incisuras nigricantibus maculis insignita: radice nititur magna, in multa crassa capita rubentiaq; & multas fibras spargentia extuberante, singulis etiam annis augescente, & novos stolones producente.

Inuenitur in Styria alpibus, ubi silua desinere solët; & floret Junio: in hortis verò ubi felicissimè provenit & luxuriat, Maio. Postea etiam anno 1579. maxima copia obseruari Maio mense suis floribus onustum in montibus illis siluosis Sclauonia vulgo vocata supra Drauum fl. Primum autem mea opera Belgis innotuit, semine hinc vsque amicis misso.

ALTERVM frequentibus è radice prodeuntibus, longoq; pediculo nitentibus foliis praditum est, Ranunculi maioris aut Aconiti Lycoctoni pallido flore respondentibus fere, rugosis & subhirsutis, in aliquot profundiores lacinias diuisis, & deinde per ambitum serratis, quæ gustata primum adstringunt & linguam exsiccant, deinde nonnihil calida deprehenduntur: caule cubitali plerumque, firmo, rotundo, geniculato, in multas alas diuiso, ad quas subnascuntur folia superioribus minora, minoreque laciniarum numero diuisa, similiter tamen in ambitu serrata: summi rami in oblongis pediculis flores gestant quinque foliis constantes, Gerani batrachiodis Belgici floribus forma pares, nisi paulo minores esset, nec ut illi carulei, verum ex purpura rubentes, decem staminulis cum stilo è medio prodeuntibus: deinde oblonga rectaque rostra, non inflexa & inclinata, quinis utriculis ad eorum basim semè continentibus, quod maturitate exilit, ut in reliquis: radice superiori fere respōdet, et summa tellure in plura crassa intusq; rubetia capita extuberat, quæ fibras etiam agunt, singulisq; annis augentur.

II.

Geranium  
 Ευραχιδας  
 alterum.

d

Crescit



Crescit hoc in Pannonicis Styriacisq; alpibus, nusquam tamen abundantius quam supra Gamingam, in ascensu ex Herrenalben ingi ad scopulos Durrenstain. Floret illic Iulio & Augusto, in hortis Maio.

GERANIVM autem illud Batrachiodes caruleo flore quod Belgicis hortis alitur, copiose nascitur in pratis apud Corenneburg non procul à Danubio, aliisque Austria pratis, tum etiam Bohemia, non procul à Werawn oppido tertio à Praga miliari.

Geranium  
Cztrachůvsk  
primuli.

TERTII, quod foliorum similitudine cum secundo III. convenit, iconem mihi anno 1581. communicavit Londini Cl. V. Thomas Pennaeus Medicus cum hac descriptione.

Geranium bulbosum radicē habet bulbosam ex multis parvis & oblongis bulbis constantē, versus summū fibratam, caulē cubitalē, geniculatum, iuxta radicē & genicula parum rubentem: è singulis geniculis duo folia longiusculis pediculis nitentia in quinq. principales partes dissecta, quarum singula in ambitu inaequaliter incisa sunt: è singulis iuncturis iuxta foliorum exortum quinque foliola mucronata exoriuntur: flores in summis ramulis coniugatim parvis pediculis insistentes rosci, ex quinque foliis constantes, colore ex purpureo rubescentes, Geranij ceruleis floribus similes, sed paulo minores.

Geranium  
bulbosum  
Pennaei.

In Dania provenit agro Hafniensi, unde doctissimus & mihi amicissimus Turnerus Medicus Anglus attulit, & mihi dono dedit.

QUARTO multi sunt caules admodum ramosi & frequentibus nodis cincti, hirsuti, supernè, qua solem spectant purpurascens vel rubentes: folia ad singula genicula bina, Geranij columbini alterius foliis haud multum dissimilia, in quinque lacinias ad umbilicum fere divisa, quae plerumque in tres alias minores lacinias in-

IIII.  
Geranium  
ajacitū, etc.

in montibus territory Freywaldensis in Silesia, & ab incolis *Wolfswurtz*/ id est, lupina radix appellatur, ubi in tricubitalem interdum altitudinem excrefcere & Augusto florere ait: quod ab eo certè missum in horto colimus, Iunio floret, & sesquicubitalem altitudinem anno 1579. non superauit, at subsequētib; bicubitalem aut maiorem attigit.

- II. FOLIA Secundo emergunt ineunte vere satis crassa, quinque incisuris vsque ad pediculum diuisa, & in multas deinde profundas lacimas dissecta, minus tamen quàm *Napelli* vulgaris folia, atro virore supernè prædita, infernè minime, sed utrimque splendentia: quæ atternatim caulem ambiunt, tenuius aliquantum incisa sunt, eodem tamen modo splendentia: caulis cubitalis aut sesquicubitalis plerumque, firmus, medullosus, leuis & splendēs, superiore parte in aliquot ramos diuiditur, qui paucos flores ferunt, vulgari *Napello* forma similes, quatuor videlicet foliis cōstantes et humili galea, sed colore viola saturatissimo, & elegātissimo: succedunt deinde uti in vulgari tria cornicula nigricātia, angulosum, fuscum, rugosum semen continentia: radix exigui napi magnitudine, multis longis fibris, quæ plerumque tenui fuliginosiq; coloris lanugine pubescunt, prædita est, atque in lateribus alias similes radices promit, quæ singulis annis nouos caules proferunt.

Inuenitur in *Tauricis* ingis non procul à *Salisburgo*: florētque istic Iulio, sed in cultis multo maturius, præcociusque reliquis *Lycōctonis*, nempe *Mai*o interdum.

- III. LATIORA vulgari *Napello* habet Tertium folia, licet similiter incisa & laciniata, atriora item & splendentia: caulem rectum, firmum, rotundum, trium interdum cubitorum altitudinem æquantem, & in multos sæpenumero ramulos superiore parte diuisum, qui flores in

*Lycōctonum*  
*præcox tauri-*  
*cum.*

*Lycōctonum*  
*neubeigense.*





flores in spica modum congestos ferunt; purpureos, *Napelli* vulgaris floribus planè respondentes, hoc est, quatuor foliis constantes, quinto veluti galeola supereminente, & disco circumvoluta cornicula occultente, stamenum tamen media congeries magis fusca est: florum spica quæ in extremo caule nascitur, reliquis oblongior est, & supereminet: singulis floribus terna succedunt cornicula, interdum quaterna & quina, semen atrum & inæquale continentia: radicem habet vulgaris *Napelli* modo, parvo napo similem, cui in lateribus adherent alij napi fibræ prædis, quibus se propagat.

Crescit in montis *Nenberg* Ducatus *Styria* iugo, ubi vaccarum æstivo tempore istuc pascentium stabula sunt. Floret paulo post vulgarem, videlicet *Julio*.

**VULGARIS** aut *Napellus* frequentissimus est in Napellus vulgaris.  
*Sucalben* & aliorum quorundam montium iugis, ubi trimestri illo æstivo *Iunio*, *Julio*, & *Augusto*, boves & vacca sua stabula habent, sic ut simi pinguedine & stercoreis eluniv cum præcedente delectari videatur.

**MEDIUM** quodammodo inter vulgarem *Napellum*, & proximè descriptum *Lycostoni* quartum genus I I I I .  
Lycostonium  
lynceanum.  
est, etenim folia illis simillima obtinet: caulis inter illos mediæ est, sed infirmior, & superiore parte aliquantulum nutans: flores utriusque floribus planè responderent, nisi galeola supra quatuor folia magis sublevaretur & hiaret, atque rostro magis mucronato esset: semina in ternis corniculis simul unctis similia: radix etiã non multum variat.

Missum fuit hoc genus à *C. V. D. Stepio p. m.* è *Lyncæi* montanis erutum, quod postea in hortis cum reliquis generibus aluimus. Floret cum superioribus aut paulo serius. Videtur proximè accedere (si ex icone iudicare licet) ad id *Aconitum* quod *Matthiolus* septimo loco depingit.



V.

Lycostonum  
maximū nu-  
tante coma.

**TRIUM** interdum cubitorum altitudine assurgit  
*Quintum* genus, caule tamen satis gracili; rotundo, su-  
 periore parte in multos ramos diuiso & nutante: summo  
 caule oblongam florum spicam fert Lycostoni carulei  
 vulgaris siue Napelli floribus similiū, sed paulo di-  
 lutiore purpura splendentium, quibus singulis succedūt  
 uti in aliis Lycostoni generibus terna oblongiuscula. cor-  
 nicula, semine inaequali fusco plena: folia ampla & ob-  
 longa, in multas profundas tenuēsq̃ue lacinias magis di-  
 uiduntur, quā in ullo alio Lycostoni (præter id quod  
 à Belgis flore Delphinij nomine alitur) genere, quæ su-  
 perne atro virore prædita quidem sunt, non tamen splen-  
 dent: radix crassa & oblonga napi magnitudine, foris  
 nigricans, & per intervalla multis fibris donata, supe-  
 riore parte in multa capita extuberat, unde caules  
 emergunt: subinde tamen novos napos exiguos ad latera  
 adnatos habet, quibus se propagat.

A Cl. V. Friderico Sebizio medico primum ex  
 Italia huc delatum est, & nobis communicatum.

Floret Julio. Fortè IX. erit Matthioli.

VI.

Lycostonum  
Iudenbergen-  
se.

**HABET** etiam Sextum Lycostoni genus folia in-  
 quinque profundas lacinias (quæ denuò in ambitu diui-  
 sa sunt) scissa, Thora Italica foliis adeò similia, ut si  
 quis plantas, ante quā in flores abeant, conferat, nul-  
 lum ferme discrimen deprehendere queat, nisi Italica  
 folia splenderent, huius minimè: caulem bicubitalem in-  
 terdum, rotundum, non admodum crassum, firmum ta-  
 men & rectum, atque ex viridi purpurascentem, qui  
 supernè quinos aut senos fert flores inter omnia Lycop-  
 stoni genera maximos, quatuor foliis constantes, ut Na-  
 pellus vulgaris, supereminente galea longè maiore &  
 uncialis longitudinis, elegantis ex caruleo purpurei co-  
 loris, sub qua oblonga duo cornicula superiore parte la-  
 tiora, &





tiora, & litui veterum Romanorum fere mōre inflexa, colore dilutius purpurascente occuluntur, stamina nigra medium florem occupant: illis succedunt tria ut plurimum cornicula, interdū etiam quaternaria & quina simul iuncta, ut in tertio genere, sed longè maiora, semen inaequale, fuscum, continentia: radix parui napi similitudinem amulatur, & nigricantibus fibris praedita est: alias insuper similes radices in lateribus adnatas habet, tenuioribus adhuc fibris praeditas, quae singulis annis novos caules proferunt: adnascuntur etiam infimi caulis nodis tubercula, quemadmodum in Italica Thora.

Sponte provenit in Iudenberg, altissimo totius Strya mōte, ubi Spica celtica legitur: floretq; istic Augusto, in hortis sub Iulij finē, serius reliquis superioribus.

Thora Italica

ITALICA Thora (quo nomine aliquando ad nos in Belgicam misit Cl. V. Alphonsus Pancius) huic admodum, ut retuli, similis, florem minorem dilutionemq; habet, cuius galea licet ceteris altior sit, ad sexti tamen longitudinem & amplitudinem minimè accedit.

Uberrimè nascitur ad monasterium Neuberg secundum torrentem qui monasterium alluit, & proximè altissimum illum lacum magno supra Gaminigam miliari, ad Zeehof villam (quae ab ipsa nomen sumsit) situm. Florèt istic Augusto. Forte VI II. erit malè pictum Matthioli aconitum.

SEPTIMI folia media quodammodo sunt inter VII.

hoc & tertium genus, huius quidem foliis quodammodo similia, nonnihil tamen ad tertij generis similitudinem accedentia, nec illis minus ampla, atro virore splendentia supernè: caulis bicubitalis, crassus, firmus, striatus, virescens & splendens: summa sui parte florum spicam tertio generi similem fere gestans, quibus etiam succedunt pares siliqua siue capita, & simile semen: radix

Lycodonum  
autumnale.

tertio



tertio generi par, perennis & multis ad latera adnatis se propagans.

Aluimus hoc genus diu in Belgica, à Petro de Ouerstraete diligenti pharmacopola Bruxellensi primū communicatum, & deinde mea opera huc delatum, Vienneſes hortos ornare cœpit. Floret Augusto, qua de causa Napellum autumnalem appellare ſolebamus.

ſilius haud meminiffem, niſi à noſtris, qui de re herbaria ſcripſerunt, neglectum animaduertiſſem.

## DE GERANIO MONTANO.

### CAP. II.

FECIT ſimilitudo foliorum huius Geraniy cū nonnullorum Ranunculorū foliis, ut poſt Anemones, quas à Ranunculis ſeiungere non potui, collocare cuperem. Sed cū illa Secundum noſtra Histoſia librum clauſerit, in hunc Tertium poſt Lycoſtoni deſcriptionē reſciendum fuit. Eius verò plura ſunt genera.

CVBITALES frequentesq; ex una radice producit Primum caules, firmos, geniculatos, aliquot alis brachiatis, virides, ſanguineis tamen veluti guttis aſperſos, hirsutos: in quorum ſummitatibus ad ſingula genicula oblongi enaſcuntur pediculi, in quibus bini flores, quinque foliolis (prater reliquorum Geraniorum uſitatam formam) laciniatis conſtantes, colore ſaturatiuſ rubente & quaſi atro, medium florē occupantibus multis ſtaminibus circumuolutis cum ſtilo prominente: ſemen deinde ſuccedit in falcatis valvulis (qua maturitate uti in reliquis Geraniis diſſiliunt) ſuſcum: folia illi ex radice multa, ampla, mollia, lanuſinoſa ſeu hirsuta, exteriori parte neruoſa, Geranio batrachiodi ſimilia, quinis, ſenis, aut ſeptenis profundioribus inciſuris diuiſa, non tamē uſque ad ſumbilicum, deinde per ambitum ſerrata,

Geranium  
officinale  
pullo flore.



ferrata, qualia etiam in singulis geniculis ex aduerso ramorum enascuntur, atque subinde ad singulas incisuras nigricantibus maculis insignita: radice nititur magna, in multa crassa capita rubentiaq; & multas fibras spargentia extuberante, singulis etiam annis augete, & novos stolones producente.

Inuenitur in Styria alpibus, ubi silua desinere solët; & floret Junio: in hortis verò ubi felicissimè provenit & luxuriat, Maio. Postea etiam anno 1579. maxima copia obseruari Maio mense suis floribus onustum in montibus illis siluosis Sclauonia vulgo vocata supra Drauum fl. Primum autem mea opera Belgis innotuit, semine hinc vsque amicis misso.

ALTERVM frequentibus è radice prodeuntibus, longoq; pediculo nitentibus foliis praditum est, Ranunculi maioris aut Aconiti Lycotoni pallido flore respondentibus fere, rugosis & subhirsutis, in aliquot profundiores lacinias diuisis, & deinde per ambitum serratis, quæ gustata primum adstringunt & linguam exsiccant, deinde nonnihil calida deprehenduntur: caule cubitali plexumque, firmo, rotundo, geniculato, in multas alas diuiso, ad quas subnascuntur folia superioribus minora, minoreque laciniarum numero diuisa, similiter tamen in ambitu serrata: summi rami in oblongis pediculis flores gestant quinque foliis constantes, Gerani batrachiodis Belgici floribus forma parës, nisi paulo minores esset, nec ut illi cerulei, verum ex purpura rubentes, decem staminulis cum stilo è medio prodeuntibus: deinde oblonga rectaque rostra, non inflexa & inclinata, quinis utriculis ad eorum basim semē continentibus, quod maturitate exilit, ut in reliquis: radix superiori fere respondet, et summa tellure in plura crassa intusq; rubentia capita extuberat, quæ fibras etiam agunt, singulisq; annis augetur.

II.

Geranium  
 Geranium  
 alterum.

d

Crescit



Crescit hoc in Pannonicis Styriacisq; alpibus, nusquam tamen abundantius quam supra Garmingam, in ascensu ex Herrenalben ingi ad scopulos Durrenstain. Floret illic Iulio & Augusto, in hortis Maio.

GERANIVM autem illud Batrachiodes ceruleo flore quod Belgicis hortis alitur, copiose nascitur in pratis apud Corenneburg non procul à Danubio, aliisque Austria pratis, tum etiam Bohemia, non procul à Werawn oppido tertio à Praga miliari.

Geranium  
Carpaxioides  
primum.

TERTII, quod foliorum similitudine cum secundo convenit, iconem mihi anno 1581. communicavit Londini Cl. V. Thomas Pennæus Medicus cum hac descriptione.

III.

Geranium bulbosum radicē habet bulbosam ex multis parvis & oblongis bulbis constantē, versus summū fibratam, caulē cubitalē, geniculatum, iuxta radicē & genicula parum rubentem: è singulis geniculis duo folia longiusculis pediculis nitentia in quinq. precipuas partes dissecta, quarum singule in ambitu inequaliter incise sunt: è singulis iuncturis iuxta foliorum exortum quinque foliola mucronata exoriuntur: flores in summis ramulis coningatim parvis pediculis insistentes rosci, ex quinque foliis constantes, colore ex purpureo rubescentes, Gerani ceruleis floribus similes, sed paulo minores.

Geranium  
bulbosum  
Pennæ.

In Dania prouenit agro Hafniensi, unde doctissimus & mihi amicissimus Turnerus Medicus Anglus attulit, & mihi dono dedit.

QUARTO multi sunt caules admodum ramosi & frequentibus nodis cincti, hirsuti, supernè, qua solem spectant purpurascens vel rubentes: folia ad singula genicula bina, Gerani columbini alterius foliis haud multum dissimilia, in quinque lacinias ad umbilicum fere diuisa, quæ plerumque in tres alias minores lacinias in-

IIII.  
Geranium  
ajacoides.





cise sunt, hirsuta, supernè virentia, infernè nonnihil canescentia, gustu linguam exsiccante: ex superioribus alis oblongi nascuntur pediculi, unicum sustinentes singuli florem, inter reliqua Gerani genera maximum, quinq. foliis constantem, Cisti maris flori ferme parem, colore rubro, decem intus staminulis: deinde capita pentagona semen, ut alia, in valuulis continentia, quod maturum cum crepitu exilit, circumuoluentibus se, quèadmodum in reliquis generibus valuularum mucronibus: radix satis crassa, rubescens, nonnullisq. fibris donata, nouas sub terram propagines singulis annis ad latera spargit, qua similiter fibras agunt.

Nascitur in omnibus Pannonia & Austria infra Anisum caduis montanis siluis, editioribusq. gramineis locis: insuper ultra Drauum, ubi mons arcis Greben vicinus, qua parte occidentem spectat, eo fere consitus est. Floret Maio, & plerumque tota reliqua æstate.

2. Simili flore disparibus tamen foliis & Batrachiodis Gerani potius æmulis inuenitur aliud genus ad pratorum margines umbrosos interque vepres, ad pagum Calzeret supra Noribergam itinere Pragensi.

Geranium  
quartum dicit  
alterum.

TRAGO quartum genus ignotum minimè fuisse videtur: sed ab eo Blutwurtz appellari. Reliquorum nullum vulgare nomen noui. Vngari vulgare Geranium Varyu lab, id est, Cornicis pedem nuncupant, ut columbinum Golia korem, hoc est, Ciconia unguem.

Slauonica mulieres quarti decoctum ex profluente aqua mirificè comendant in capitis grauedine, si synciput, ubi dolor est, eo abluatur, deinde herba decocta superimponatur, postremò (quod superstitione non caret) in profluentem, unde aqua fuerit hausta, abiiciatur.

## DE QVINQUEFOLIO.

## CAP. III.

COPIOSE hîc nascuntur varia Pentaphylli genera, multis aliis Proninciis vulgaria: quæ cum ab aliis descripta sint, superuacaneum duximus eorum hîstoriæ hîc inserere. De iis igitur hoc capite solum acturi sumus, quæ à nemine, quod intellexerim, adhuc sunt prodita.

VNUM multa folia habet Quinquefolio vulgari similia, quinquepartitò usque ad pediculum diuisa, per ambitum minime, ut illa, serrata, sed extremis duntaxat foliorum oris, subtus incana quadam lanugine hirsuta, gustu primum gummoso & emplastico, deinde nonnihil amaricante: aliquot sub his exoriuntur cauliculî graciles & tenues, dodrantales, humi procumbentes, in summo ternos aut quaternos flores proferentes Pentaphyllo vulgari similes, sed omnino candidos, quibus succedit calyx hirsutus, semen continens planum ranunculi fere seminis amulum, in caput congestum: radix crassa nigricat, in ambitu sese diffundit, & multis fibris hirsuta est.

Prouenit nõ modò in colle illo nemoroso supra Manderstorf oppidum tepidarum aquarum scaturigine notabile: sed etiam in omnibus illis siluis montosis quæ à Danubio procurrêtes, ad Alpes usque pertingunt. In siluis item supra Nemethwywar & Zollonock, atque etiam apud Entzestorf, & plerisque pratis siccioribus primo ab vrbe Vienna miliari, & in Morauia: tum in montibus ultra Drauum. Floret Aprili & Maio, interdum denuò Autumno.

ALIUD ex eadem radice, quæ nigra est, multos plerumque cauliculos proferre solet confertim nascentibus se-

I.  
Pentaphylli  
maius albo  
flore.

II.  
Pentaphylli  
minus albo  
flore.













gi rudimentum congestum, fuscum: radix longa, dura, satisque crassa, foris nigricans, & tenuibus fibris donata: sed & rami illi humi fusi plerumque fibras agunt, & vicina loca occupant.

Nihil illo vulgatius secundum vias locis siccis & nudis Pannonia, Austria inferioris, Moravia & Bohemia. Florere incipit ineunte propemodum vere.

2. Eius genus inuenitur humi similiter fuscum, cuius cauliculi non videntur, sed purpurascunt, gracilioresq. sunt, folia angustiora, hirsutiora, & altius per oras serrata: flores etiam magis aurei: cetera conueniunt.

Pentaphyl.  
repens minus  
aureo flo.

Cum superiore nascitur, & floret, minus tamen frequens est.

- V. QUINTVM habet quinque, sex, aut plures foliorum alas à radice prodeuntes, hoc est oblongas costas, rubentes, quibus quinque ut plurimum folia, interdum verò etiam septem inhaerent, contrario inter se foliorum exortu nascentia, vno, quod extrema ala insidet, imparitatem semper faciente: sunt autem ea rugosa, hirsuta, per oras serrata, supina parte virentia, prona aliquantulum incana, fragaria vulgari fere similia, minora tamen, sapore aliquantulum adstringente: caulis deinde assurgit gracilis, firmus, ruber, pedalis aut amplior, in quo sparsa sunt paucula folia superioribus minora, quinque tamen ut illa numero, & arctius coniuncta, in summo autem ubi in quosdam ramulos diuiditur, terna tantum vni pediculo inhaerentia: ferunt verò & ramuli sine virgula albos flores, vulgari fragaria similes, & paulo minores, quinque foliis constantes, & in medio lutea staminula obtinentes: quibus succedit fructus frago similis, minor tamen, nec ulla saporis gratia commendabilis, deinde exigua rufescentia semina: radix satis crassa, longa, dura & lignosa rubescit, & nigro adstringente cortice obducta est.

Pentaphyllū  
fragiferum.

Nascitur



*Nascitur in Leytenberg locis umbrosis ad arcem in media silua supra Manderstorf sitam, quo loco duntaxat aliquot annis obseruauimus. Sed anno 1579. copiosè nasci vidi inter Rabam, Muram, & Drauū flumina Pannonie, omnium autem abundantissimè circa Sachtyrnia Ill<sup>us</sup> Dn. Comitis de Zrinio arcem munitissimam, quæ sita est inter Muram & Drauum: nascitur verò istic non modò in siluis caduis, sed etiam gramineis campis. Anno autem subsequente etiam supra Petelstorf in siluis secundo fere à Vienna miliari obseruani. Floret Maio, fructus paulo seriùs maturescit, effluuntque semina quemadmodum in reliquis *Quinquesoliis*.*

*PRIORIS meminisse videtur diligentissimus Anguilara opinione 12. Alterū fortè describit noster Lobelius in doctissimis aduersariis: nostrum tamen flores habet fragaria floribus magnitudine nō inferiores. Poterit autē eodem nomine quo ille suum vocauit insigniri, Pentaphyllon minimū & petræum. Tertio, Pentaphylli alpini flore aureo nomē indidi: licebit verò studiosis pro arbitrio nomen mutare. Cōmodè Quartū dici poterit Pétaphyllon repens minus. Quintū Plinio non incognitum fuisse videtur: Etenim lib. 25. cap. 9. Natural. Hist. sic scribit. *Quinquesolium* nulli ignotū est, cū etiam fraga gignendo cōmendetur. Vulgaris certè fragaria tria duntaxat folia habet, quare ad eam plantam cuius Plinius iā dicto loco meminit, minimè referri posse arbitror. fructus verò huius, esui nō admodū aptus, facit, vt *Quinquesolium* Plinij esse nostrū hoc quintum, asserere non auserim. Quæ autem postea addet, ad *Quinquesolium* vulgare proculdubio spectant. Vt ut sit, hoc meum Pentaphyllon fragiferum tantisper appellabo, donec aliud aptius nomen mihi aut aliis succurrat.*

*Porro*

Porro neminem existimare velim hoc meū idem esse cum Pentaphyllo supino Tormentilla facie, cuius iconem & historiam in suis obseruationibus Lobelius exhibet. Nam illud etiam frequens est agro Viennensi in extremis pratorum marginibus secundum siluas: & nōnihil affinitatis cum Anserina Tragi, seu Potentilla Fuchsi habere videtur, tametsi neque incanum sit, neque repat.

Pentaphyllū  
supinum po-  
tentillæ facie.

## DE CARYOPHYLLATA MONTANA.

## CAP. IIII.

Dvo Caryophyllata elegancia genera in harum Prouinciarum montibus inueniuntur à vulgari diuersa, quorum historiā Quinquēfoliis subiicere volumus.

PRIMUM radicem habet digitali aut polliceri interdum crassitudine, summa tellure crescentem, crasso & purpurascente cortice tectam, impense adstringentem, nodorum vestigiis, quemadmodum in Acori radice alternatim distinctam, antèrius uti illa progredientem, & multis nigricantibus fibris odore non inuicundis & proximè ad vulgari radices accedentibus firmatam, suprema parte in aliquot capita diuisam: vnde oblonga ut in Eupatorio emergunt foliorū ala, multis minoribus, virentibus & in ambitu serratis foliis nunc æqualiter, nunc confuso ordine vtrinq̃ue nascentibus constantes, extrema ala in maiora tria folia aliquantulum per oras laciniata, & ut reliqua in ambitu serrata semper desinente, quorum tertium & postremum reliquis maius est, & magis orbiculare gustu exsiccante: inter has alas emergunt pedales, aliquando etiam maiores caules, firmi, rotundi, breuioribus minoribusq̃ foliorum alis lata sede eos amplectentibus obsiti, superiore parte purpurascētes, in aliquot ramulos simili colore pradios & deorsum inflexos siue natantes diuisi, qui propen-

I.  
Caryophylla-  
ta alpina nu-  
tante flore.

dentes



clentes sustinent flores, quinque ut plurimum foliis nunquam senis aut septenis suauiter rubentibus constantes, orbiculatis fere, at vngue oblongiore & angusto, nunquam se explicantibus, aut calyculum superantibus, sed quodammodo ipso inclusis, medium occupante villosa congerie luteis staminulis obsita, qua paulatim purpurascentem colorem contrahit, & tandem sese erigens & explicans, maturitate semen ut in vulgari Caryophyllata cui inhaeret ostendit. Tota planta cum suis etiam calyculis lanugine pubescit.

Crescit media fere montium regione locis vdis & riguis cum Sanicula proximo capite describenda & Ranunculo platyphyllo sub arboribus. Floret istic Iunio: at in hortis Maio, vel etiam maturius interdum.

SIMILI etiam propemodum radice serpit. Alterius radix, superiore non minor: at raro in tam multa capita extuberans: è quibus multa similiter foliorum alae nascuntur superioribus non breuiores, sed frequentioribus minoribus foliis in ambitu serratis utrinque ornata, unico dantaxat, & quodammodo circinato folio, in tres tamen plerumque lacinias diuiso & in ambitu serrato extremam alam occupante, qua splendet & dilutius virescit quam primi generis: nascuntur etiam inter ea pedales rami superiore graciliores, & minoribus magisque laciniatis foliis obsiti, singulares plerumque, nonnunquam etiam plures calyculos sustinentes, in quibus flores aurei, quinque foliis vulgari maioribus praediti, floris Cisti femine amplitudinem interdum aquantes, medium occupantibus multis luteis staminulis, inter quae latet villosa quaedam coeries, quae excusso flore sese explicans mollior est superiore, & semen planum adnatum ostendit, quod maturitate fuscum est. Tota etiam haec planta lanugine obsita est, & adstrictioris facultatis.

II.  
Caryophyllata alpina  
reco flore.





## Caryophyllatæ I I. flores.



Hoc genus in summis duntaxat iugis, nec in omnibus  
tamen, sed inter gramina vel sub fruticibus nascitur.  
Floret istic Iunio, Augusto semen maturum est: in hor-  
tis maturius cum superiore.

MERITO his coniungenda est elegans hac planta, III.  
quam nascentem nunquam conspexi, nec is qui iconem  
suis coloribus depictam mihi communicavit Pennaeus  
noster: sed ex C. V. Conradi Gesneri depicto herbario  
desumfisse fatetur.

Geum aqua-  
ticum Gesneri.

Folia quidem Caryophyllata sunt, sed an lanugine  
pubes-



pabescant, ex pictura colligere non licet, quemadmodum nec qua sit radice prædita, nec qualia sint qua ex ea emergunt folia: soli enim caules cum floribus fuere depicti, qui sanè elegantis & sanguinei sunt coloris veluti *Byzantinus ranunculus*. Duorum autem est generum: nam alter flos multiplici foliorum textura & serie constat, alter simplici, utriusque medium, quemadmodum in aliis *Caryophyllatis*, occupante villosa congerie.

NVLLE vulgare nomen istarum plantarum intellexi: sed secundum genus à Matthiolo describitur *Caryophyllata montana* nomine commentariis in 4. lib. Dioscoridis: pictura tamen non admodum feliciter est expressa. Tertia iconi adscriptum fuit *Genum aquaticum flore simplici & multiplici*.

## DE SANICULA MONTANA.

## CAP. V.

TAMETSI non ignorem *Auriculas ursi* vulgo nuncupatas *Sanicula alpina* aut *montana* nomine à nonnullis appellari: de iis tamen hoc capite minimè sermonem institui (nam inter *Primulas* descriptæ sunt) sed de alio quodam *Sanicula* genere alpinis familiari, quod ob elegantiam negligendum non fuit.

HABET verò id multa folia circinata fere rotunditatis, saxifraga aurea æmula, oblongis pediculis inharrentia, per ambitum incisa, superne viridia, inferne aliquantulum exalbida & valde hirsuta, sapore adstringente: caules deinde promit pedales, aut interdum ampliores, virides, hirsutos, & in his folia superioribus respondentia: summi caules in plures alas diuiduntur, & singulis ramis insident terni aut quaterni flosculi odore oxyacantha, quinque foliolis albis cōstantes, quæ veluti sanguineis punctis interiore parte distincta sunt, capitulis bifi-

I.  
Sanicula mō-  
tana siue  
guttata.



lis bifidis cum decem staminibus medium florem occupantibus: continent verò ea capitula Saxifraga alba vulgo appellata capitulis perquam similia per maturitatem semen minutum & exile admodum, nigrum: radix multis fibris candicantibus prædita est, & à lateribus propagines agit.

Crescit in omnibus harum Proninciarum alpibus loco umbroso, hoc est ubi plerumque silvæ in Alpium iugis desinere incipiunt, cum Ranunculo platyphyllo, Geranio primo, siue pullo flore, & similibus stirpibus quæ umbra quàm Sole magis gaudent. Floret Junio, interdum etiam serius, in hortos verò translata, multo maturius.

SIMILE fere genus invenitur in Snealben, vicinisque alpibus: sed minus, angustiore folio, & per extremum serrato, hirsuto etiam & gustu adstringente, colore ex herbaceo pallescente: è medio foliorum prodeunt cauliculi dodrantes, nudi, qui circa summum in plures ramulos sese explicant candidis flosculis superiori similibus onustos, verùm sanguineis guttis haudquaquam, ut illi, aspersis: capitula deinde succedunt, quemadmodum in superiore, bifida, exiguum nigricans semen continentia. Floret Junio, in hortis autem Maio, aut etiam maturius.

II.

Sanicula montana minor.

MIHI Prior aliquando missa fuit Ferraria Machliniam à Cl. V. Alphonsò Pancio, Saniculæ guttatae nomine, quoniam eius flores, uti dixi, sanguineis veluti maculis aspersi sunt: Dubito an ea sit quam Lobelius in Aduersariis Genum alpinum vocat. Montani pastores & venatores Weys & anikel appellant. Nullum autem, quod sciam, nomen vulgare Altera obtinuit apud ipsos: sed cum plerisque aliis negligitur.

Quibus verò facultatibus viraq. sit prædita, nòdum intellexi.

e s

ABVN-

Diapensia.

Alchimilla.  
Saxifraga au-  
rea.Saxifraga al-  
ba.

ABVNDANT etiam Pannonia utriusque & vicinarum Prouinciarum prata, umbrosa silua, & montes, Sanicula vulgari Diapensia dicta, Sanicula femina Fuchsj, quam utramque Vngari Sanicor appellant, Alchimilla, & congeneribus plantis: & ad montium radices locisque aliis humidis & umbrosis Saxifraga aurea cognominata: aperti autem gramine confiti colles Saxifragam albam tuberosa radice alunt, cui, quas modo descripsi, congeneres videntur.

De SANICVLA alpina siue montana altera.

## CAP. VI.

NAT'ALIVM communio facit ut hanc elegantem plantam Sanicula iam descripta subiiciam, tametsi temperamenti & facultatum ratione commodiorem proximum ab Auriculis locum forsitan obtinuisset.

I.  
Sanicula al-  
pina rubro  
flore.

MVLTa folia promit nouo vere satis crasso pediculo nitentia, adeo sese per oras initio contrahentia, prona parte, ut orbiculata videantur, admodum nervosa & rugosa, atque supina parte tumentia & crispa ut Lusitanici ranunculi, aut Lactuca capitata folia, deinde ubi sese explicarunt in ambitu non modo serrata, sed etiam in sex aut plures lacinias diuisa, omnino virentia, supernè quodammodo splendentia, infernè minimè, gustu feruido: inter qua palmaris exit cauliculus, firmus, erectus, nudus & sine foliis, subpurpurascens, qui in summo Primularum & Auricularum instar è medio quorundam foliorum capite, octo, nouem, aut plures producit flosculos concavos, campanula modo pensiles & deorsum spectantes, quinque crenis diuisos eleganti rubro colore intensiore & ad purpuram tendente, fundo interiore albo, & quinque angulis praedito, prodeuntibus ex imo quinq. staminulis luteis album fundum non  
superanti-

*Sanicula montana altera.*



superantibus, & medium oblongum stilum complectentibus, odore suaui, quemadmodum fere Auricula vrsi rubra siue secunda flores: quibus defluentibus succedunt capitula, tenue, fuscum, ut illa, semen continentia: radix numerosis, oblongis, tenuibus, & nigricantibus fibris ex vno capite prodeuntibus cōstat, singulis annis ad latera augescens & incrementum sumens, ut temporis successu veluti Auricula & Primula aliaque similes in plures stirpes diuidi & pangi possint. Tota planta hirsutior lanugine pubescit.

Promiscuè nascitur cum superiore, & interdum, quando adhuc tenella est, altera pro altera eruitur: eodem etiam tempore cum illa floret, licet in hortis hac paulo maturius, videlicet Maij initio.

Cortusa Matthioli.

ILLAM esse omnino arbitror quam C.V. Matthioli ab ampliss. Cortuso acceptam Cortusam nuncupauit, & Caryophyllatis subiicit: verum cum neque facie, neque temperamento ullam affinitatem cum iis habere videatur, commodius meo iudicio Auriculis, ut dixi, coniungetur, quibus dissimiles nō habet facultates. Eam autem florum varietatem quam ipse in Cortusa inueniri scribit, in hac nostra nondum deprehendi. Sed illud obseruaui peculiare quoddam exigua eruca & virentis atque tumida genus in ipsa gigni uberrimè.

## DE DENTARIIS VVLGO DICTIS.

### CAP. VII.

SANICULÆ nomen aliam plantam hic subicere me cogit, quæ Viennensi agro à plerisque rusticis vicinarum silvarum & montium incolis Sanicula etiam appellatur: tametsi ad Dentarias potius referri debere videatur, cui alia similiter genera coniungemus.

I. Dentariabacisera.

OBLONGA autem serpit Prior radice, dentata, & veluti



veluti ex multis geniculis constante, alba, interdū etiam purpurascente, subinde ex lateribus novas propagines generante, sapore ingrato & linguam primū siccante, deinde acri: ex cuius lateribus prodeunt folia oblongo pediculo & costā (quæ secundum terram purpurascit, postea viridis est) inherētia, quina plerumque, interdum plura, inter se opposita maiore ex parte, alteraque tantum latere crenata, eo quod imparem numerum facit & extrema costā insidet, duntaxat utrinque crenato, gustu primū acido, postmodum acri & feruente: caulis cubitalis est, gracilis, nudus, quem circa medium bina aut terna alæ, interdum plures, ex tribus solum foliis modò descriptis respondentibus cōstantes ambiunt, superior verò pars oblongis angustisq; foliis, nunc leuiter, nunc minimè crenatis, confuso ordine obsita est: extremo cauli insident quaterni, quini, aut plures flores, *Leucoij* aut *Hesperidis* florum amuli quidem, sed minores, quatuor foliis albis, aut ex candido leuiter purpurascentibus præditi: quibus succedunt siliquæ *Sinapi* fere amulæ, breuiores tamen, quæ unā cum suis pediculis inanes plerumque decidunt & percutunt, nonnunquam tamen crassiores euadunt, semēq; ferunt *Hesperidi* fere simile, aut iis *Dētariis*, quas *Cl.V. Remb. Dodonæus Cass. Maximiliani* 11. & *Rudolphi* 11. olim *Medicus* veteri amicitia mihi coniunctus in *Appendice Purgantium* historia exhibet, quod dissiliētibz siliquis excutitur. Sed præter id semē, ad singulorum fere foliorum quæ caulem ambiunt alas & exortum tubercula quædam adnascuntur bulbulis *Martagonis* vulgo vocati, siue *Lily rubri* bulbiferi haud absimilia, ac veluti ex squāmis cōpacta, initio viridia, deinde nigra aut pulla, ingrati admodū saporis: ea verò facilius decutiuntur, sponteq; prematura decidunt, & terra sepulta nouellas plantas gignunt.

Pro-

Prouenit in utriusque Pannonia vicinarumq<sup>3</sup> regionum opacis siluis: atque, uti arbitror, totius Germania montanis saltibus. Nam ante annos triginta cum Cl. V. Andrea Hyperio in silvis nō procul Marpurgo sitis eruere memini: & Doctiss. Ludouicus Joachimi F. Camerarius in Misnia inueniri mihi significauit. Floret autem Aprili: Bulbuli Maio nigricantes conspiciuntur.

ALTER A pedalem profert caulem, firmum, rotundum, lenem, quem in summo fere ambiunt tres pediculi (rarissimè quatuor) singuli terna folia sustinentes, ampla, mucronata, in ambitu serrata, saturatius virentia, gustu feruido: summum caulem exornant quini aut seni flores quatuor foliis constantes, *Dentaria heptaphylli* amuli, colore ex herbaceo pallecente, deorsum spectantes; flores sequuntur oblonga cornicula, torosa, mucronata, qualia sunt *Dentariarum Pentaphylli* & *Heptaphylli*, iam memoratarum, & in his etiam simile semen, hoc est *Hesperidis* fere, sed crassius atque virescens, quod dissiliētibus corniculis exilit ante quam probè maturum videatur: alia item folia à radice profert, terna tantum in singulis oblongis pediculis nascentia, superioribus multo ampliora, sed breuiora: radix nouella alba est, vetusta nigricat, multis articulis sic distincta, ut è plurimis dentibus coagmētata videatur, *Dentaria ἀφύλλου* radici haud absimilis.

II.

*Dentaria*  
ἰπ: ἀφύλλου.

Exit in utriusque Pannonia umbrosis siluis nō modò ad montium radices, sed etiam circa mediam eorum regionem, ubi praaltarum arborum siluae plerumque in Alpibus desinere solent. Inueni & ultra Drauum, in monte Grebén imminenti cum primo genere: atq. etiam in Hercinia silua Bohemiam ambiente.

Floret Aprili vicinis Vienna locis, & aliis humilioribus: se-



bus: semine pragnans est Maio & Junio: ast in montibus serius floret.

NIHIL habet cōmune cū superioribus Tertia, praeter dentatam radicem. Tota autem tenella est, & canaliculum promit dodrantalem, aut paulo ampliorē, succi plenum, & quasi transparentem, candicantem, sine foliis, sed veluti quibusdam articulis distinctum: flores promit in summo binos aut ternos, alternatim dispositos, ex albo purpurascētes, nigra viola siue potius orchidis florum amulos, admodum tenellos: radix cādida e multis veluti denticulis congesta est.

III.  
Dentaria  
αφύλλος  
altera.

Florentem Augusto mense inuenimus ad radicem Etscheri iugi, dum illud anno Domini 1578. per siluam conscenderemus, sub abietibus aliisq; huius generis arboribus quò sol vix unquam penetrat, nullaq; fere alia stirpes nascuntur.

QUARTÆ flores minores sunt, orchidis pumila floribus pares, similiterq; ex herbaceo palleſcētē (labro tamen propendente exalbido, & circa umbilicum purpureis radiis insignito) inodori, quinque aut sex, spica in modum in dodrantali caule enascentes, qui foliis caret, & veluti subfuscis vaginulis reconditus est: radicē habet ramosam corallij modo, omnino candidam, succi plenam, nullis fibris coherentem, sapore amarissimo.

IIII.  
Dentaria  
αφύλλος  
tertia siue  
κοραλιοειδής.

Hanc duntaxat obseruavi anno 1580. in silua recens caesa paulo supra Entzeſtorf Generosi Dn. Wolfij Christophori ab Entzeſtorf arce, Maio mense florentē.

HARVM regionum incole Priorem appellant Weyß Sanickel, id est Saniculam albam: rhizotome verò muliercula, quæ multas stirpes in Viennensi foro venales proponere solent, Grimwurtz, nomine ab effectu sumto vocant, quòd pueris tormina patientibus eius radicis decoctum propinatum vtile esse credatur. Ego

Dentaria coralloideradice. III.







Dentariam bulbiferam siue bacciferam appellari posse arbitror: videtur autem ea esse quam Corais l. b. Histor. stirpium 2. cap. 111. Coralloidem appellat. Alteram Dentariam ενράρυλλον cognominavi, quoniam summo caule novem folia profert. Tertia mihi erit Dentaria ἄρυλλος altera, seu minor, ad Anblati Cordi vel Dentariae maioris Matthioli differentiam, quam Dentariam ἄρυλλον primam vel maiorem posthac nominare licebit. Ea autem frequēs est in Leytano saltu siue Leytenberg supra oppidum Manderstorf, & Viennensi silva, ubi Aprili flore carneo pulcherrimo & iucundissimo onusta conspicitur, inter frutices loco umbroso nascentis: atque à rhizotomis mulierculis S<sup>r</sup> Georg wurtzel, S<sup>r</sup> Georgij radix nuncipatur. Quarta nullū vulgare nomen apud rusticos inuenit: sed ἄρυλλος κοραλλοειδής, à radice, quæ corallini rami speciem refert, non incommode cognominari poterit.

CETERVM Dentaria minor Matthioli, & Coralloides altera Cordi a nonnullis existimata in Alpibus supra Lacum Lemanium ante 28. annos a me sunt observata: in Pannonia verò nusquam eas conspexi. Prior Dentaria πεντάρυλλος, posterior Dentaria ἐπτάρυλλος, meo iudicio non inepte vocari possent. Nam una quinque foliis uni pediculo inhaerentibus prædita est: altera septena plerūq. folia in una costâ ex aduerso nascentia habet, quemadmodum & baccifera, dissimilia tamen.

UTRIVSQUE huius generis meminit Josias Simlerus ad finem Commentarij de Alpibus his verbis.

Wildet Dents, herba eius nominis duarum specierum reperitur. Prior uno pediculo septena habet folia, supremo caule multos flores purpureos & partim albos,  
[albos

Dentaria  
ἄρυλλος  
prima.

Dentaria  
πεντάρυλλος.  
Dentaria  
ἐπτάρυλλος.

*Dentaria heptaphyllos* v.

[albos ego duntaxat conſpexi] poſt quos cornicula ſubnaſcuntur ſemen continentia minutum, [non ſatis exactè obſervaiſſe videtur, nam Heſperidis ſemini ſimile eſt] cōpreſſum: radix ſubeſt alba, alabaſtri modo ſplendens, ſquammea. Altera quinque folia habet uno pediculo, [florem qui Heſperidis purpuſcente flore vel lunariæ græcæ inodoræ eſt, minimè obſervaiſſe exiſtimo] alias ſuperiori nō diſſimilis: tota ſubſtātia utriuſque acris eſt, ſinapi emulans aut raphanum. Ad cubiti altitudinem creſcunt, umbroſa loca amant, & latices, primo vere ſtatim emergunt. Aliqui Pulmonariam hanc vocant.

Hæc Simlerus, ea Geſnero, Ioanni Fabricio, & Benedicteo Arctio meo veteri amico accepta referens.

NULLAS porro iſtarū facultates comperī, præter eas quas muliercula primo generi attribuit: & quas Matthiolus pentaphyllo Dentariæ adſcribit in Dioſc. lib. 4. caput de Symphyto commentariis, ubi in potionibus ad enterocelas & ad interna vulnere, præſertim ad ea quæ in thoracis cavitatem penetraverunt, radicum uſum eſſe docet.

## DE CARDAMINE ALPINA.

### CAP. VIII.

ALIVOT Cardamines non vulgaria genera in Pannonicis Noricisque iugis obſervant.

- I. UNUM nigricantibus ex purpura ramulis per terram ſerpit, in quibus oblongo cuiuſdem coloris pediculo terna perpetuo folia innituntur, circa pediculum anguſtiora, & per extremas oras latiora, atque quaſi orbiculata, in ambitu nonnihil crenata, initio tenella & viridia, deinde dura, & nigricantia, guſtu primū acidulo, poſtmodum acri: cauliculi teretes inter folia erumpunt ex

punt ex purpura nigricantes, palmares, nullis aut rarissimis (quæ terna etiam eidem pediculo inhaerent) foliis præditi: flores extremis ramis insident candidi, quatuor foliolis constantes, Cardamines pratensis, quam Fuchsius Iberide nuncupavit, persimiles: his succedunt torosæ & oblongæ siliquæ Dentariarum corniculis fere similes, sed minores, semine etiam minore licet simili plene: radix summa tellure serpit, & subinde parvulus candidisque fibras agit, sic ut faciliè ramulis terra obrutis pangi possit.

Inuenitur in siluosis montibus nudo solo potius quàm herbofo ad Abietum & aliarum præaltarum arborum radices, tota hieme etiam virens.

Floret Iunij initio, in cultis verò etiam Aprili.

ALIUD habet folia elegantissimo ordine in orbem disposita, duorum digitorum transversum longitudine, profundioribus crenis incisa, & laciniata, vultu Sisymbrio cardamine sine Nasturtio aquatico vulgo nuncupato, hirsuta & aspera, superne veluti cinereo colore aspersa, infernè vero viridiora, sapore primum acido aliquantulū, deinde calidiusculo: ex quorum medio prodit calliculus dodrantalis aut amplior, tenuis, albos flosculos in summis ramulis ferens: deinde siliquas teretes, parvas, semen observare non licuit: radix longiuscula est, alba, quibusdam fibris capillata.

Nascitur in scopulis ad monasterium Neuberg (quod alpium iugo illi imminenti nomē imposuit) in Styria inferiore. Florebat Augusto.

MINIMA & tenerrima est Tertiæ plantula, calliculis unciam longis in quibus umbellæ flosculorum candidorum quatuor foliolis constantium: folia alata, ex ternis, quinis, aut sepienis foliolis uni costâ adhaerentibus conflata, viridia,

II.

Cardamine  
alpina media.

III.

Cardamine  
alpina minima.



## Cardamine alpina minima III.



gustū acri & feruido habet: & radicem albam, satis longam, quibusdam fibris capillatam

In ipsis scopulis summi in *gi* Sneberg, dum per niuem glaciali duritie constrictam ferres vnicuique ad pedes alligatis delabor (istic enim quemadmodum & in reliquis vicinis ingis perpetue sunt niues à multis sæculis collectæ, eæque radiis solaribus summam superficiem resolu-



uentibus adeo lubricæ, ut sine uncis per eas ingredi nemo queat) inueni mense Augusto florentem, ubi nives iam primum dissolui incipiebant. Inuenitur autem & in Tirolensibus atque Saltzburgensibus montibus, teste Domino Ioachimo Camerario, qui eam siccam mihi misit.

NVLLEVM nomen vulgare istarum plantarum accepi: sed procul dubio ad Cardamines siue Sisymbry alterius genera referenda sunt. Priorem memini ante multos annos ab Alfonso Pancio nobis missam Machliniæ usque Sanicula trifolia nomine: à quo tempore in nonnullis Belgicis hortis perdurat. Eam commodius meo iudicio noster Matthiæ de Lobel inter Cardamines recensuit, trifoliamq; cognominauit. Tertiã Gesnerus, ni fallor, in Epistolis Nasturtium appellat.

Sanicula trifolia.

Nasturtium.

OBSERVATA mihi alia plantula in Etcheriano iugo scopulis inherens, quam an ad Cardamines an ad Thlaspi genera referre debeam, nondum apud me constitui.

Sinapi pumili. n. alpin.

Sena autem aut septena humi secundum radicem expansa habet foliola Bellidi fere similia, teneriora tamen & leui acrimonia prædita: è quorum medio tenellus prodit cauliculus, paucis foliolis septus, dodrantalis, in cuius summo sena aut septena erant siliquæ oblongæ, duplici serie quemadmodum in Sinapi semen continentes exiguum, planum, rufescens, nonnulla acrimonia præditum: radix summa tellure serpens, noua germina subinde profert.



## DE DRABA.

## CAP. IX.

DRABA satis vulgaris est notitia, & ab aliis etiã descripta: quoniam tamen hic admodum frequens est, non potui eius historiam aliis cõgeneribus stirpibus non adiacere, præsertim cū diuis alias stirpes obseruauerim, sub eius classẽ, meo iudicio, referendas.

I. PEDALES igitur habet Draba caules, striatos, Draba vulgaris. tenues, firmos, quos inæquali ordine ambiunt uncialia folia, in ambitu dentata, basi latiore, ex viridi cinerea, sapore acrisculo, at secundum radicem maiora & frequentia sunt: supremi caules in multos ramulos æqualis lōgitudinis diuiduntur, qui flosculis quatuor albis foliolis constantibus onusti, sambuci umbellam quodammodo representant: floribus succedunt exigua capitula, turgidula, & veluti duobus utriculis constantia, mucrone, qui eos diuidit, prominente, singuli utriculi vnicum semen continent: radix candicans, tenuis, longe lateq; serpit, & fibris quibusdam prædita est.

Nulli fere agrorum margines circa Viennam, totaq; adeo inferiore Austria, hac planta non sunt obsiti, quæ subinde in ipsos etiam agros latè irrepit. Floret Maio & Junij initio. semen sub Iunij finem maturescit.

II. MULTOS ex eadẽ radice ramulos humi fusos pro- Draba altera. fert Prior illa planta Drabæ generibus adnumeranda, qui terra obruti, aut sub illa sese condentes, atque etiam summa tellure serpentes, subinde fibras agunt: y deinde summo capite numerosa folia producunt hirsuta, Drabæ foliis forma & colore similia, sed minora, nonnihil in ambitu dentata, subacido sapore initio, deinde acri: ex horum medio cauliculi exerunt palmares, nonnunquam maiorisculi, recti, teretes, virentes, hirsuti, aliquot minoribus foliis





foliis latiore basi eos amplectentibus donati: flores in extremis cauliculis spicatum nascentes, quatuor albis foliolis constant, quibus decidentibus, plana, oblonga q̄, uti in Sinapi succrescunt filiqua, duplici serie pusillum, planum, rufum semen continentes: radix candida fibrosa q̄, est, ex qua ad cauliculorū exortum alij enascuntur ramuli similibus foliis praediti, in latera sese diffundentes.

Inuenitur in Tauro monte: memini & Ferraria in Belgicā nobis missam ab Alphonsō Pancio, Leucioj montani nomine. Floret maturius superiore nōpe Aprili.

Leucium  
montanum.

FREQUENTIBVS etiam ramulis constat Altera ex eadem radice prodeuntibus, tenuibus deinde in caput extuberantibus, unde aliquot folia quasi in orbem disposita prodeunt, crassa, succi plena, atro virore splendentia, Auricule vrsi quarta (qua flore est coloris carnei) foliis magnitudine & forma fere respondentia, sed nonnihil in lateribus dentata, acri gustu, & illi colinguiam vellicante: ex horum medio pedalis aut maior prodit caulis, gracilis, quem per intervalla ambiunt & amplectuntur folia superioribus minora, & ad pediculum latiora: flores spicatum supremum caulem ambiunt uti in priore, & quatuor albis foliolis constant, quibus succedunt teretes & oblongae filiquae, duplici ordine rufum, pusillum & planum semen continentes: radix tenuis & repens latē sese diffundit, & novas plantas producit, ideoque vivax & perennis.

III.

Traba tertia  
succulenta.

Crescit in declivi montis Herrnalben supra Zeehof. Tota hyeme viret: montanis locis serò floret; at in hortos translata, maturius cum precedente, nonnunquam etiam ante hyemem. Ea forsitan est quam Lobelius in Appendice exhibet, pag. 463.

SPONTE etiam producant plerique colles lapidosi Turcia.  
Turri-



*Turritam vulgo appellatam, inter Sinapi genera forsitan referendam.*

## DE THLASPI MONTANO.

## CAP. X.

AD eandem classē pertinet *Thlaspi*, cuius quadam genera in Pannonia observavi: nunquam antè mihi conspecta.

PEDALICAULE Primum assurgit, nonnunquam altiore, gracili, firmo, foliis fere *Brassica campestris*, minoribus & mollioribus, supernè virentibus, infernè candidantibus, odore propemodum allij: flos extremis ramulis copiosus, albus, quatuor foliolis constans, odoris expers: quibus decedentibus, lata, planaq; propendent siliquæ, non bifide ut in aliis *Thlaspi* generibus, sed circinata fere rotunditatis, & in orbē peltæ modo efformata, unicum in ipso centro continentes semē, flavum, gustu amaro & acri: radix alba, tenuis, interdum summa tellure serpens, & nova germina profrens.

I.  
*Thlaspi montanum peltatum.*

Inuenitur locis umbrosis ad arcem *Stichenstain*, & qua iter est ab ea arce ad *Sneberg*, nusquam alibi mihi observatum: nunc verò mea opera, missis hinc eius plantis & semine Belgicis & Anglicis hortis inquilinum factum. Floret Junio, semen Julio & Augusto ad maturitatem peruenit.

Illius iconem tametsi non admodum feliciter expressam, ne *Typographum* nimis expensis gravaremus, retinere libuit, & hic inferere.

NUMEROSA sunt Secundo folia, humi strata, parva, crassa, atròue virore nitentia, & quasi castia, *Globularie*, siue *Aphyllanthi* *Angularæ* proxima, cuspidè orbiculata, acri gustu: caules plures, rotundi, pedales, aut minores, foliis stipati paulo brevioribus, & viridioribus.

II.  
*Thlaspi bidentale.*







dioribus, & onusti floribus albis ex quatuor foliis compositis, quibus succedunt compressa siliqua, Thlaspi vulgaris vasculis similes, in quib. semē subnissum. Thlaspi cretico simile, sed minus: radix candicans, fibrosa, & lateribus in propagines sese explicans & fundens.

Prouenit in decliui montis illius glabri, qui urbi Badensi (in qua calidarum aquarum scaturigines sunt) imminet, quarto à Vienna miliari. Floret Aprili, semēque profert Maio & Iunio.

### III. TERTIVM singulari assurgit caule, dodrantali,

Thlaspi montanum minus

raro maiore, aliquot foliis supra terram sparsis, campestri Brassica mihi in Hispanicis observationibus descripta forma & colore similibus, sed longè minoribus, quæ per caulem sparguntur, rara sunt, latioreque basi ipsum quodammodo amplectuntur, Brassica cæpesiris modo, gustu aliquantulum acri prædita: flores pusilli, albi, quatuor foliis constantes summis cauliculis insident, deinde compressa capitula Thlaspi cretico similia, superiore parte fissa, duobusq; utriculis planis constantia, & in singulis bina aut terna granula flanescentia acri sapore prædita continententes.

Crescit in petris & siccis quibusdam, umbrasis tamen Austria collibus. Floret Aprili, semen Maio maturum est.

VULGARE nomen an habeant, & utrum in medicū usum adhibeāt huius regionis incolæ, non intellexi.

NASCITVR etiam plerisque huius Provincia locis secus vias, & agrorum margines, gramineisque incultis locis, non minus quàm in Belgica, Thlaspi genus aliud, quod nonnulli Mechliniense cognominant, quoniā iuxta urbem Belgicæ Machliniam plurimū nascitur.

Thlaspi incanum siue Mechliniense.

Habet verò folia unciam longa, dimidiam lata, in e-

qualiter







qualiter caulem pedalem aut ampliore amplectentia cinerei coloris, acris saporis: caules in ramulos diuisi albos flores proferunt, quatuor bifidis foliis constantes, umbellatim quasi nascentes: radix albicans, & quibusdam fibris sub terra latè serpens.

Thlaspi cly-  
peatum.

SED & supra Badenses thermas vicinisq; collibus, & in Leytenberg supra Manderstorf copiose nascitur illud Thlaspi genus foliis hirsutis, laciniatis flore in tenuibus ramulis, summisq; cauliculis ex luteo pallescente, deinde binis folliculis clypeatis subnascentibus, quale noster Lobelius in Aduersariis describit.

## DE ALYSO MINIMO.

### CAP. XI.

Alysum mi-  
nimum.

MULTOS ex eadem radice (interdum unicum tantum) ramulos proferre solet dodrantaes, tenues, plerumque purpurascetes, per quos sine ullo ordine sparsa sunt numerosa foliola, lini foliis haud maiora, incana, gustu subacido, & salinam quodammodo ciente: summi ramuli coma flosculorum exornantur, quinque perpusillis luteolis foliolis constantium: ea coma paulatim veluti in spicam explicatur, floribusq; succeant orbiculares & compressae quidem, sed in medio turgentes peltulae, primum virides, deinde subflauae, semen exiguum continentes: radix candicat, & fibrosa est, licet annua.

Nasquam non crescit Viennensi agro, ad aruorum, vinetorum, viarumque margines, & siccis atque gramineis agris non modo Austria, sed etiam Pannonia. Floret toto Aprili, interdum etiam Maio.

DE AN-



## De ANDROSACE altera Matthioli.

## CAP. XII.

ANIMVS non fuerat, istam in hos commentarios inferre, eum à Matthiolo sit exhibitum. Verum cum illius duntaxat iconem, & eam quidem non admodum scite expressam, nulla insuper ipsius historia tradita, ediderit: eam describere non pigebit, ut rei herbaria studiosi pleniorẽ illius cognitionem consequi possint.

Androsace  
Matthiolo  
credita.

MVLTÆ sunt illi folia humi expansa, Plantaginis æmula, sed minora, trineruia, colore ex viridi pallescente, in ambitu dentata Ilicis foliorum modo fere, sed mollia, succulenta, & sapore aliquantum calido: inter quæ semi, & plures interdum assurgunt cauliculi, dodrantales, herbidi, nonnunquam purpurascens, nudi, subhirsuti, qui in summo corollam sustinent quinque ut plurimum rotundorum foliorum, nonnihil etiam dentatorum & lanuginosorum, unde quini aut plures emergunt pedicelli calyculum ferentes herbaceum & lanuginosum, quinque etiam foliolis constantem, & in medio stulosum albū quinquepartitū diuisum, deinde in vasculis crassiusculis semine inaequale rufum: capitella cum foliis præmansa, adstringente primū gustu, & paulo post subamara & calidā deprehenduntur: radix unica, tenuis, alba, aliquot tenuibus fibris capillata.

Hanc cūr Matthiolus ex Syria maritimis accersierit non video, oūm in hac Prouincia facile inuenire potuisset, si diligens Austriacarum stirpiū, dum hic versaretur, scrutator fuisset: etenim copiose nascitur inter segetes circa Badenses thermas suprà memoratas, & locis Viennensi urbi vicinis. Sed Syria maritima (in quibus haud scio an nascatur) illā in Germaniā vsq. mittere debuerunt, quoniā Dioscorides iis locis Androsacem gigni tradit.

Annua



*Annua est, & Aprili floret, semen verò Maio & Junio maturefcit.*

## DE LYSIMACHIA.

## CAP. XIII.

PRÆTER *Lysimachias vulgares cum lutea, tum purpurea, & siliquosis cognominatis, quarum alie annua duntaxat, alie perenni & longè lateq; serpente radice donatæ sunt, & inter has, quæ à C. V. Conrado Gesnero Chamænerion vocata, flore niueo interdum inuenitur, tum quæ caruleo est flore (nam & hæ omnes in Pannoniis & vicina Austria vel secundum riuos, vel in montanis prætis sponte nascuntur) dua alia genera obseruari minimè ab aliis descripta.*

CVBITALI plerumque assurgit Prima *Lysima-* I.  
*chia caule, interdum etiam ampliore, firmo, duro, lanu-* *Lysimachia*  
*ginofo, & hirsuto: hunc ambiunt quadam serie quater-* *altera flauo*  
*na plerumque simul, nonnunquam etiam terna aduer-* *florè.*  
*sis inter se pediculis, folia, mollia, aliquantum incana, al-*  
*terius luteo flore foliis minora, sapore acido primum, de-*  
*inde salinam ciente, inferna parte nigris punctis distin-*  
*cta: circa summum caulem ex singulorum foliorum sinu*  
*prodeunt modò ramuli cum aliquot floribus, modò bini*  
*flores, summo verò fastigio singulares, lutei, cum quadã*  
*grauitate odorati, veluti quinis mucronatis foliis con-*  
*stantes, sed qui tamen infima sede coherent, & simul de-*  
*fluunt, cum toridè staminibus luteis: radix geniculata,*  
*ex singulis vt plurimũ geniculis nouas propagines pro-*  
*ducens, & subinde agēs, quibus telluri firmiter inhaeret.*

*Crescit in Alpium conuallibus & pratensibus locis, atque etiam in quibusdã caduis siluis, quæ ad montium radices sunt, plurima: similiter non procul Vienna plerisque locis secundum aquas. Floret Junio.*

HVMIL.







*Lysimachia*  
minor rubro  
flore.

- II. HUMILIOR est Altera vulgari rubra siue purpurea, cubitalem altitudinem raro superans: caues teneriores, graciliores, quadranguli, cacumine in plures ramulos ex opposito inter se nascentes duri si: folia vulgari minora & angustiora, sibi inuicem opposita, si mordeantur gummosa, deinde nonnihil acrimonia & amaritudinis exercentia: qua in summis ramulis sunt, confuso ordine siue serie nascuntur, inter qua calyculi rariores, minores, neque adeo barbati aut verticillati caulem ambietes vt in vulgari, plerumq; hexagoni, ex quibus flos prodit sex foliolis constans, colore rubro, aliquot staminulis ex umbilico prodeuntibus: radix dura, lignosa, multos caules singulis annis proferens, & subinde lateribus se propagans, & multis fibris inherens.

Prouenit multis Pannonia locis in humidis pratis & Danubij insulis. Floret cum vulgari Iunio & Iulio.

NON dubium est quin ad *λυσισμαχία*, *Lysimachia* genera vtraque hac planta referri debeat: adeo illi facie sunt similes.

## DE BISTORTA MINORE.

### CAP. XIII.

*Bistorta pu-*  
*mila.*

CAVLICVLVM promit dodrantalem, tennem, geniculatum, & in summo exiguum candicantium florum spicam: folia vulgari Bistorta multo minora, unguis humani latitudinem raro excedentia, interdum tamen paullo maiora & longiora, dura, venosa, supernè virentia, infernè verò incana non secus ac in vulgari: excusso flore grandior paullo subinde fit spica, qua plerumque simili cum maiore semine onusta est, interdum tamen seminis loco multa viridia foliola profert: radix vulgari longè minor, contorta tamen & geniculata, foris nigricans, intus alba, multis tenuibus fibris



bris capillata, gustu, vti tota planta, adstringente.

Nascitur in summis Austriacarum & Syriacarum alpinum iugis tenui gramine vestitis: floretq; Iulio. In hortos verò translata (ubi formam & magnitudinem non immutat) maturius.

Bistorta vulgaris.

Inuenitur quandoq; iisdem in iugis, attamen depressiore loco, & circa scopulorum radices. Bistorta maior, qua vulgo in hortis ali solet.

RVMICIS porro, qui huic planta congener est, non minus varia his in Prouinciis, quam in aliis regionibus genera inueniuntur.

Oxalis amplifolia.

AT ð&æalid & Oxalidis genus in iugo Wechsel inueni satiuo multo amplius, & foliis admodum magnis: cui hoc peculiare est, vt in caulis geniculis subinde nodi quidam & veluti tubera adnascantur, e quibus sese tandem folia explicat: ea terra obruta sui generis plantas proferunt.

Lapathum rotundifolium.

NASCITVR etiam in omnibus illis iugis, præsertim circa humidiora loca in quibus armenta, qua æstiuis illis mensibus istic aluntur, ad aquationem conuenire solent, frequentissime magnum illud Lapathum amplis & circ:natis foliis, quod nonnulli Rha perperam esse existimant. At non habet radicem, vt vulgo pingitur Raphani aut Hippolapathi modo in terram recta descendenti: sed summa tellure Acori fere & Iridum in morem, iacentem, brachiali interdum crassitie, fibris subinde se firmantem, antèrius vt Acorum, & Polygonata augmentum sumentem & progredientem, intus ex luteo purpurascensem. Ea resiccata Rha substantiam emulatur, nec minus eo inficit.

DE COR.

## DE COTYLEDONE ALTERA.

## CAP. XV.

ALTERIVS *Cotyledonis* nomine intelligo *Sedum* Sedum malus  
vulgare.  
maius vulgare, cuius in Pannonia montanis alia inue-  
niuntur genera nulli Scriptori quod sciam è Neotericis  
observata.

PINGVIA, crassa, numerosaque habet primùm fo- I.  
Cotyledon al-  
tera montana.  
lia, circa radicem densa, Acetabulo alteri, seu Semper-  
vino vulgari similia, minora tamen, & per ambitum le-  
niter quasi dentata, succulenta et gustu acido: inter quæ  
multa in ambitu capitella ex similibus sed minoribus  
foliolis congesta exoriuntur, longo pedicello inherencia,  
quæ tandem augeſcunt atque in plantas efformantur:  
ex ipsius matris umbilico emergit caulis dodrantalis,  
foliosus, rectus, ferens in ramulis, alterius Acetabuli  
modo, florem albicantem, magnum, sex foliis constantem,  
cui succedunt siliquæ totidem angulis discreta, semine  
exili plena: radix Sempervino vulgari similis, candi-  
cans, minus crassa, & subinde novas plantas præter iam  
memoratas è lateribus fœdens.

Frequens est in omnibus ingis urbi Viennæ vicinis  
atq. in Austriacis Pannonicisq. alpibus. Floret Julio.

Invenitur eius alia species in omnibus minor, cuius 2.  
etiam folia magis dentata sunt.

CONFERTIS, frequentibus, pinguibꝫque suc- II.  
Cotyledon  
altera taurica.  
crassis atq. in orbẽ digestis est etiam Alterũ foliis, supè-  
riore tamen minoribus, nec dentatis, tametsi nonnihil  
hirsuta appareant, sub quibus è radicis capite alia in  
orbem similes plãta crassis fibris prædita sese propãgant  
& radices agunt: è matris umbilico dodrantalis, non-  
nunquam & palmaris exilit caulis, succulentus, rubef-  
cens, multis crassis succiꝫque plenis & mucronatis foliis  
h cinctus,





cinctus, angustioribus quàm superiora, & mucrone pur-  
 purascente, qui suprema parte in ramos diuiditur, mul-  
 tis floribus superiori forma similibus onustus, minoribus  
 tamen, duodenisque magna ex parte angustis mucro-  
 natis stellaque in modum decussatis foliis constantibus,  
 colore ex rubro purpurascente, totidem siliquulis in ca-  
 put & veluti in coronam compactis floris umbilicum  
 occupantibus, & vicenis quaternis staminibus eam am-  
 bientibus: semen in siliquulis adeò exile, ut visum pro-  
 pemodum effugiat: radix mediocriter crassa & fibrosa  
 alterius Cotyledonis modo. Planta quæ florem tuler-  
 unt tum in hac, tum in superiore intereunt, succeden-  
 tibus matri reliquis in orbem prolibus, ut in reliquis  
 Cotyledonis alterius generibus.

Crescit in Taurinarum alpium ingis non procul à  
 Saltzburgo. Floret istic Iulio, in hortis etiam Maio,  
 cum reliquis eius generis stirpibus.

NUMEROSA & conferta huic sunt folia, oblon-  
 gis ligulis similia, crassiuscula, mucronata, nonnihil  
 per ambitum crenata, candicantia, gustu acido & sub-  
 adstringente: è quorum centro, seu medio foliorum ex-  
 ortu caulis plerumque cubitalis assurgit, vel pedalis  
 duntaxat, superiore parte hirsutus, brevioribus foliis  
 hinc inde septus, qui in summo ex singulis foliorum alis  
 pedicellos emittit, quibus insident bini aut terni flores  
 colore candidi, è quinque foliolis compositi, interne ve-  
 luti sanguineis guttis aspersi, umbilico pallido & splen-  
 dente, quem decem staminula ambiunt; semen deinde in  
 capitulis perexiguum, nigrum: radix subest nigra, te-  
 nuis, fibrosa, cui secundum matrem multe alie in orbem  
 adnascuntur planta, ut integrum cespitem interdum te-  
 gant vulgaris Sedi modo.

Nascitur nò modò in Sneberg, sed & in reliquis Au-

III.

Cotyledon  
 altera Mata  
 thiol.



*stria & Styria alpibus, saxis & scopulis inharens.*  
*Floret Junio Iulioque: aſt in hortis Maio: ſemenq<sup>3</sup> pro-*  
*fert Iulio aut maturius.*

2. *HVIVS aliud genus inuenitur mollius in Eſche-*  
*rianis ingis, quod anguſtioribus & longioribus foliis*  
*eſt, minime dentatis, ſed lanugine alba duntaxat hirsu-*  
*tis, minus incanis, cauliculo breuiore, craſſioreque &*  
*multis foliis ſepto, qua plerumque tam ſupernè, quàm*  
*infernè ſubhirsuta ſunt: paucioribus floribus hinc inde*  
*ſecundum caulem ad ſingulas alas ſparſis.*

*Iſtius Acetabuli deſcriptionem prætermittere non*  
*potui, licet à Matthiolo et aliis eius hiſtoria ſit prodita,*  
*quoniã meo iudicio breuior apud eos eſt quã oportebat.*

Rhodi radix.

*VERVM ad Cotyledonis alterius claſſem referri*  
*poſſe arbitror Rhodiam radicem, qua maxima copia in*  
*ſcopulis ingi Durrenſtain toties à me memorati naſci-*  
*tur: Variat iſtic interdum florè menſibus Iulio & Au-*  
*guſto, nunc in pallescentem, nunc in rubescentem colo-*  
*rem: in hortos verò translata maturius floret.*

## DE SEDO ALPINO.

### CAP. XVI.

*FORMA & facultatibus non multum inter ſe dif-*  
*ferunt Cotyledon altera & Sedum; cuius etiam in Pan-*  
*nonicis Noriciq<sup>3</sup> alpibus multa haud vulgaria genera*  
*conſpiciuntur.*

1. *PRIMUM ſumma tellure ſerpit aliorum Sedorum*  
*modo, numeroſisq<sup>3</sup> & ſucculentis ramis præditum eſt,*  
*quos ambiunt multa oblonga & mucronata foliola, ſe-*  
*cundo Dioſc. generi, quod Galli Triquemadame ap-*  
*pellant haud multum abſimilia, minus tamen craſſa,*  
*planiora, & guſtu admodum exſiccante: flores in canli-*  
*culis palmaribus numeroſi, manuſculi, quinq. foliis con-*  
*ſtantes,*

Cotyledon  
 altera eſche-  
 riana.

Sedum alpi-  
 num flo. pal-  
 lido.

## Sedum alpinum .1.



stantes, ex luteo colore nonnihil pallescentes: radicem habet in crebros ramos diuisam, qui per terram sparsi tennes fibras agunt.

Crescit in Sneberg aliisq<sup>3</sup> Styriacarum alpium iugis, in Tauro monte atque Iudenberg. Floret sub finem Iulij & Augusto.

II. PROPTER quandam foliorum cum superiore similitudinem elegans hoc Sedi genus Secundo loco describemus, licet in alpiibus non natum, sed solum à me obseruatum sit vliginosis locis apud oppidulum Freying, quae Praga iter est Noribergam.

Dodrantalem autem habet cauliculum, subrubrum, succulentum, tenerum, foliola subhirsuta, succi plena; oblongiuscula: flosculos in summis cauliculis purpurascētes, aut coloris carnei, cum aliquot internis staminibus, quinis foliolis constantes: quibus totidem succedunt cornicula initio viridia, deinde purpurascentia, semen exile continentia: radix exigua est & inutilis, secundum quam ex infimo caule surculorum propagines in orbem humi diffusa sunt, multis exiguis foliolis Sempervini minoris feruidi fere similibus, minoribus tamen, angustioribus, & cuspidē obtusiore praedita, & sapore non urente, sed aqueo.

Florens id obseruavi quo iam dixi loco sub finem Iunij anno 1579. dum in Belgicam & Britanniam proficiscerer.

III. TERTIVM compactis & sibi inuicem insidentibus est foliolis admodum exiguis, crassis, cinereo colore, ut nihil fere nisi quidam muscus videatur tota plāta, quae acidi saporis est: pedicelli e medio foliorū prosiliunt duorum digitorum transversorum longitudine, graciles, iuncei, in quibus terni plerumque flosculi quinque foliolis constantes candido colore, cum aliquot intus luteis

stami-

Sedum palu-  
stre.

Sedum alpi-  
num tertium  
siue primum  
albo flore.



*Sedum alpinum* III.

*staminulis: cū in semen abeunt flores, cauliculi aliquantulum excrescunt. Mirum in modum propaginibus adnatis serpit, & radices agit alterius Cotyledonis ritu, integros cespites cuiusdam musci instar interdū occupās. Præruptis Snealbeniugis locis atq. inter saxa nascitur, quæ descensus est ad monasterium Neuberg, atque etiam in Snieberg. Inuenitur & in monte Fracto testē Gesnero. Iulio & Augusto floret.*

## Sedum Alpinum IIII.



b s

Q V A R-

IIII.

Sedum alpi-  
num alterum  
luteo flore.

QVARTI folia paulo maiora sunt & longiora, densa siue crassa, in ambitu hirsuta, gustu etiam primum acido, deinde amariuscule & calidiusculo: adnatis etiam se propagat, & è medio foliorum hirsutum pediculum profert longitudine cum superiore parem, in quo seni plerumque velut in umbella dispositi sunt candidi flosculi, quinque foliolis constantes, umbilico luteo.

Inuenitur in Sneberg & vicinis iugis. Sub finem Iunij & Julio floret.

V.

Sedum alpi-  
num tertium  
luteo flore.

QVINTO oblongiora nonnihil sunt folia, graminis modo angusta, dura, viridia, leuia, gustu primum acido aliquantulum, deinde ingrato: unicus aut alter inter folia erumpit cauliculus lauis, gracilis, iunceus, trium fere unciarum longitudinis, raro maior, in quo unicus interdum bini sunt flosculi, superiore maiores, candidi, medio lutei, quinque foliolis cordis ut vulgo pingitur formam referentibus pradii.

Serpit & hoc reliquorum modo, iisdemq; cum Quarto locis prouenit, atque illo ipso tempore floret.

VI.

Sedum alpi-  
num alterum  
flore luteo.

SUNT & huic angustiora folia, rigidiora, aliquantulum hirsuta, ab una sede in circuitum sese expandentia, Cotyledonis alterius reliquorumque montanorum Sedorum minutiorum modo, gustu adstringente, sed tamen nonnihil amaro: ex horum medio unciales exeunt cauliculi, firmi, nudi, qui in summo flosculos quinque aut sex coloris lutei gestant: deinde crassiusculas mucronatasq; filiquulas, semen pusillum, planum, fuluescens, continentes: radix crassiuscula & longa est atque candicans, qua ex summo capite multas plantulas simul iunctas producit.

In summis Austriacarum & Styriacarum alpium iugis, inter saxa prouenit. Memini dum olim è Narbonensi Gallia per Heluetios in dulcissimam patriam redire in

## Sedum alpinum VI.



divem in Allobrogum alpibus cum aliis plerisque venustis stirpibus ernere.

Huius etiam obiter meminit Gesnerus in descriptione Montis fracti, historiam verò tradunt Pena & Lobelius Aduersariorum libro: cum autem in his alpibus frequenter etiam collegerim, huic capiti cum reliquis inferere libuit.

N V M E R O S A habet Septimum genus foliola, ternis profundis incisuris laciniata, uti Ainga fere folia, minora tamen & viridiora, neque vlla lanugine hirsuta, sapore admodum adstringente & exsiccante: cauliculi

VII.

Sedum alpinum  
num aiugæ  
folio.



culi assurgunt exiles, binos transuersos digitos longi siue sesquiuinciales, singuli singulares sustinentes flosculos ex herbido pallecentes, quinque foliolis constantes: radice serpit multis exiguis fibris capillata, & multas propagines è lateribus generante, ut interdum integros cespites occupet, muscumq; quendam ementiatur.

Nascitur in summo Sneberg iugo inter saxa paulo antè à niuib; libera.

Floret Augusto.

Quo nomine à montanis pastoribus & venatoribus omnes ista planta vocentur, hæcenus intelligere non potui: & hæc scio an illis vllum indiderint, solent etenim ista negligere. Ego Sedi generibus annumerandas esse censeo. Si cui autem mea sententia minimè placeat, aliòque nomine insignire malit, per me semper licebit.

## DE ANAGALLIDE FLAVO FLORE.

### CAP. XVII.

Anagallis flo-  
relutco.

RAMULI sunt illi dodrantes, rubentes, teneri, succi pleni, humi sparsi, in quibus multa folia Anagallidis flore phæniceo, maiora, bina semper inter se opposita, acidi saporis: ex alis prodeunt flores Anagallidi vulgari forma similes quinque foliis constantes flavo colore: capitula deinde turgentia alterius Anagallidis, minora, semen etiam simile: tenui & latè serpente est radice: quinetiam ipsi ramuli interdum fibras agunt.

Nascitur in Hochbergerin summo fere iugo inter arbores, Etscher, Dufrenstain, aliisque ingis, sed locis opacis. Floret Junio, Iulio, & Augusto.

DE GNA-

*Anagallis luteo flore.*

## DE GNAPHALIO ALPINO.

## CAP. XVIII.

Gnaphalium  
alpinum.

**DODRANTALIS** est hac plantula, plerumque etiam minor, foliis Pilosella minoris Fuchsiæ fere, interna parte hirsutis, exteriori verò omnino incanis & tomentosis, gustu exsiccante & amaro: cauliculi similiter tomentosi, quos ambiunt folia multo etiam tomento obsita: in summo autem cauliculi sustinent quina, sena, aut plura foliola latiora & expansa, adeò tomentosa, ut nihil nisi tomentum sint: ex horum medio emergunt quaternæ, quina, aut plura capitula Gnaphalio similia pallescentibus flosculis constantia, quos intercurant nigri quidam villi, foraminum vestigia quodammodo eminentes: radix satis nigra est, crassa, & aliquot nigris fibris capillata.

Provenit in scopulis summorum Sneberg, Durrenstein, & Etscherberg ingorum.

Floret Julio & Augusto.

**VIDETUR** ea planta quam Matthiolus pro vero Diosc. Leontopodio exhibet. Sed sine dubio Gnaphalij duntaxat genus est.

**IOSIAS** Simlerus commentario de Alpibus eius meminit his verbis, *Wulblumen* flos odoratus est, folio Pilosella, circa supremum cauliculum folia multa imparia, candicantia, lanuginosa, medio orbe quinq. vel sex flores: inter quos medius plerumque aridus: ex singulis lutei apices emicant: radix arida, parva summo cespite harena. Tomenti speciem arbitror. Hac ille.

Pseudoleontopodium  
Matthioli.

**VERVM** earundem alpium variis locis inuenitur id Gnaphalij genus quod à Matthiolo Pseudoleontopodium nominatur. Quemadmodum & mitioribus ha-

*Gnaphalium alpinum.*

Pilosella m-  
noris varie-  
tas.

rum Prouinciarum montanis & collibus herbosis, duo aut tria eius, quod à plerisque aliis & à Fuchsio Pilosella minor appellatur, genera, flore videlicet aut omnino albo, aut purpureo, aut ex albo purpurascente siue carneo.

HIS porro adiungere libet elegantem quandam plantam ex nouo orbe delatam, quam anno 1580. Cl. V. Richardus Gart Londinensis Cancellaria Primicerius ad me misit: qua si aureum florem haberet, non inepè forsitan ad Chrysocomes genera referti posset.

Αἰγυποχόων.

Cauliculi etenim cum ramulis qui flores sustinent, multo tomento obsiti sunt, quemadmodum Gnaphalium legitimum quod in mediterraneimaribus littoribus nascitur, folia oblongiuscula, angusta, Chrysocomes foliis proxima, supernè viridia, prona parte incana & tomentosa: singuli ramuli veluti comam florum ex singularibus pediculis dependentium gestant, qui nihil aliud sunt, quam capitula numerosi argenteis foliolis sibi inuicem incumbentibus constantia. sicca admodum, & in medio tenuem quandam subflavescentem tanuginem siue pappum continentia, qui leuissimo aure flatu euolat: radicem cum foliis illis proximis non vidi, superiorem enim cauliculi partem Gnaphalij americani nomine duntaxat accepi: quoniam verò tota coma argenteo splendore nitet, non incommode forsitan αἰγυποχόων appellare possemus.

Gnaphalium  
americanum.

## DE TVSSILAGINE ALPINA.

### • CAP. XIX.

PERELEGANS est hæc plantula, cuius duas species in Austriacis & Styriacis iugis obseruari.

I.

Tussilago al-  
pina canescē-  
te folio.

QVINA aut sena habet Prior folia, circinata fere rotunditatis, Chamacisso vulgari haud multum absimilia,

## Tussilago alpina. I.



*milia, per ambitum nonnihil sinuosa, & crenata, super-  
 nè rugosa & nigro virore splendentia, infernè candida  
 & tomentosa, gustu primum exsiccante, deinde amaro:  
 cauliculus nudus est, dodrantalis, concavus, cana lanu-  
 gine pubescens, unicum florem sustinens muscosum,  
 purpurascentem, deinde in pappos evanescentem: breui  
 postea arefcit & perit is cauliculus, ut reliquo anni  
 tempore*

## Tussilago alpina II.



tempore sine caule planta cōspiciatur: radix fibrosa serpi-  
pit, & in latum se diffundens multas propagines agit  
tenuibus fibris sese firmantes.

Oritur in summis Austriae & Styriae alpium ingis,  
& totos interdum cespites cum Soldanella montana,  
cuius Secundo libro memini, occupat. Sub Iunii finem  
nonnunquam floret, interdum verò solùm Augusto  
mense, pro aëris ratione & constitutione: In hortis au-  
tem, maturius, Aprili videlicet, ubi cauliculus etiam  
magis adolefcit.

SECUNDA à Priore non admodum dissidet, figura  
enim foliorum eadem est, sapor, idem, flos similiter pur-  
purascens, radix etiam per summam tellurem, serpens  
non usq; plantas producens: folia duntaxat paulo maio-  
ra nonnunquam conspiciuntur, neque adeò splendēt su-  
pina parte, aut prona candicant: sed duntaxat nonnihil  
hirsuta sunt.

II.

Tussilago al-  
pina glabro  
fere folio.

Invenitur id in superiore collis parte post monaste-  
rium Neuberg ad radices celsissimi ingi eiusdem no-  
minis. Postea etiā observavi inferioribus ingis aliarum  
alpium, gramineis locis, & initio Asarinam esse existi-  
mabam: conspecto deinde in nonnullis plantis flore, Tus-  
silaginis genus esse deprehendi. Maio floret, & in hor-  
tos translata, Aprili, ubi neque formā immutat, quem-  
admodum nec superior: huius etiam cauliculus paulo  
altius duntaxat excrefcit.

## DE CACALIA.

### CAP. XX.

AD Tussilaginis genera haud dubiè referenda est  
planta illa, quae, in omnibus Pannonicis Noricisq; in-  
gis obvia, à nonnullis Cacalia appellatur, cuius duo ge-  
nera observantur.





VNUM, plura habens folia *Tussilaginis* vulgari fere familia, maiora tamen, mediâq<sup>3</sup> inter huius & *Petaſitis* vulgo crediti folia, circinata fere rotunditatis, in ambitu serrata, supernè dilutiorè virore prædita, infernè incana, & multis venis donata, saporis ingrati, amariusculi & calidi, quæ purpurascens & striatis pediculis innituntur; caulem bicubitalem interdum, striatum, purpurascens, cui aliquot alia folia oblongis pediculis prædita per intervalla innascuntur, superioribus minora, & magis angulosa, in ambitu etiam serrata: extremus caulis supremiq<sup>3</sup> ramuli veluti umbellas sine purpurascens capitulorum congeriem ferunt, in quibus terni plerumque flosculi quaternis foliolis stiloq<sup>3</sup> bifido constantes, colore purpurascens, odoreq<sup>3</sup> admodum tenui, sed non ingrato, qui deinde in papposam lanuginem abeunt, quemadmodum aquatici eupatorii flores, in quæ paruum oblongum semen occultitur: radix in multa capita extuberat, multisq<sup>3</sup> candidis & oblongis fibris donata est, lateribus singulis annis novos caules proferens.

ALTERIUS folia magis cutanea sunt & duriora, supernè atriorè virore prædita, nec subius incana, nec anteriore parte simul coeuntia sicut illa, pediculisue striatis innitentia, sed rotundis & lenibus, non minus tamen venosa, aut in ambitu serrata, gustuq<sup>3</sup> ingrato, amariusculo & calido: caules leniores, & flosculi dilutiores: in reliquis conveniunt.

Nascuntur commemoratis iugis ad silvarum margines, inter fruticeta locisq<sup>3</sup> umbrosis.

HUIUS postremi foliis similibus prædita est planta quedam in montanis pratis nascens, secundum villarum stabula: cuius radix etiam persimilis est. Verùm ἀκαυλον semper deprehendi: nec an florem ferat unquam scire potui.

*Cacalia vulgaris incana folio.*

I.

II.

*Cacalia glabra folio.*

*Cacaliae congener planta.*

Petaſites:

Abunde etiam per Pannoniam Austriamq; & Styriam sponte crescit Petaſites vulgo appellatus, qui inter Tussilagines doctiorum iudicio referendus est.

## DE ALTHÆA PANNONICA.

## CAP. XXI.

I. VULGARIS est per Pannoniam agroque Vienneſi. Althæa illa Belgicæ pratis communis.

II. ALIUD autem genus observaui, quod licet foliis totaque reliqua facie cum vulgari conveniat, masculos tamen flores habere videtur.

III. VERVM reperire est tertium quoque genus, cuius filia licet incana & mollia, in tres tamen maiores laciniæ diuisa sunt: flores etiam paulo minores superiore, Belgicæ floribus magnitudine respondentes, sed colore differentes, nempe qui toti carnei sint, siue incarnati, multis intus staminibus nigricantibus: cetera vulgari similia habet.

Gaudet humidis locis & secundum rivulos sitis: florentque Iulio.

VNGARI vulgarem feyer malua, hoc est albam maluam, & mazola appellant.

## DE HYOSCYAMO PEREGRINO.

## CAP. XXII.

Hyoscyamus  
peregrinus  
rubello flore.

CYBITALIS altitudinis caulem acquirit in hortis, minimique digiti crassitie firmum, molli incanaque lanugine hirsutum per quem alternatim hinc inde sparsa sunt folia, vulgaris foliis non multum absimilia, sed minora, & valde laciniata, tenuique (dum adhuc tenella sunt) & longa lanugine pubescentia: summus caulis in aliquot ramos nutantes & inflexos dividitur, qui alternatim calyculos ferunt vulgari similes, in quinque cuspides



*cuspides satis firmas desinētes, niquib. flores colore quodammodo similes vulgari, hoc est pallentes & purpureis venis distincti initio nascuntur, qui deinde paulo ampliores fiunt, et in elegantem ex rubro purpurascen-tem colorem mutantur, saturatioribus tamen venis, nec umbilico purpureo, quemadmodum in vulgari, at candicante, stiloque & quinque staminibus exornato: floribus succedunt bullata ut in vulgari capitula semē etiam simile continentia.*

*Nobis is primū natus est anno 1580. semine quod Doctiss. vir Bernardus Paludanus Frisius ex Syriaca Aegyptiāque peregrinatione redux, Patavio ad nos Benze nomine miserat.*

**V V L G A R E M** *Hyoscyamum Vngari belénd appellant.*

*Bella donna  
duorum ge-  
nerum.*

**SOLANI** porro genus illud, quod apud vulgus Ita-  
lorum *Bella donna* nomen obtinuit, multis Pannonia &  
Austria siluosis montibus sponte provenit: nusquam ve-  
rō frequētius unquam videre memini quā in silua il-  
la Zollonok fl. Dn. de Batthyan urbi vicina, tumulo  
quodā qui ab urbe circiter germanicum miliare abest.

*Verū id duorū generum esse deprehenditur. Vnum  
amplioribus foliis breuiore pediculo nitentibus, florēque  
maiorē. Alterum minoribus foliis longiore pediculo sul-  
tis, atrioribus, & flore minorē.*

*Christopho-  
riana.*

**FREQVENS** est & plerisque harum Prouincia-  
rum siluis, quae vulgo Christophoriana nomen obtinuit.

## DE PYROLA.

### CAP. XXIII.

**VULGARIS** *Pyrola*, cuius dua inueniuntur dif-  
ferentia (nam altera satis amplum mollēque habet fo-  
lium, al-

lium, altera minus & durius Soldanella alpina minuitiore folio ferme aequale) plerisque viris(que Pannonia & Austria locis, tum paulo editioribus inter frutices, tum herbidis ad quorundam sicciorum pratorum umbrosos margines inuenitur: omnium autem copiosissime nascentē conspexi siluosis quibusdam pratis ad Maurbach Chartusianorum monasterium in Viennensi saltu sitū, atq. etiam in silua arcis Entzestorf proxima quinto ab urbe Vienna miliari. Illius verò historiam, cum à plerisq. aliis sit prodita, minimè retexere hic volumus: sed eius duntaxat mentionem fecimus, ut ei tria alia genera subiiciamus à nemine adhuc descripta.

DIFFERT igitur Primum à vulgari, cauliculis gracilitate, & foliorum florumq. tenuitate: etenim huius folia non adeo densa sine crassa carnosaq. sunt, sed tenuia admodum, mucronata, per ambitum tenuissime serrata, & atriora, pyriq. folium referentia: flos in cauliculis alteri similis, minor tamē & frequentior: cui succedunt capitula pentagona ut in vulgari, stilo prominente: radice serpit ut primum vulgare, & subinde noua germina e longis pediculis sub musco latentibus profert.

I I.

Pyrola tenuior.

Crescit in Alpium iugis loco umbroso inter frutices muscumq. terrestrem, & uberrimè in silua illa supra memorata Entzestorf vicina. Memini etiam olim colligere in iugis Lausanne Allobrogum ad Lemannum lacum proximis. Floret Iunio & Maio, interdum etiam Augusto.

ELEGANTISSIMUM est Alterum genus, & quodammodo fruticans interdum: nam nouelli breuesq. ramuli singulis annis succrescentes, aliquot annis firmi viridesq. permanent, & supra tellurem eminent, donec tandē pondere suo depressi humi procumbant, & musco se condant

I I I.

Pyrola fruticosa.









se condant, fibrasq; interdum agant: folia plerumque ad singula internodia ubi nonnulli ramuli succrescunt, bina, terna aut quaterna habet, carnosâ, supernè ex atro vi-  
rentia & splendentia Chamedaphnes (quam vulgus Laureolam vocat) forma & magnitudine fere similia, per ambitum tamen serrata, gustu admodum exsiccan-  
te, deinde amaricante, ut reliquarum Pyrolarum folia: ex horum medio solent Aprili noua germina prodire, quæ foliolis veluti squamulis prædita, in virgulas tan-  
dem desinunt, quibus terni, quaterni, interdum etiam quini insident flores, vulgaris Pyrola floribus maiores, ex albo purpurascens, quibus excussis succedunt pen-  
tagona capitula tenui semine veluti scobe plena, quæ cum suis virgulis hieme exarescunt: radix, siue potius cauliculi sub musco latentes, longè lateq; summa tellure sparguntur, & subinde fibras agunt.

Abundantissimè provenit in silvis Entzestorf Ge-  
nerosi domini de Entzestorf arcis vicinis, cum vulgari & secundo genere, ubi anno 1579. primùm observari, & ab incolis Wintergruen (quod hieme vireat) com-  
muni cum vulgari nomine appellari intellexi. Audio et in Bohemicis silvis frequentem, ubi tamè minimè ob-  
servare licuit. Sed & in Silesia natam similem plantam sequente anno ad nos misit Doctiss. Vir Fridericus Se-  
bizius Vratislaviensis medicus.

1111.

Pyrola mi-  
nima.

MULTIS etiam scripit Tertium sub terra viticu-  
lis, quæ terna aut quaterna interdum gerunt foliola, Py-  
rola prima forma fere similia, sed longè minora, tenuio-  
ra, & per ambitum, uti secunda folia, serrata: inter quæ  
pediculus eminet nudus binas fere uncias longus, tenel-  
lus, in quo unicus flos satis magnus, quinque mucronatis  
albis foliis constans, Borraginis flori propemodum for-  
ma similis, siue potius Graminis Parnassi vulgo vocati,  
decem



SIO CAROLI CLVSII PANN. STIRP.

decem staminulis reflexis medium orbem exornantibus, & capitulo in medio protuberante, stilumq; exerente, qui veluti coronulam quinque radiis constantem sustinet: sunt ea capitula temporis successu satis crassa, pentagona, quæ matura copiosum semen minutissimum, scobis ligni à vermibus erosi instar continent. Tota planta amara est.

Nascitur umbrosis locis circa radices alpium Sneberg, Hochbergerin, Durrenstein & aliorum ingorum. Floret sub finem Iunii & Iulio: semen Augusto maturitatem adipiscitur.

Non dubium est quin omnes hæc planta similibus cum vulgari facultatibus prædita sint.

DE LUNARIA MINORE RAMOSA.

CAP. XXIIII.

Lunaria minor.

CRESKIT etiam in Pannonicis Noricisq; iugis, præsertim verò in pratis quæ silvis cinguntur ante quàm ad suprema alpiû supercilia perveniatur, Lunaria illa minor vulgo nuncupata, cuius historiâ plerique descriperunt, & facultates admodum commendarunt in ulceribus internisq; vulneribus. De ea verò hic agere non est animus, sed de alia eius specie rarissima, quam quidem in istis iugis minime observavimus: sed in Silesiæ quodam monte natam, & à Doctiss. Viris D. Friderico Sabizio & Achille Cromero Nissensibus, amicis nostris erutam, dono accepimus.

Lunaria ramosa.

DRONTALIS autem est planta, statim à radice unam aut alteram foliorum alam, siue folium ramosum & multifidum, multis foliis vulgari Lunaria minori fere similibus, sed longioribus, & crassiusculis crebrisq; incisuris divisis, colore sicut illa viridi dilutiore præditum: secunda foliorum ala, uti tencrior & postremo nata,



nata, tenni quadam, sed rara admodum lanugine pubescere videtur, succulentiorq; est prima: ex eius quasi utero secundum rad. cem emergit cauliculus pinguis & succulentus, sustinens multifidam spicam & maiorem (floris-ne an fructus dicere debeam ignoro) quàm vulgaris, alioqui admodum similem, qua an in candidam farinam quemadmodum vulgaris spica efflorescat, asfirmare nequeo, quandoquidem ante quàm maturescerent eruta fuerant quas accepi planta; inter quas una fuit qua ternos cauliculos florum plenos produxerat: radix vulgari similis, multis fibris latè sparsis sed crassioribus constans.

In altis Silesia montibus nascitur; florere autem, eodemq; cum vulgari tempore apparere, nobis significatum est. D. Ioannes Aicholzius aliquot recentes plantas sapius in suum hortulum intulit: sed comprehendere noluerunt, omnem quippe culturam respicere videtur, quemadmodum pleraque alia montana. Silesiis Aethetec Witherthon appellatur.

### DE VALERIANA alpina & saxatili.

#### CAP. XXV.

Valeriana Gil.

NON minus vulgaria sunt his in Provinciis duo illa Valeriana siluestris genera à Ncotericis prodita, quã in vniuersa Germania, & aliis plerisque regionibus. Verùm duo alia in his Alpibus obseruasse existimo, quæ alibi conspecta mihi non sunt.

Valeriana alpina.

- I. PRIMVM assurgit palmari cauliculo, interdum etiam pedali, tereti, rotundo, viridi, quem oblonga folia ambiunt, in binas aut ternas crenas nonnunquam profundius diuisa: alia verò maiora ex radice prodeunt, ad hedera trachelidæ foliorum formam accedentia, minora tamen & teneriora, amaro sapore: flores in summo caule quasi



quasi umbellatim nascuntur, veluti in aliis Valeriana generibus, exigui, albi, quibus succedit pusillum semen, reliquis alioqui simile: radice serpit nodosa, albicante, odorata, & cum aliqua adstriktione amariuscula, ex qua aliquot capillares fibrae dependent.

Crescit in ipsis Austria & Styria alpibus locis umbrosis, inter saxa: nusquam tamen uberius quam in Durrenstein, in quo omnes alpinae plantae magis luxuriare & adolescere videntur. Floret Iunio & Julio, post quod tempus semen etiam maturescit.

## II.

Valeriana saxatilis.

ALTERI bina aut terna à radice exeunt folia, Bellidis fere foliorum emula, è quorum medio caulis assurgit pedalis, gracilis, rara habens folia inter se opposita, angustiora & minora: supremus caulis in ramulos finditur, qui flosculos sustinent albos reliquis Valeriana silvestris generibus similes, & semen etiā non diuersum.

Eius radix aliarum Valerianarum silvestrium modo in saxorum fere commissuris serpit, nec minus odorata est superiore.

Pronenit inter saxa ad flumen Myrtz quod monasterium Neuberg alluit, qua ex eo monasterio iter est in Hohebergerin & Spital. Inuenitur & in aliis locis: sed istuc primum observavi. Floret sub Iunii finem & Julio, modò maturius, modò serius pro calis siue aëris natura & temperie.

Nardus montana.

MONTANAM Nardum in his Alpibus nondum inuenire mihi contigit, tametsi summa diligentia perquisuerim.

## DE NARDO CELTICA, SEV ALPINA.

## CAP. XXVI.

Nardus celtica Valerianae vel generis est.

MINIME dubium est, quin haec plantula ad silvestrium Valerianarum classem sit referenda, adeò illas odore,





odore, & nonnihil etiam forma, præsertim alteram modò descriptam, refert.

INTEGROS cespites interdum occupat serpendo, & latè summa tellure inter muscum sese diffundendo: oblongi procumbentesq; humi ramuli, tenues, plurimis veluti foliolis aut siccis squammis circumsepti, subinde nigricantes fibras & nonnihil capillatas agunt, & in summo extuberant in unicum, aut bina ternæ capitula, aliquot oblongis foliis & secūdum caput angustis, deinde in latitudinem paulatim sese laxantibus plena, satis crassis & succulentis, colore dum primum emergunt viridi, deinde, sub Autumni initium aut æstatis finem, flavescente, gustu amariusculo: è mediis istis foliis emergit cauliculus dodrantalis aut palmaris, nonnunquam etiam maior, satis firmus, striatus, quemadmodum in minutioribus Valerianis geniculatus, bina ad singulos nodos inter se opposita habens exigua foliola, cui circa summum ex singulis alis pedicelli enascuntur binos aut ternos flosculos coloris pallidi sustinentes, quibus succedunt semina Valeriana siluestri, secunda præsertim superiori capite descripta, proxima, paulo tamen minora.

Tota plantula aromatica est, et Valeriana silvestris radicem odorem æmulatur.

Copiosè nascitur in Iudenberg summo Styriacarum alpium ingo inter muscum & saxa, unde plantas cum suis cespitibus erutas, & pleræque alias elegantes stirpes anno 1576. retulit Cl. V. Ioannes Aicholtzius Medicus ac Professor Viennensis, veteri amicitia mihi coniunctus, & nonnullas in suo horto aliquot annis aluit. Nascitur & in Tyrolensibus atque Saltzburgensibus montibus, teste D. Ioachimo Camerario.

Mense Augusto floret sub ipsis fere niuib; & folia  
deinde

deinde promit cū dissolui & diffluere incipiunt. Legitur autem ab incolis sub Augusti finem & Septembris initium, cū folia flavescere incipiunt: tum enim summā habet odoris gratiam, qua caret dum folia primum promit & viridis est.

INCOLÆ Speick appellant nomine è latina voce desumpto. Pannonēs quibus frequens eius vsus est in capitis lotionibus, Betz fīu, hoc est, Viennensem herbam vocant, quoniam Vienna copiose ad eos defertur.

Betz fīu Viennens. herba.

## DE DORONICO.

## CAP. XXVII.

VARIA inueniuntur Doronici genera in Pannonicis Noricisque alpibus nascentia, ab his quæ in Belgicis hortis aluntur, nusquam autem hīc mihi obseruata sunt, diuersa: Belgica nunc mea opera harum regionum hortis communia facta, qui ea ex Belgica vsque huc deferri curauerim.

Latifolium in Allobrogicarum alpiū scopulis supra Lemānum lacū colligere memini anno 1554. dum ex Narbonensi Gallia per Heluetios in patriam redirem: id Lobely tertium est in Observationibus.

Doronicum latifol.

Eius ordine Primum, longiore folio ad plantaginis folium quodammodo accedēte, munere Parisiensis cuiusdam Hortulani, qui Burdigale vicinis locis delatum afferebat, primus Petro Coldebergio Pharmacopœo doctissimo communicauit, qui tum in Burgenhout vicino Antuerpia pago hortum alebat.

Doronicum angustifol.

PRIMUM autem quod in Austriacis Styriacisque Iugis obseruauit, ut à minoribus initium faciamus, caule breui & pedali duntaxat est, molli, hirsuto, striatoque: folia illi rara, parua, crassa, longiuscula, supina parte admodum viridia, & quodammodo splendentia, om-

I.  
Doronicum minus.



nino tamen hirsuta, prona autem laevia & dilutius vi-  
rentia, peracri sapore, quæ autem caulem ambiunt, an-  
gustiora sunt: summo caule unicum plerumque fert flo-  
rem tertio Lobelij similem, sed magis aurcum, qui ma-  
turitatem exiguum fert semen nigricans, lanugine & pappo  
coronatum, quod facile vento excutitur, & eius arbitrio  
fertur: radix parva, geniculata, et internodiis distincta,  
nigricans, aliquot crassioribus & candicantibus fibris  
donata, gustu aromatico.

Primum id observavi in Sneberg, deinde in Snealben,  
& Neuberg: sed nusquam maiore copia quam in summo  
Etscheri iugo inter saxa, tenui nigraque, terra leuiter te-  
cta. Floret Iulio, nonnunquam etiam Augusto, quo  
mense semen etiam maturitatem subinde adipiscitur.

ALTERUM caulem habet interdum cubitalem,  
rotundum, striatum, viridem, intus concavum: capitulum I I.  
in summo caule magnum, ex multis flosculis luteis Doronicum  
concauis, & quinque crenis divisis congestum, quod ab austriacum  
aliis oblongis & per extremum crenatis foliis fulgore alterum.  
auri splendentibus ambitur, non inodorum: semen supe-  
riori simile & cum pappis suis facile evanescens: folia  
circa radicem longo pediculo in herentia, orbiculata fere  
sunt, sensim tamen à pediculo in latitudinem sese expli-  
cant, & per ambitum denticulata & serrata sunt; quæ  
verò caulem ambiunt, longiora, & ab ipsa statim pedi-  
culi sede in latum expanduntur, omnia sapore acris &  
amaro: radix ex virore candicans, minimi digiti cras-  
sitie, geniculata, & quasi squammata, sed nodis sursum  
tendentibus non inferne, ex inferiore geniculorum parte  
longas agens fibras, albas, satis crassas, & propagines è  
lateribus, gustu fere succi è glycyrrhizæ radice expressi  
& densati.

Invenitur in Etscher, Durrenstein, & quibusdam

aliis *Austriacarum Styriacarumq;* alpium iugis, inter saxa, in profundis scrobibus ubi perpetua sunt nives, nusquam tamen abundantius quam in *Durrenstein*.

Floret Iuly initio aut etiã serius: in hortis verò Maio plerumque.

III.

*Doronicum  
austriacum  
tertiũ.*

**TERTIVM** humilius plerumque est, & capite floris maiore: foliis à pediculo statim orbiculatis ut in *Cyclamino*, in reliquis alteri simile: radicem item propages neque in hoc, quemadmodum nec in superiore deorsum tendunt, aut ansarum instar longè ab ipsa matre sese spargunt: sed quasi matri contigua sursum tendunt, & extra terrã folia promētes fibris telluri sese firman, ne quis sine fibris aut utrinq. ansatas existimet.

Nascitur hoc in *VeytZalben* supra *Neuberg* in *Styria*: & eodem quo *Secundum* genus tempore floret.

IIII.

*Doronicum  
austriacum  
quartum.*

**DORONICIS** adnumero quandam plantam, quæ in omnibus fere pratis paulo sicciorebus cum ad *Alpium* radices, tum in ipsis *Alpibus* sitis, frequens est, præsertim verò in *Wechsel*, ad cuius radices Maio floret: sed in ipso iugo qua *Septentrionem* & *Orientem* spectat, serius. Maio similiter florentem & satis copiosè nascentem silvarum declinibus munitissima *arci Nemethwywar* vicinarum inueni.

**QVATERNÀ** verò aut sena summa tellure fundit folia, *Plantagini* latifolia fere similia, oblongiora tamen & ad *Digitalis* luteæ foliorum similitudinem magis accedentia, nervosa, mollia, viridia, & nonnihil hirsuta supernè, candidiora & leniora infernè bina semper ex aduerso nascentia, gustu nonnihil amaro & acri: caulem cubitalem plerumque, nudum, rotundum & hirsutum, qui superiore parte in aliquot ramulos diuiditur sustinentes calycem hirsutum, ex quo magnus emergit discus multis luteis flosculis in quatuor folia diuisis constans:  
hunc





hunc discum ambiunt quindena aut plura folia Doronico maiori similia, latiuscula, & per extremum simbricata, colore planè aureo elegantissimo: semen uti reliquorum Doronicorum in pappos evanescit: radix minimi digiti crassitudine ferme est, nodis distincta, multifque fibris donata, lateribus se propagans, & singulis annis noua germina proferens.

QVINTVM genus omnium maximum caulem habet interdum bicubitalem aut ampliorem, minimi digiti sepe numero crassitudine, striatum, hirsutum, summo cacumine in aliquot alas expansum: folia circa radicem orbiculata, longo pedicelo inherentia, rugosa, & nonnihil hirsuta, qua verò confuso ordine caulem ambiunt, ampliora sunt, mucronata, per ambitum leniter dentata, pediculo nullo, sed instar foliorum Peruani hyoscyami latifolia, Tabacum maius vulgo vocati, caulem basi latiore amplectentia, viridia, hirsuta: flores extremis alarum ramulis insidens magni, vicens aut tricenis oblongis foliis, & orbem satis latum ambientibus constantes, luteo colore, nullo verò odore pradii: semen ut aliorum Doronicorum striatum, sed virescens, quod cum suis pappis aura leni flatu defluit, initium ab exteriore ambitu faciens, quemadmodum & in reliquis Doronici generibus: radix ex viridi candicans, nodosa, squillula similis est: sed ubi propaginibus aucta est, crassior fit, et ex multis veluti corporibus in unicum coëstat.

v.

Doronicon  
striatum, quin-  
tum, siue ma-  
ximum.

Secundum riuos è montibus labentes locis umbrosis in descensu iuxta Wechsel primum obseruari, unde in hortum translatum mihi egregiè propagatum fuit: sed postea longè maiore copia declinibus, siluosis tamen, locis Etzcher & Herrnalben inueni Augusto etiam florens, cum in Wechsel floreret Iunij initio. In hortis Maio flores profert, quemadmodum & in montanis sil-  
uis ultra





nis ultra Drauum, ubi anno 1579. plurimum etiam observant: semen Junio maturefcit in hortis.

NULLVM Primi & Quinti vulgare nomen mihi compertum est: Venatores, pastoresque montani Secundum & Tertium genus Gemswurtz, hoc est, Rupicaprarum radicem appellant, & aduersus vertigines non minus commendant, quam Auricula vrsi radicem, viribusque roborandis adprimè utilem esse ferunt.

Quartum genus non absimile videtur illi planta quam Matthiolus pro Alismate exhibet. Meminit huius etiā, ni fallor, Iosias Simlerus ad calcem Cōmentarij de Alpibus. Mutertwurtz, ait, à quibusdam dicta, veluti plantago quædam alpina, foliis plantaginis, leniter hirsutis, flore Doronici, radice aromatica.

Alisma Matthioli.

Doronici porro facultates, cuius hæc, quas modò descripsi, planta haud dubiè genera sunt, satis à reliquis rei herbariæ scriptoribus sunt decantata, ideo eas hic repetere non est opera precium.

## DE CONYZA TERTIA PANNONICA.

### CAP. XXVIII.

PEDALES interdum habet caules, rectos, firmos, duros, incana lanugine tectos, quibus inhaerent oblonga folia, Conyza maioris foliorum amplitudine, mollia, incana & hirsuta, dorso prominente, oblongo quæ circa radicem sunt pediculo, quæ verò superiorem caulis partem amplectuntur, breui admodum aut nullo, ea trita non iniucundum spirant odorem, gustata verò amara sunt & calida: flores extremo cauli, & ramulis illi inhaerentibus insident magni, Helenij floris forma, multis foliolis luteis medium discum pallefcentem ambientibus, nullo odore pradi: radix longa, tenuis, nigricans, serpens, subinde ad ipsa capita, unde caules prodeunt, multas candicantes

Conyza tertia pannonica.

dicantes fibras undique spargens, resinaceum quidpiam olens, gustuque amaro & acri: perennis est.

Exit sponte siccis & aridis locis, herbidis tamen, in collibus declinibus ad Zimmerin qua ad Phasianorum iter est, primo ab urbe Vienna miliari, deinde ad Badenses thermas, Radain, Petronellam, atque secundum vias publicas. Floret Iunio.

NON incommodè conuenire videtur hac planta Conyza tertia Dioscoridi descripta, quam locis non riguis nasciasserit.

Conyza tertia  
vulg.

CETERVM frequentissima etiam per Pannonias est locis riguis Conyza vulgaris, ab omnibus tertia Dioscoridis aut media appellata, quæ duplex est maior & minor. Verùm hac meo iudicio commodius eo nomine appellanda veniet. Vulgare nullum nomen intellexi, & eius facultates mihi sunt incognitæ.

## DE ASTERE PANNONICO.

### CAP. XXIX.

AD Asteris genera referenda videntur elegantes hæ, nec antè mihi conspectæ plantæ.

Aster panno-  
nic, maior.

- I. HARVM Prior ex nigra radice, obliqua, multis albicantibus fibris capillata, & lateribus propagines fundente, multa initio promit folia, Scabiosa aut Succisa potius foliis similia, dilutiore tamen virore, & tenui etiam interdum lanugine pradiata, gustu aliquantulum acri & amariusculo: inter quæ prodit caulis cubitalis aut amplior, teres, plerumq. rubescens, per quem sparsa sunt folia superioribus angustiora, mucronata, & nonnihil dentata: is superna parte in aliquot ramulos diuisus est, magnos sustinentes flores, ex multis quinq. foliorum luteis flosculis, atque in orbiculare caput congestis constantes, quos per circumferentiam ambiunt oblonga &





longa & latiuscula folia, plana, elegantissima, colore flavo, nullo aut exiguuo odore praedita. Simen deinde inter villosam quandam, pituli materiam contingitur, angulorum, & quasi triquetrum.

Passim ad Alpium radices loco aprico, nonnunquam etiam umbrosa nascitur. ubi Iulio floret, Augusto semen eius maturum est. At in Leytberg, multisq; aliis collibus Vienna vicinis, ubi etiam frequens crescit, Iunio flores producit.

CVBITALIS habet Altera caules, striatos, firmos, virides, multis foliis priore angustioribus, & salignis proximioribus, nullique lanugine pubescentibus, sed viridibus, durisque, & in ambu tenuiter serratis praeditos, non sine acrimonia, suprema parte in ternos aut plures ramulos divisos, sustinentes capita è multis viridibus foliis sibi invicem tenuiter compacta, qua tandem in flores sese exiliant non minus amplos quam superius, sed minore disco. Incerbe et angustioribus cum ambientibus foliis in extremo bifidis praeditos, colore luteo, radicem nigricantem fibrosam, & adnatis se mirè propagantem, atque subellure serpentera.

Alter pinnos, salicis folio.

Frequens est in montanis siccioribusq; pratis, siccis caduis, montibus Vienna vicinis una cum tribus subsequenter interdu nascens. Florere incipit Iunio.

TERTIA multis etiam ab una radice assurgit caulibus, gracilibus, firmis, cubitalibus, virentibus aut purascentibus, ubi vultu. quae, quos confuso ordine ambiunt frequentia folia, oblonga, salignis similia, viridia, transversum digitum lata, aut terram nonnulli reflexa, lata sede caules amplectentia, molliora, nec olita, sapore aliquantulum amaro & acris. Summitate cauli insidet capitulum multis foliis & veluti squamis constans, orbem satis magnum continens, è plurimis luteis &

Alter panno, folio rubeo salicis folio.

l muscosis



muscosis flosculis compactum, nullo odore præditum, quæcumque numerosa ambiunt oblonga foliola, florem Helenij ambientibus foliis similia, angustiora tamen, luteo colore, sed dilutiorè quàm medius orbis: circa summum caulē à foliorum exortu interdum terni, quaterni aut plures exeunt ramuli, summum ipsum caule superantes, singuli florem priori similem sustinentes: exsiccatis floribus semen exiguum nigrum in iis capitulis continetur, quod maturum cum pappo sua casarie anolai: radix admodum fibrosa est, nigricans, subinde novas propagines è lateribus produciens, & novas fibras agens.

Provenit plerisque locis ad montium & collium radices secundam vias agro Viennensi & caduis Pannonie silvis. Floret etiam Iunio.

HVMILIOR est superiore Quarta, pedalem altitudinem raro superans, numerosa a radice (que non minus fibrosa est quàm secunda nec puriores illa propagines agit proferens virgæ, graciles, duras, virides, quas frequentia sed confuso ordine nascentia ambiunt folia, superiore angustiora, nigriora, duriora, & mucronata, Ptarmice vulgari seu pratensi similia, minimè tamen per oras serrata, amariusculo sapore, cui nonnihil acrimonia adiunctum sit: summis virgis insident flores superiori forma similes, attamen minores, capite etiam foliato, siue crebris foliolis imbricato: ramosæ etiam circa summum sunt hæ virgæ, sed rami matrem rarius superant: semen superiori est simile.

In umbrosis montium urbi Vienna vicinorum pratis, in ipsis collibus herbosis atque etiā in siluula ad Danubium sita paulo supra Eberstorf arcem Imperatoriam primo cum semisse ab urbe Vienna militari copiose crescit. Floret paulo serius superiore.

MULTA sunt Quinto generi folia, circa sedem angusta,

IIII.

Aster pannonicus, angustifol.

V.

Aster pannonicus, cœcul. Ro.







gusta, & per summas oras latiora, cuspidate obtusa, & quasi orbiculata, Bellidis folius non valde dissimilis. Superne atq. inferne lanugine quadā nonnihil pubescentes, gustu primū exsiccaute, deinde amaro: ex horum caulis exit dodrantalis, foliosus, hirsutus, capitulum in summo gerens ē numerosis mollibus & purpurascens foliolis: costarum, & in eo magnū florem multis tenuibus oblongis, ex caruleo purpurascens foliolis flamm orbem vallantibus cōstitit, qui maturus in pappo manescit: radix est Bellidis aut Scabioje, lateribus propagines fundens, & albis fibris capillata.

Oritur herbosis Austriacarum alpinum iuncus. Floret Julio: in hortos translata hac planta, sub finem Aprilis & Junio floruit, subsequens deinde hiems abstulit, & corruptit.

SINE vulgari nomine sunt ista planta apud harum provinciarum incolas, & montanos patentes. An prima Lobelio Aduersariorum pagina 148. nota fuerit, nescio: sed ille suis unicūm florem tribuit, hac plures flores sustinet. Quinta respondere quodammodo videtur Virgiliano Amello, et forsitan Amellus alpinus duci queat: etenim in pratis, quemadmodum dixi, alpinus nascitur.

Amellus alpinus.

Aster atticus Ital.

CETERVM Aster atticus Italorum & Fœdæ, qui purpureis siue caruleis orbem luteum ambientibus foliis florem habet, cum latifolius, tū angustifolius, per Parnonias sapis notus est: ille quidem & Vindobonensi agro, & plerisq. aliis siccis nascens: angustifolium vero, cum in montibus, tum in quibusdam pratis.

DE SCABIO

## DE SCABIOSA PANNONICA.

## CAP. XXX.

NON minor est Scabiosarum varietas: nam in nulla fere Europa Provincia me versatum esse memini, in qua eius aliquid peculiare genus non inuenerim, ut ex illis que inter rariore stirpes Hispanicus de crassi videre licet, & illa quorum historiam his Pannonicis observationibus propono documento esse poterunt.

PRIMUM autem cubitales habet caules rotundos, nodosos siue geniculatos, nonnihil hirsutos, concavos, & in singulis geniculis bina folia inter se opposita, non ut aliarum Scabiosarum multis, sed lata, per ambitum duntaxat crenata. Vertice folius interdum maiora, brevis pediculo, colore viridi diluere, sapore amaro & acris ex alarum sinu rami etiam prodeunt foliati, qui ex lateribus pediculos exerant floribus. Vulgaris Scabiosa modo in se congestis, ornatis, colore rubro, nullo odor: deinde semina simul congesta, angulosa, hirsuta. cuncti fere interdum magnitudine, stellata corona insignita: radix minimi digiti crassitudinem nonnunquam aequat, longaque est, nigricans, statim à capite quasdam satis magnas fibras spargens, & subinde ex lateribus novos caules producit.

I.

Scabiosa latifolia, rub. flore.

Hac Scabiosa per omnia maior alia inuenitur, maioribus & nigrioribus foliis, purpurascensq; ex rubro flore, alioqui nihil differens.

2.

Scabiosa latifolia purpurasc. flor.

Pronenit utraque in omnibus fere caduis silvis, & iuxta sepes, locisq; umbratis per uniuersam Pannoniam. Floret Maio & Iunio, quo tempore semen plerumque maturescit.

QVINA autem sua habet Alterum genus folia humi sparsa, Scabiosa vulgatiore & inter segetes nascenti.

II.

Scabiosa alpin.

l. 4

fere



fere similia, sed vixime hirsuta, admodum vero carnosa  
 & venosa, prae viroribus quodam modo splendentia, aliquot  
 cernis iucis si per se immorantur, lento & gummoso,  
 deinde aliquantulum acru: ex horum medio prodit pal-  
 maris caulis, inter duos paulo amplior, gracilis, rotundis,  
 cuius inferior pars in ambitu quaternaria aut senaria folia  
 profundis & tenuibus lacinis dissecta, bina inter se oppo-  
 sita: extremi cauli infidet capitulum ut in vulgari Sca-  
 lis, saepe è multis foliis quinque foliolis constantibus co-  
 nfectum, quorum exteriores maiores sunt, colore ex ca-  
 eris purpureo ascente elegantius praedit, videtur quibusdam  
 in re singulorum in paucolorum, deinde ambientibus. radix  
 nigra, longa, et assuescens alba, feris capillata.

Inuenitur in summis Snabergi & Snealbenurgis in  
 tenui grammine nascentis, ubi flor. i. Augusto: similiter &  
 in depressioribus nasis quae circa Vinnam collum iugis,  
 ubi Iunio & Iulio sunt communium illi.

CYBITALIS sunt Terentiales, rotundi gra-  
 ciles, firmi, vircentes, nodosi, quos per singula genicula  
 semper amplectuntur bina folia ex aduerso respondentia,  
 tenuibus & profundis lacinis inde diuisa ut alata vi-  
 deantur, colore ex viridi cinereo, sapore amarizscentio,  
 quae vix secundum radicem nascantur, ante quam  
 planta ibi quousque assurgat, latiora sunt minoribus quae  
 lacinis diuisa ex minimis alis ramulos fert tenues, &  
 nudo, quae sunt in planta capitula candida modis-  
 que floribus sunt in constantibus, qui quinque folio-  
 lis quorum tria inferiora manifeste sunt, constant pau-  
 cis intus stant nullis: floribus succedunt hirsuta semina  
 vulgari cabola semina respondentia, minora, in  
 orbiculare caput congesta: radice internum minimi di-  
 giti crassitiem aequat, multisque ex tenuis fibris in late-  
 ribus praedita est, singulis annis novos caules proferens.

III.

Scabiosa mul-  
 tis in alio,  
 albo dote.



Nullum est pratam ficius & editiore laeta situm, nullus ager gramineus, nulli fere agrorum margines in quibus non nascatur hoc Scabiosa genus, adeoque fertile est in gerendo floribus & pertinax, ut sola bruma illius luxuriam coerceat, alioquin Iunio florere incipit.

Memini & in Belgicis hortis similem alii: & aliam præterea, cuius folia latiora essent, firmiores caules, capitulaque florum bina aut terna simul nascentia.

Scabiosa latifolia albo flore

ALIVD porro genus invenitur quod bicubitali aut ampliore assurgit caule, tereti, firmo, rotundo, multis aliis prædito, per quæ sub ipsius nudis sparsa sunt folia iam descripta foliis admodum similia, viridiora tamen & duriora. nec in adeo teretes laticinas divisa: flores extremis ramulis insident in caput compatiuntur: alterius floribus similes, hoc est quatuor foliis coarctatis, uno semper præsertim in exterioribus orbem efficiunt, usque maiore & ampliore, non ut in superius, sed omnino nives, staminalis in omni viriditate emittentibus coloris candidi, sed apicibus subcaruleis, qui deinde in subrotunda capitula transeunt, continentia veluti inter squammas oblongiuscula angulosa semina, colore dum maturaverunt fusco.

IIII.

Scabiosa major pannon. albo flore.

Hanc Scabiosam primū observavi anno 1582. Augusto mense florentē & semē maturū præferentem circa Tirm. iam Pannonia transdanubiana urbem, atque etiā secundum ipsius urbis vallē qua Meridiē spectat.

LATE serpit Quantum genus, & interdum magnos cespites occupat, dura & nigra radice se per summam tellurem spargente, & floribus tenuibus, ramentis ex quibus multi undique expanduntur rami humi diffusis, et subinde radicem agētes: folia sat numerosa, densa & carnosa, lævia, viridia admodum, Bellidis foliis aut Globularie, quam Anguillara Aphyllanthem appellat, similia,

V.

Scabiosa medietanarepens.





nulla nullo mucrone praedita, sed corac, ut vulgo pinguior, formam referentia, herbaceum quiddam non inamœnum redolentia, oblongo pediculo, gustu amaro & mordicante; aliquot deinde inter folia dodrantalet prodeunt cauliculi, teretes, singuli sustinentes capitulum Globularia maius & planius, multis crassiusculis villis aut floribus hirsutum, Succisa siue Morsus Diaboli similibus, colore purpureo, nonnunquam adeo diluto, ut caruleus quodammodo videatur. semen Globularia semini proximum.

Nascitur in omnibus Pannonia & Austria montibus glabris & asperis, inter saxa & sclebras sese spargens, atque etiam in amœnis quibusdam siccioribus incultisq. agris, veluti supra Neapolim Austriae. Floret Aprilis & Maio: semen Julio & Augusto maturescit.

PORRO nullum vulgare nomen istarum Plantarum intellexi neque enim prorsus notum mihi essent, & à reliquis Scabiosarum generibus cum aliis tamen esse descriptis, diutius inuicem; Priore, cognominavi Scabiosam latifolia pannonicam, Alteram, Scabiosam alpinam: Tertiā, Scabiosam tenuifolia pannonicā, flore ex albo flavescente: Quartā, Scabiosam pannonicā maiorem flore albo; Quintā, Scabiosam montanam minorem & rariorem.

Non dubium est quin usdem facultatibus praedita sint cum aliis Scabiosis.

INVENIUNTUR autem & hic pleraque Scabiosarum genera, aliis etiam Praenuntiis communia cum inter segetes, tum in pratis & silvis. Frequentius etiam in gramineis campis, sicutque a sentibus & arboribus paulo l. berioribus, interdum etiam secus vias inter gramina copiose crescit pumili illud Scabiose generis, quod vulgo inter herbaria rusticioris Globularia nomen in-

Globularia

nenit.

nenit. Viennenses mulhercula, quæ ob floris elegantiam in suis hortis etiam alunt, Blaw Guckartzu, id est carulcam bellidem nunc cupant.

## DE IACEA AVSTRIACA.

## CAP. XXXI.

AD Scabiosarum classem haud dubie pertinent Iacea vulgo vocata genera, quorum nonnulla hic proponam, a nemine adhuc literis prodita, vulgarem suis Autoribus relinquens, tametsi hic etiam crescat.

- I. PRIOR Iacea numerosa ab eadem radice promittit folia, oblonga, vulgari Iacea haud absimilia, nec tantum minus aspera, gustu nonnihil calido, subadstringente tamen: caules plerumque cubitales, striatos, ramosos foliis angustioribus, & interdum paucis lacinis secundum pediculum præditis obsitos, ut in vulgari: capitula in extremis ramis vulgari crassiora, non hirsuta, sed multis squammis tenuibus, & si vel digitis leuiter attigeris, crepitantibus prædita, infernè canalicantia, in perianthio, quæ se flos explicat, fusca: flos vulgari Iacea, multis exiguis foliolis ex purpura cædicantibus, quinque partito-laciniatis constat, è quorum medio purpura scintillans exilit, in summo veluti farina aspersus, quæ ambiunt purpurea maiora longioraq. foliola, quinque aequalibus laciniis etiam constantia uti vulgari. semine cnicæ exiguum, nigrum, vulgari simile, sed paulo maius, subadstringente gustu: radix vulgari Iacea similis est, fibrosa, nigricans.

Floret Julio & Augusto, & subinde semen profert, quod maturitate statim ex vaseulis reptat, & florem siccum exurit.

2. Est aliud eius genus per omnia fere simile, humilissimum tamen, utpote quod cubitali raro superat altitudinem,

foliis

Iacea montana squarroso capite minor.

Iacea montana squarroso capite minor.

foliis minus asperis, & aliquantulum incommode paulo dilut. ore: semine etiam minore, nec nigro, sed albicante & cinereo: sapor autem paulo calidior. Maturius plerumque floret, & semen julio perficitur.

Provenit utrumque copiose in montanis Pannonia & Austria pratis.

**VENVSTISSIMA** est Altera Iacea, latiusque & oblonga habet folia, vulgari Iacea maiora, candidiora & molliora leniter per ambitum dentata, gummosi quidem gustu, sed amaritudinis non exiguae: caules plures ex eadem radice, cubitales & ampliores, interdum bicubitales, angulosos & striatos: capitula terna aut plura fere contigua, ex multis squammis imbricatum dispositis constantia, quarum cuspides exterius reflexae in adeo crebra & tenuia filamenta, siue potius multifidam barbulam desinunt, ut ipsa capitula ant. summo & tenuissimo reticulo inclusa videntur, nullo Naturae artificio: flores superiori Iacea similes, paulo tamen maiores, purpureos: semen, quando maturum est, alterius quidem Iaceae, sed gracilius, oblongiusque, Cyani semini fere respondens, colore cinereo: radicem superiori similem.

I I.

Iacea montana villosa capitula maiora.

Sed huius etiam genus inuenitur longe humilius, quod cubitalem altitudinem vix attingit, alioqui foliis, villosis & reticulatis capitibus, floribusque simile: semine etiam variat, quod nigrescens est & paulo crassius.

2.

Iacea montana villosa capitula humilia.

Isdem locis utrumque nascitur quibus primum genus: & floret Iulio & Augusto, semenq. cum superiore profert, quod similiter siccam excutit.

**TERTIA** foliis est vulgari Iaceae similibus, secundum radicem leniter laciniatis, caulem cubitalem aut ampliorem habet, gracilem, firmum, striatum, nonnihil interdum purpurascens, in multas alas inaequaliter diuisum, per quem sub singulis alis sparsa sunt folia iam dictis

I I I.

Iacea montana hirsuto capite.





iam dictis minora, angustioraque: flores in summis alis è squammato, hirsutoq; & nigricante capite prodeuntes, vulgaris Iacea floribus omnino similes, & superioribus paulo saturatiores: semen priori aequale: radix fibrosa, aliis similis.

In eisdem locis quibus alia inuenitur, eodemque etiam tempore floret.

## IIII.

Iacea montana echinato capite.

QUARTA molliora sunt folia, quam Iacea vulgari, circa radicem laciniata, ad Calcitrapæ vulgo dictæ siue Cardui stellati folia accedentia: caules cubitales, angulosi, striati, in multas alas diuisi: capitula hinc inde per ramulos temerè & cõfuso ordine sparsa, oblõga, quam plurimis squammis constantia, qua in molliores tenuioresq; quam Calcitrapa aculeos, eosq; valde barbatos desinunt: flos Iacea aut Cardui stellati purpureus: semẽ non obseruari: radix Calcitrapæ siue Cardui stellati radicem æmuletur.

Ad montium radices, & nonnunquam secundum vias nascitur in Austria: & Augusto floret cum Calcitrapa.

Hyosciris Plinij.

Non multum ab similis videtur illi quæ ante plures annos ex Italia nobis in Belgicam missa fuit Hyosciridis Pliniana nomine.

IACEÆ nomine hanc plantam appello, propter similitudinem quam habet cum ea quæ vulgo Iacea appellationem obtinuit, quam immutare nolui donec aptiorem aliquam inueniamus. Primum verò genus, Iaceam montanã squarroso capite: Alterum, Iaceã montanam villosò retiformiq; capite: Tertium, hirsuto capite: Quartum autem, echinato capite cognominari.

FREQUENTISSIMUM agro Vienne nsi in agrorum marginibus, siccioribusq; gramineis locis id Iaceæ  
sine

sine Stœbes genus esse dixi Hispanicarum observatio-  
num libro secundo, quod semine è Galliis misso nobis in  
Belgica natū fuit: nec iniuria, cum nihil aut certè mi-  
nimum inter se differant. Hallucinantur verò qui eam  
plantam cum Cyano minore confundunt, diuersa enim  
sunt: neq. minore altitudine excrescit Austriaca spon-  
te hîc in agrorum marginibus nascens, quàm Gallica in  
Belgicis hortis.

In collibus autem & montibus Viennensi urbi vici-  
nis provenit aliud genus multo humilius, magis inca-  
num, tenuioribûsque virgis, quod non multum ablunde-  
re videtur à minore illo Cyano.

NVSQVAM etiam non occurrit in silvis cum Pan-  
nonia tum Austriacae planta quam Matthiolus Ser-  
ratulam cognominavit: atque etiam in plurimis vdis  
pratis silvis contiguas.

## DE PTARMICA AVSTRIACA.

## CAP. XXXII.

CVBITALI assurgit hac planta caule, candican-  
te, Cyani amulo: folia infima caulis parte ad radicem  
numerosa, oblonga, angusta, supernè virentia, infernè  
molli lanugine incana, acidiusculo sapore, in ipso caule  
rariora & minora: caulis in aliquot ramos se spargit  
sustinentes capitula è squammis veluti argenteis im-  
bricatum sibi inuicem incumbentibus contexta, unde flos  
emergit elegans, duodecim aut quatuordecim foliis con-  
stans, duris, siccis, & mucronatis; colore primum albo,  
deinde ex caruleo quodammodo purpurascens aut Se-  
samoidis minoris Matthioli floris simili, nullo odore  
commendatus, sed sola venustate gratus, & immarcesci-  
bilis, colorisq. gratiam retinens per multos annos è tra-  
be suspensus aut inter chartas repositus: in ipsa verò





planta (si non euellatur) senescens subfuscum contrahit colorem: semen non multum absimile Sesamoidi minori, sed tenuius, copiosum inter albam lanuginem latet: radix singularis est & nigricans, dura, capillaribus quibusdam fibris septa, annua.

Exit plerisque aridis locis Vienna vicinis, secundum agrorum margines, omnium autem copiosissime ad Phasianos, etiam intra ipsa pomœria, ubi varij generis arbores sunt confite, singulis annis semine deciuo sponte renascens. Floret Iulio.

PTARMICÆ nomen huic planta imposui, non quòd sternutamenta moueat, sed quòd reliquis notis satis aptè cum Dioscoridis Ptarmica conueniat. Etenim tennes habet virgas, folia olea incana, molliora tamen, & Anthemidis quodammodo florem. Austriacā verò cognominaui, quòd duntaxat in Austria infra Anisum flumen, præsertim verò circa Viennam totius Austriæ metropolim sponte nascentem inuenerim. A mulierculis rhyzotomis Scabiosa appellatur, siccaq; in totum annum seruatur & venalis proponitur.

Sibi autem persuadent, illius decoctum pueris propinatum, aduersus fascinationes valde utile esse.

## DE TANACETO INODORO.

### CAP. XXXIII.

GRACILIBVS, firmis, duris, & cubitalibus, interdum verò sesquicubitalibus assurgit hac planta caulibus, per quos rara sparsa sunt folia pennata, Tanaceto vulgari non admodum dissimilia, odoris tamen expertia, gustu linguā vellicante & feruido, circa radicē maiora hirsutaque: flores in summo caule magni, Bellidis maioris flori propemodum æquales, octodenis aut vicens foliis albis nunc longioribus, nunc brevioribus, mediū orbē lu-

Tanacetum  
inodorum  
ampliore flo:





teum, ut in *Chamamelo* amplectentibus constantes: radix est minimi digiti crassitudine, obliqua, neque in rectum tendens, nigra & aliquot fibris hirsuta.

Provenit fere in omnibus utriusque *Pannonia* montibus non admodum editis, & silvis caduis.

Floret Maio & Iunio.

Tanacetum  
inodorum  
minore flore.

2. Exit etiam iisdem locis aliud genus, sola floris magnitudine ab hoc diversum: cuius videlicet flos *Matricaria vulgaris* flori sit similimus, aut *Cotula foetida*, eo quem modo descripsi multo minor.

MIHI non est compertum an aliquo nomine vulgari sit praedita haec planta, *Tanacetum* autem inodorum cognominari, quod cum nullo odore sit insigne, folia vulgari *Tanaceto* similia quodammodo habeat. Secundo generi autem similem plantam apud *Valentiam Allobrogum* observasse videtur *Lobelius*.

## DE ABSINTHIO.

### CAP. XXXIIII.

Absinthium  
vulgare.

PASSIM nascitur per *Vngariam*, *Austriam* & reliquas vicinas provincias *Absinthium* illud maius, quod reliqua opinor *Europae* familiare est. Inveniuntur tamen alia quaedam eius genera, nulli adhuc Scriptori ante meum in has provincias aduentum cognita, quae hoc capite describere constituimus: prius obiter mentione facta nonnullorum, quae vel sponte hic nascuntur, vel aliunde deuecta in hortis coluntur.

Absinthium  
ponticum  
vulgare.

SPONTE autem crescit non solum multis *Pannonia*, sed etiam *Austriae* locis, atque agro *Viennensi*, cum in saxosis, tum aridis & salebrosis, gramineisq; desertis agris *Absinthium* illud tenuifolium *Abrotoni* fere foliis, vulgo *Romanum* vel *ponticum* nuncupatum, mira fecunditate radicibus fibrosis & late serpētibus se propagans,



1. pagans, cuius duo videntur esse genera. Namq. unum planè incanum est, quo potissimum Viennenses officina
2. utuntur: alterum purpurascens habet cauliculos, & folia non adeò incana, sed supina parte viridiora: id à nonnullis superiori præfertur: existimo tamen natales duntaxat istam varietatem facere.

Ungaricum hoc tum vulgare maius communi nomine Iröm vocant.

IN cultissimo suo horto alit C.V. Ioannes Aicholzius medicus & professor Viennen. duo Absinthij marini genera, ut ex diuersis locis aduecta, sic etiam tota facie inter se discrepantia.

Absinth. marin. patavinu.

Nam quod Patanio hoc nomine allatum est, folia habet mollia, incana, lata, tribus, quatuor, aut ad summum quinis lacinis diuisa, interdum etiam nullis, ut Artemisiam folio lauendula quodammodo referant (à qua tamen differt) satis grati quidem odoris, sed amari saporis.

Absinth. marin. misnense.

Ex Misnia verò missum multifida habet folia, & succulenta, non minus quàm in superiore incana, proxime ad Seriphij in Belgica & Anglia maritimis nascentis folia accedentia, grauioris tamen paulo & validioris, ut mihi videtur, odoris, Seriphij narbonensis & hispanici (quod nusquàm nisi in mediterranei maris littoribus obseruare memini) graucolentiam quodammodo referentis, atque etiam saporem.

Absinth. pumilum Camerarij.

ACCEDIT aliud pumilum Absinthij genus vix palmi altitudinem superans, tenuibus admodum cauliculis, quos circa radicem multa exigua multifida tamen & incana ambiunt foliola non inuicundi odoris. Id in summis cauliculis quaterna aut quina fert capitula in pallefcentes flosculos ut superiorum sese explicantia.

Noriber-

Noriberga aiebat in fœtilibus C.V. Joach. Camerarius  
eiusdem urbis medicus.

CETERVM ad ea genera non vulgaria, quæ in  
his Provinciis nascuntur, transeamus.

PRIMI caulis pedalem altitudinem plerumque I.  
aquat, nonnunquam etiam cubitalem attingit, firmus, Abinth. au-  
canescens, multis foliis marini Belgarum absinthij fo- striac. tenui-  
liorum quodammodo æmulis, sed tenuioribus & omnino fol.  
incanis confuso ordine cum ambientibus præditis, qui  
superiore parte in multos ramulos ex tenuiorum adhuc  
foliorum alis nascētes diuiditur, plenos flosculorum pro-  
pendentiū corymbis: radix fibrosa est, & singulis annis  
nouos frequentioresq; caules profert. tota planta elegans  
est & rarior: sed impense amara.

Crescit in collibus & apertis quibusdam locis Vien-  
nensi urbi vicinis, atq. à rhizotomis promiscuè cum eo  
quod vulgo ponticum appellatur, ad Pharmacopola-  
rum Viennensium officinas adfertur.

RARVM etiam est Alterum Absinthij genus, nec II.  
vsquam nisi in Austria Styriaq; celsissimis ingis à me Abinthium  
observatum. Dodrantalibus autem assurgit cauliculis, montan. v m-  
belliferum.  
gracilibus, incanis, in quibus rara & exigua sunt folia,  
tota incana lanugine & veluti tomento obsita, circa ra-  
dicem maiora, Bellidis maioris foliis non admodum dis-  
similia, minora tamen & magis incisa, satiusque crassa,  
gustū valde amaro: summis cauliculis octoni aut plu-  
res insidet flosculi in umbellā distributi, floribus Achil-  
lea similes, sed maiores, septenis aut octonis candidis fo-  
liolis medium orbem ex aliis exiguis flosculis stilo luteo  
præditis efformatum cingentibus constantes: semen de-  
inde quale Absinthij vulgaris, odoratum: radix nigra  
est, ali-





est, aliquot fibris donata, & è lateribus propagines spargens.

Istud primum sub finem Junij anni 1574. floribus onustum observavi, & erui, dum ex Hohbergerin per summa iuga in Snealben tenderem, medio fere itinere, è scopulis præruptis & in altissima præcipitia (horresco referens) propendētib: deinde illo ipso anno mense Augusto, maiore copia in Etscherberg et Durrenstein cūm florens, tum semine pragnans, quod cum nonnullis plantulis in Belgicam amicis misi, è quibus hac icon delineata fuit.

MONTANI venatores Unserfratwen rauch, & Wepts rauch appellant, ad alterius cuiusdam planta differentiam, quam infra describemus. Ego Absinthij alpini umbelliferi nomen illi indidi, quoniam multas habet notas, quæ, ut inter Absinthij genera referre debeam, me impellunt. Si cui tamen hoc nomen minus ardeat, aliud pro suo arbitrio imponat per me licet.

VERVM subiicere hîc libet extemporaneum quoddam epigramma D. Pauli Fabricij Medici & Cæs. Mathematici, qui mecum, Doctoreq; Joanne Aicholzio & aliis quibusdam comitibus Etscherianum altissimum iugum tum temporis conscendit, ut illius montis vicinorumq; iugorum longitudinem & latitudinem, astronomico radio metiretur. Etenim præ manibus tum habebat totius Austriæ supra & infra Anisum chorographicam descriptionem, quam summa diligentia magnisq; sumptibus confecit, speroque propediem maxima cum omnium studiosorum voluptate & utilitate divulgatum iri. Dum igitur inter nos de nomine istius planta orta esset controuersia, ille sic lusit:

CARO-

## CAROLO CLVSIO CÆS.

AVLÆ FAMILIARI, ET REI

Herbariæ apud IMP. MAXIMI-

LIANVM II. præfecto.

Carole, dum lustras loca plena virentibus herbis,  
 In medio fessos colle morare pedes,  
 Adque Dioscoridem confer, quam cernimus herbam,  
 Hæc'ne sit Abrotoni femina vera vide?  
 An quæ deformi crescunt Absinthia campo,  
 Ad species iubeant hanc numerare suas?  
 Rara quidem planta est, verè dignissima noscî:  
 At certè verus gratior vsus erit.  
 Consultor tecum censens Aicholzîus illam  
 Iudicet, errori non det vt herba locum.  
 Sic hortos magnus vestros illustret Apollo,  
 Et radio flores fertiliore petat.

*Paulus Fabricius D. Cæs. Mathematicus  
 in iugis Et scherianis faciebat XXII. Au-  
 gusti M. D. LXXIIII.*

## DE ARTEMISIA TENVIFOLIA.

CAP. XXXV.

VVLGARIS passim in his regionibus est Arte-  
 misia illa vniversa Europa familiaris: sed eius etiam  
 qua tenuiore est folio, duo genera per Pannoniam, Au-  
 striam, atque vicinas Prouincias obseruauî.

I. VNUM crassa admodum, lignosa, multifida, & sa-  
 tis multis fibris minoribus donata radice cõstat: ex qua  
 plures

plures rami sparguntur humi plerumque fusi, interdum etiam recta assurgentes, lignosi & duri, per quos initio & ante hiemem multi nodi nascuntur, è quibus folia emergunt multifida & tenuiter incisa, Abrotoni foliis propemodum similia, candicantia, gustuque non admodum grato, sed postea aliquantulum saluam ciente. Inter hæc subsequens estatis initio tenues vimineæq; prodeunt virgula, purpurascētes, multis ramulis eiusdem coloris pradiæ, tenuiorib; que adhuc, quàm modò dixi, foliis septæ, qui parvis veluti corymbis propendentibus onusti sunt, Abrotoni, Artemisiæve, aut Absinthij modo, virescentibus, & interdum purpurascētib; , qui explicati, ex purpura candicantem ostendūt flosculum Augusti initio, interdum etiam Septembri.

ALTERVM simili fere modo crescit, sed plerumq. rectioribus pradiatum est virgis, iisque magna ex parte singularibus, firmis, lignosis, purpurascētib; etiam, & in frequentes ramulos simili colore donatos diuisis: folia licet superioribus respondeant, minus tamen incana sunt, sed potius ex viridi purpureoq; nigricant: tenues ramuli Augusto mense suis corymbis, ut in primo, onusti conspiciuntur, purpurascētib; ut plurimum: quo tempore totus caulis nudus, & suis foliis marcidis spoliatus apparet.

II.

Artemisa tenuifolia purpurascens.

Nascitur passim utrumque genus ad semitas, aridis salebrosisque locis, etiam ad Viennensis urbis vallum & fossas, nonnunquã & in vetustis muris et rudētib;.

AN commodè ad Ἀρτεμισίαν λεπτόφυλλον, Artemisiam tenuifoliam Dioscoridis hæc stirps referri queat, peritioribus dispiciendum relinquo. Hæc sanè odore illo Sampsuci caret, quo suam præditam esse vult: aut si quem odorem habet, is admodum tenuis & propè nullus est, præsertim in altero genere. Vngari Sepreu fiu, hoc Sepreu fiu est, scoparum

Ἀρτεμισία  
λεπτόφυλλος.

Sepreu fiu



est, scoparum herbam appellant, quod vulgo apud illos  
ex ea scopa fiant, ob quem etiam usum nonnulli Au-  
stria incola, praesertim apud Neapolim, *Wesem kraut* *Wesem kraut*,  
nominant.

## DE PARTHENIO ALPINO.

## CAP. XXXVI.

MULTIS ex fibrosa radice Chamameli modo fr- Parthenium  
alpinum.  
ticat ramulis, pedalis, viridibus, quos ambiunt folia  
Anthemidi omnino similia, multiplici incisione diuisa,  
Cotula aut. Matricaria fere odore, gustu calido, attamen non ingrato: extremis ramis multi flores insident  
umbellatim congesti, Absinthij alpini, modo descripti  
floribus proxime accedentes, hoc est exigua capitula ex  
albo & pallido commixta, ambiētibus ea senis aut octo-  
nis latiusculis albis foliis, eiusdem cum ipsa herba odo-  
ris: rami humi procumbunt, & ex una, uti dixi, radice  
prodeuntes, subinde fibras agunt, & noua germina  
procreant.

Inuenitur in Sneberg, Snealben & Durrenstein in-  
gis magna copia: florētque Augusto.

UT montani uenatores superiori *Wepßs rauch* no-  
men indiderunt, sic etiam hanc plantam vnser frawen  
schwartz rauch nomine donarunt. Ego Parthenium al-  
pinum appello, à Dioscoridei Parthenij odore, ad cuius  
etiam descriptionem satis accedere uidetur.

## DE PARTHENIO pleno siue polyphylo flore.

## CAP. XXXVII.

NIHIL prorsus à vulgari Matricaria differt aut Parthenium  
polyphylo  
flore.  
forma aut magnitudine: etenim cubitales aut ampliores  
interdum habet caules, striatos, in multas alas diuisos,  
folia vulgari perquam similia, et multis laciniis diuisa,

herbacei coloris, validi odoris, & amari saporis: extrema ala plurimos flores candidos & multiplici foliorum serie constantes ferunt, nullo aut perquam exiguo in medio, aureo disco, quemadmodum Chamameli flore polyphyllo flores quibus sunt persimiles: semen an fecundum sit ignoro, nam aliquoties satum, non provenit, sed surculus feritur veluti *Leucoium* pleno flore.

Hanc plantam primum conspexi Londini in Anglia, anno salutis humanæ 1579. quam inde Antuerpiam detuli, eiusque iconem & semina postea habui Viennæ C. V. Dn. Richardi Garth Cancellaria Londinensis primicerij & viri humanissimi munere, qui me multis beneficiis affecit: deinde longè frequentissimam anno 1581. cum Londinum seriorum quorundam negotiorum causa redissem, toto semestri istic harena.

Florere incipit Iunio, & tota deinde æstate flores proferre non desinit.

ADMODUM profectò ferax est Anglia huiusmodi florum multiplici foliorum serie constantium, quos arte & mangonio adquirant, ignoro: nam & Chamamelum, & *Lychnides* siue strea, & alias plerasque plantas pleno flore, Belgicam inde primum accepisse constat.

## DE MILLEFOLIO ALPINO.

### CAP. XXXVIII.

*Millefolium  
alpin.*

ELEGANS est hac plantula, dodrantalem aut palmarem altitudinem non excedens, multis foliis circa rad. cem stratis, tenuissimè incisis, & veluti è multis minutissimis alatis foliolis constantibus, nonnihil incanis: candicantes cauliculi, satis crassi, huiusmodi foliis usque minoribus & tenuissimè incisis obsiti: umbella flosculorum densissima uti in vulgari *Millefolio*, sed colore

colore rubro dilutiore siue carneo nitet: radix vix à vulgari differt, fibrosâ admodum, & summa tellure serpens.

Sponte prouenit in Iudenberg & Spital Styria alpi-  
bus: floret verò Augusto.

Natales ne id efficiant, an cultura, nescio: differre  
tamen videtur ab eo quod in Belgica simili propemo-  
dum flore in hortis alebamus.

## DE LEVCANTHEMO ALPINO.

### CAP. XXXIX.

HABENT etiam Alpes suas Anthemides: verum  
à vulgaribus diuersas, ut hoc & sequente capite de-  
monstrabimus.

LEVCANTHEMI porro folia, prioris Chrysan-  
themi, quod proximo capite describemus, foliis haud  
multum dissimilia sunt, nisi paululû magis incisa essent,  
crassa, succulentaq; (uti sunt multarum alpinarû stir-  
pium folia) gustu amarissimo, & nullo odore grata:  
cauliculi dodrantes, infirmi, in quibus singulares flo-  
res, Chamamelo maiores, luteo orbe, quem ambiunt vi-  
cena aut plura alba folia. Latè sese spargit hæc planta  
Chamameli modo, & fibrosas radices habet.

Leucanthemum alpinum.

Crescit in Iudenberg, Spital, & aliis quibusdâ Sty-  
ria iugis. Floret Iulio & Augusto.

MVLTVM accedere videtur ad eam plantâ quam  
peritissimus Angulara describit Leucanthemi Plinia-  
ni nomine, undecima opinione. Ille verò suum Leucan-  
themum odoratum facit: at hoc odore caret.

Leucanthemum Plin.  
Angularæ.





## DE CHRYSANTHEMO ALPINO.

## CAP. XL.

DIVERSIS *Alpium iugis diuersa inuenimus Chrysantheni genera.*

HORVM Primum multa habet secundum radicem I. oblongiuscula folia, Absinthio umbellifero similia, crassa, pollicari longitudine, in lacinias aliquot dissecta, viridia (nouella tamen nonnihil incana conspiciuntur) amaro sapore: caules aliquot dodrantes, aut palmares, rarioribus tenuiusq; dissectis foliis ornatos, striatos, in quibus veluti umbella denum aut duodenum luteorum florum, Iacobae vulgaris floribus non multum ab-  
Chrysanthemum iuden-  
bergenae.

similium & eiusdem odoris: radix crassiuscula est, multisq; candicantibus fibris capillata.

Prouenit iisdem quibus Leucanthemum iam descri-  
 ptum locis: eodem etiam tempore florens.

ALTERVM numerosa secundum radicem habet II. folia, multifida, Abrotoni maris foliis fere respondentia, dilutiore virore nitentia, & odore, si terantur, haud in-  
Chrysanthemum Etische-  
tanium.

grato, sapore vero amaricante & minimè grato: ex his caules exeunt pedales, minoribus foliis onusti, in aliquot interdum ramulos diuisi, qui singulos aut geminos sustinent flores Chamamelis vulgari maiores, inodoros, omnino flauos, medium orbem luteum cingentibus luteis foliis satis latis: radix fibrosa & nigricans est, pluresque à latere spargit ramos.

Inuenitur in Etzcher, atq. etiam in Snealben, Veyt-  
 alben, & aliis Styria iugis. Floret Augusto.

CYBITALES Tertio sunt caules, firmi, laues, ex  
 purpurea virentes, superiore parte in aliquot ramos di-  
Chrysanthemum Sneber-  
genae.

uisi: folia longa, tenuiter admodum incisa, Achillea  
 Matthioli, siue Abrotoni maris foliorum amula, lon-





giora tamen, crassiora & viridiora, quæ nullum gratum odorem spirant, gustatæque ingrata deprehenduntur & amariuscula: flores in extremis ramis umbellatim dispositi, lutei, Iacobææ floribus ferme similes, sed minores & inodori: radices sunt fibrosæ, candicantes, novosque caules è lateribus singulis annis proferunt, plerumque summa tellure fibras agunt.

Crescit in Sneberg & reliquis iugis in quibus Alterum genus, atque in hortos translatum feliciter provenit: florêtque Iunio, illic autem Augusto.

Ad χρυσάνθεμους Chrysanthemi genera referenda mihi videntur hæc stirpes. Quod si quis Iacobæis adnumerare malit, non refragabor: quandoquidem eas, ut plerasque alias, rei herbariæ studiosis duntaxat propono, ut eorum exquiram indicium.

Chrysanthemum Valentinum à Narbonensi dicitur.

CETERVM quoniam nostrum Lobelium existimare video, Chrysanthemum Valentinum à me in Hispanicis observationibus descriptum, non differre à Bupphalmo Narbonensis provincia, mihi sanè nō ignoto, utpote qui aliquoties eruerim apud Aquas mortuas vulgo nuncupatas, quas nonnulli Fossam marianā (quæ recte, nescio) appellant: Non erit à nostro instituto alienum, si ipsum reliquosque, qui fortè eius vestigia sequuntur, ab ea opinione liberare conatus fuero. Ipse Bupphalmo Narbonensi radiatos flores tribuit, & verè quidē: nā flores Camomilla vulgari similes, imò maiores habet, medium orbem luteum cingentibus lateis foliis, & plerumque (quod ipse omisit) subtus nonnihil purpurascens aut subrubentibus. Chrysanthemum Valentinum nulla radiata folia in orbis circuitu habet, sed iis caret, non secus ac Chamamelum illud Chrysanthemum odoratum, tamen si meum maiora habeat capitula, nec

ta, nec adeò in medio protuberantia, ut animaduertere potuerunt qui diligentius meam descriptionem legerunt, & possem, si opus foret, ex sicca planta è Valentino regno mecum delata, quam cum multis aliis rarissimis stirpibus siccis adhuc seruo, demonstrare, ipsiusque Pictoris, qui eius iconem in lignea tabella delineauit, testimonium in medium adferre. Præterea meum recto assurgit caule, tenuioraque habet folia: Bupthalmum verò iam dictum plerumque ramulos humi fusos habere, crassioraque folia obtinere memini obseruare, & inter siccas herbas è Gallia Narbonensi delatas adhuc me seruare arbitror.

Hæc eò dixi, non ut Lobelium mihi amicum perstringerem, sed veritatis (cuius semper fui assiduus sectator) duntaxat inquirendæ gratia.

PORRO Bupthalmum vulgare cubitalibus & amplioribus virgis, foliis alatis, florèque Chamamelino maiore, auri modo fulgente, vulgatissimum est per vniuersam Pannoniam, atque etiam ultra Drauum, & tota Austria: memini & in agris, & secundum vias passim nascens Moguntiacò agro obseruare, dum Vienne à Cæs. Maximiliano 11. feliciss. m. accerserer: cum autem in Belgicam anno 1579. proficiscerer, per Morauie partem, tota Bohemia, & Noribergensi agro conspexi.

Bupthalmum  
vulgare.

Rhizotoma huius Prouinciæ muliercule Gelbkassblumen vocant; Ungari ökör zöm: Croata, quorum mulieres eius stirpem tritam utiliter vulneribus imponere asseruntur, kachchi jezicach, hoc est, serpentis herbam appellant.

NEC minus vulgare est omnibus collibus apricis & siccioribus vtriusque Pannoniæ & Austriæ gramineis campis Bupthalmum Dodonæi, siue Pseudoelleborum

Bupthalmum  
Dodonæi.  
Pseudoel-  
leborum nigr.  
Matthioli.







nigrum Matthioli foliis fœniculaceis, floréque Anthemidis ampliore & auri fulgore splendente, cuius radices atque etiam integras plâtas rhizotomi in foro Viennensi venales habent, atq. pro nigro Elleboro proponunt magno errore, cum infra duodecimum, imò etiam septimum ab urbe miliare, legitimum Elleborum nigrum albo flore abunde nascatur, & inde commodè minimisque sumptibus adferre possent.

*Veratrum* autem nigrum alterum Dodonæi copiosè etiam crescit ad initium Viennensis saltus sesquimiliari ab urbe Viëna, qua ad monasterium Chartusianorum Maurpach, & Tulbingam iter est, locis umbrosis: aliis item eiusdem saltus vicinioribus locis ad silvarum margines.

## DE IACOBÆA PANNONICA.

## CAP. XLI.

VULGARIS illa multis Prouinciis planta, quæ ab Herbariis Iacobæa appellatur, per Pannonias etiam est frequentissima. Inueniuntur tamen & alie stirpes, quæ meo iudicio ad eius classem referri possunt.

1. PRIMA, Iacobæa vulgari admodum similis, nisi mollior tota esset, caulem habet cubitalem, striatum, in multas alas inequaliter diuisum, sub quibus folia admodum laciniata, mollia, & tenella, saporis amaricantis & calidiusculi, nec iniucundi odoris: flores in extremis ramis rariores quàm in vulgari, & minores pallidioresque, qui maturi in papposam lanuginè resolvuntur, cui subest semen vulgari simile: radix admodum fibrosa est, tametsi minimè perennis. Tota stirps mollis hirsutis & pingui quodammodo lentore obsita est.

Crescit in Pannonia & Austria caduis siluis, præsertim in Leyteberg, florétque Iunio.

Non

Veratrū nigr.  
alterū Dodo-  
næi.

Iacobæa pan-  
nonica mol-  
lior.



*Non admodum differre videtur ab ea qua in mari-  
nis Belgica aggeribus sponte prouenit: minus tamē tras-  
sa est, neque adeo succi plena.*

**II.** *TERNA, quaterna, aut plura habet Altera folia  
latiuscula, in ambitu nonnihil dentata, caulem cubita-  
lem plerumque, angulosum, gracilem, per quem temerē  
sparsa sunt folia infimis paulo minora, at in supremo an-  
gustiora, lata basi ipsum amplectentia: summo caule  
quaterni aut quini veluti in umbella nascuntur flores  
Iacobaeae vulgaris floribus non multum absimiles, ante  
quā explicentur ex atro rubescences, sed ubi aperti  
sunt, auri fulgore splendentes, quos in ambitu stipant  
quindena aut plura foliola per extremum, incisa, super-  
nē phoenicea, subtrius verò quodammodo rubentia: ij flo-  
res maturi in pappos abeunt, quibus obuolutum est ob-  
longiusculum nigricans semen, vulgaris Iacobaeae semini  
non dispar: radix non admodum magna, nigricans, te-  
nuibusq; fibris candicantibus donata, sub Autumnum  
noua denno filia latiora ad veterem caulem singulis an-  
nis producens. Tota planta mollis & quadam lanugine  
obsita conspicitur atque amaricans est.*

*Nascitur apud Nemethwywar aliisq; Pannonia &  
Austria inferioris montosis & caduis siluis.*

*Floret Junij initio, & sub eiusdem finem semen matu-  
rum est.*

**III.** *CUBITALI verò interdum excrescit Tertia cau-  
le, firmo, striato, quem ambiunt lata folia, rugosa, mu-  
cronata, per oras serrata, viridia, latiore basi, & veluti  
appendicibus quibusdam praeita ea parte qua caulem  
amplectuntur, sapore ingrato & nonnihil acri: quae verò  
ex radice germinant, rotundiora sunt & maiora, sed  
nullas appendices habent, minus tamen serrata nō sunt,  
quā superiora: summus caulis diuiditur in aliquot  
ramulos,*

*Iacobaea pan-  
non folio nō  
laciniata.*

*Iacobaea lati-  
folia panno-  
nica.*



ramulos, qui luteos omnino flores sustinet, Iacobaeae vulgari similes, multo tamen maiores, & ad Buphrthalmi amplitudinem accedentes, qui deinde per maturitatem in pappos evanescent: radix satis crassa est & candicans, atque subinde fibras agit ad latera, vulgaris Iacobaeae modo.

Provenit in Alpibus: nusquam tamen maiore copia quam supra Herrenalben, qua longus ascensus est in Durrenstein. Abundanter etiam inuenitur non procul à Zolonock. Floret Iunio & Iulio, in hortos autem translata etiam Maio.

Iacobaeae latifolia altera.

2. Crescit in iisdem montibus, sed praesertim iuxta fluentes rivulos & aquas, aliud eius genus longè maius, amplius & magis mucronatis foliis, prona parte aliquantulum incanis, caule plerumq. bicubitali: cetera fere conveniunt. Id maturius floret altero.

HANC initio ἀνώνυμον reliqui, cum nullum nomen meo iudicio satis aptum illi tribuere possem: à florū tandem similitudine inter Iacobaeae genera referre, & Iacobaeam latifoliam montanam cognominare placuit.

Conyza alpina Gesneri.

Videtur eius meminisse Gesnerus in descriptione Montis fracti his verbis. Conyza alpina genus, sesquicubiti aut amplius proceritate, corymbis florum luteis, fibris radicum albis pluribus & confertis, subamaris; à pecore non attingitur. Pastorum pleriq. Boni vocant, aliqui Goldkrut.

Hae eadē Simlerus ad finem Commentarij de Alpib.

## DE HORMINO SILVESTRI.

### CAP. XLII.

HORMINI silvestris appellatione comprehendo eum Scarleam valgo nuncupatam, tum eam quam nonnulli Colum Ionis vocant.

Scarleam

Scarleam autem sponte nascentem videre non meminimus: sed in hortis duntaxat cultam & admodum familiarem. Quæ verò præpinguibus est ramis flore luteo Colusq; Iouis cognominatur, per uniuersam Pannoniâ ad eò frequens est, ut nihil illa fere vulgatius sit ad collium & montium radices, atque etiam ad elatiorum hor-  
torum margines inter sepes & arbores. Est præterea tertium genus vulgo notum, de quo suo loco. Sed etiam ad Hormini siluestris classem referendas esse censeo nonnullas alias stirpes, quas in his Provinciis sponte nascentes obseruavi.

ALIQVOT habet Prior caules cubitali interdum altitudine assurgentes, quadrangulos, nonnihil hirsutos, firmos, geniculatos: folia magna, hirsuta, mucronata, per ambitum serrata, rugosa, singulis geniculis adnascuntur inter se opposita, Scarlea foliis haud multum absimilia, minus tamen incana, & odore minus graui: ex alarum caui oriuntur ramuli floribus purpureis, minoribus Scarlea floribus, & Lavendula vix maioribus, verticillatim vsque ad extremum onusti, inflexam & veluti procumbentem atq. natantem spicam efformantes: semen in vasculis pusillum, nigricans: radix illi magna, pollicari crassitudine, nigro cortice obducta, dura, vixax, singulis annis noua germina proferens.

Inuenitur passim Viennensi agro iuxta vias, & in montanis pratis circa Mariæ cellam, & S. Crucis abbatiam, supra Badenses thermas, & plerisque alpestribus Austria & Styria locis: quinetiâ apud Hirtzpach pagum ferri fodinis nobile supra Noribergam Pragensi itinere reperi. Floret Iunio, semen Iulio maturescit.

ILLIVS porro siluestris Hormini quiddam Gallitrichum quidam cognominant, non meminissim: nisi plures eius species nonnihil florum colore, & foliorum forma in-

Scarlea:

Colus Iouis.

I.

Horminum  
fil. lat. fol.  
akerum.

II.

Horminum  
fil. quartum.







ter se differentes inueniri obseruasse.

1. **OBLONGA** habet prior secundum radicem folia, parte inferiore latiora, deinde sensim in mucronem desinentia, nullis laciniis diuisa, sed per oras tantum serrata, supernè viridia & minimè hirsuta, rugosa tamè, infernè autè hirsuta, odore reliquorum Hormini generum grani, saporeq; amaro: caules cubitales, quadrangulos, geniculis distinctos, hirsutos, quos in singulis geniculis bina semper inter se opposita amplectuntur folia superioribus paulo minora: extremus caulis plerumque purpurascit, pinguisq; est, & desinit in oblongam, præpungentem, spicam florum hiantium, galeaq; editiore præditorum, colore purpureo saturatiore elegantissimo: semen deinde in calyculis rotundum, nigrum: radix crassa est, nigraque & multis fibris prædita, viuax, & singulis annis regerminans, nouosque caules producens, qui subinde secundum radicem fibras agunt.

Hormin. Gl.  
4. n. uero fl.

Hanc interdum variare animaduerti. Nam anno 1579. Maio mense unam stirpem inueni in siccioribus pratis Sopronio Pannonia vicinis, quæ candido omnino flore fuit, & foliis etiam incanis, non virentibus.

Hormin. Gl.  
4. diutius  
flore.

2. **ALTERA** eius species maiore altitudine excrescit, caulisq; suprema parte virescit, non autè purpurascit: flores tametsi superiori forma similes, dilutioris tamen sunt coloris: folia inferiora nonnihil laciniata sunt, in reliquis conueniunt.

Passim in siluis caduis, montanis pratis, viarumque marginibus sponte nascitur utraque, non modo in Pannoniis, sed aliis plerisque etiam Provinciis. Floret Maio, atque interdum Iunio.

Hormin. Gl.  
4. laetundulæ  
flore.

3. **SEDE** est & Tertia species secunda fere similis, Hispanico semine nata: etenim caules habet non minus altos, quadrangulos, nodis cinctos, hirsutos, & folia in singulis nodis

nodis fere similia, duriora tamen, lauiora, angustiora, & obtusiore mucrone, laxioribusque laciniis pradita, praesertim infima, qua secundum radicem nascuntur: calyculos in summis ramis extremoq; caule verticillatum in spicam desinentes, ex quibus emergunt flores reliquis speciebus longè minores, *Lanendula* florum ferme amuli, nec colore admodum differentes: in singulis deinde calyculis semina nigra: radix superioribus similis est, & tota planta simili cum reliquis odore pradita. Floret Iunio.

Nascitur & hac sponte in Anglia: nam cum anno 1579. istic essem, satis frequentem Grenwici quarto infra Londinum miliari, ad Regia arcis Hippodromum repperi initio Septembris cum florentem, tum semine onustam.

PEDALI plerumq. hac est altitudine, quadrangulis caulibus, geniculatis ut reliqua genera: folia in singulis geniculis bina, sibi inuicem opposita, rugosa, *Salvia* similia, non tamen incana, per ambitum nonnihil serrata, dura, gustu exsiccante & amaro, & odore, quam primo descripta incundiore: flores à medio caule ad fastigiū usq. verticillatim ex purpureis calyculis exeunt *salvia* similes, sed minores, eleganti colore ex caruleo purpurascente, & quasi violaceo, interdum verò dilutiore: semen deinde in calyculis nigrum, reliquis generibus minus: radix interdum minimi digiti crassitudinem aequat, nigroq; cortice tecta est, subius flavescent, multos singulis annis caules producit inferiore & terra viciniore parte humi procumbentes, atque è geniculis radici proximioribus subinde fibras agentes. Tota denique planta eleganti est aspectu.

Ubique circa Viennam nascitur, totaque Pannonia secundum vias, & in agrorum vineorumque marginibus,

111.

Hormin. 61.  
s. *salvia* folio





nibus. Tota adeò astate floret, & subinde semē profert.

Hormin. sil. s.  
versicolore  
folio.

2. Huius genus aliud est longè maius, duorum cubito-  
rum altitudinem plerumque attingens, aut etiam supe-  
rans, ipsius caules triplo crassiores, quadranguli tamen,  
& uti alterius geniculati: folia multo maiora & cras-  
siora, albis maculis magna ex parte distincta: spica flo-  
rum longior & crassior, flores verò cum forma tum co-  
lore similes, semine etiam conueniunt.

Rarius hoc est superiore, nec nisi in pratis, herbidis-  
que locis inuenitur: & paulo serius altero florere incipit.

SILVESTRIS Hormini ὀπρὶνὸν τὴν ἀγρίαν, ut dixi,  
genera videntur omnes hæc planta: nemini tamen legem  
imponere volo, sed cuique quo nomine eas donare velit,  
liberum relinquo. Mihi verò Scarlea vulgaris sine  
Sclarea quam Galli Oruale, Vngari Zent Ianos huc,  
hoc est S. Ioannis herbam vocant, Horminum siluestre  
primum erit. Quod primo loco descripsi, Horminum  
siluestre secundum. Colus Iouis luteis floribus, tertium.  
Siluestre Lobelij, Gallitrichum vulgo appellatū, Tra-  
gōque Wild Salbey dictum, quartum, cuius tertia spe-  
cies semine ex Hispaniis misso Baccharis nomine mihi  
nota est: Quod autem postremo descripsi, mihi quin-  
tū erit; rhizotoma muliercula Austriaca Wild Salbey,  
id est agrestem saluiam appellant, vulgoq; venalē pro-  
ponunt cum aliis balneariis herbis. Matthioli Hor-  
minum siluestre secundam eius speciem nominare vide-  
tur: Lobelius inter Verbaſci genera recensere maluit,  
& Verbaſcum nigrum salusfolium vocat, quod an lu-  
teo flore variet, nunquam observare memini.

Baccharis  
Hispanica.

## DE MENTHASTRO.

### CAP. XLIII.

Menthastrium  
vulgare.

PASSIM in his Prouinciis etiam nascitur Men-  
thastrium vulgare: sed duo alia præterea observari,  
partim

partim sponte hic crescentia, partim semine aliunde misso mihi nata.

CUBITALI aut ampliore *Primum* assurgit caule, quadrangulo, medulla pleno, multis nodis constante, ex quibus bini semper ex aduerso oriuntur ramuli similiter quadranguli, in quibus oblonga spica, verticillatim compositis floribus constantes, qui *Menthastrum* vulgaris, aut eius potius *Calamintha*, quā vulgo *Cattariam* vocant, floribus sunt similes, ex albidis, odore grato: folia aduersis inter se pediculis caulem & ramos ad singulos nodos ambiunt, menthaestro fere similia, sed magis ad *Cattaria* folia accedentia, colore viridi minúsque albicante quā *Cattaria* aut *menthastrum* vulgaris; menthaestri odore, acris & calido sapore: radix dura, lignosa, ex lateribus propagines spargens, ut reliqua congeneres planta.

I.  
*Menthastrum*  
montanum.

Sponte nascentem hanc plantam inueni primū ad *Austriacarum* alpiū radices, in pratis monasterio *S. Crucis* vicinis & ad *Rehenaw* *Præsulis* *Nembergensis* arcem, Augusto florentem: deinde copiosissimam in *Ungaria* ad radices scopuli in quo extructa est minutissima arx *Nemethwywar*, Germanis *Gyssing* dicta *Ill<sup>us</sup>* ac *Mag<sup>us</sup>* *Dn. Balthasaris de Batthyan* *Regaliū* *Dapiferorum Magistri*, & *C. R. Q. M<sup>us</sup>* *Consiliarij*, atque etiam in *Leytenberg* supra *Manderstorf* Junio florentem, quo tempore etiam in hortos translata flores producit.

ADNUMERANDA *Menthaestri* generibus etiam videtur ea planta, quæ ex *Hisp* unico semine *Calamintha* tertia nomine mihi misso nata est.

Etenim cubitales habet caules, quadrangulos, rectos, frequentibus nodis cinctos, subhirsutos: folia oblonga, rugosa, per ambitum nonnihil serrata, superioris *Menthaestri*

*Menthastrum*  
tuberosa-  
dice.









thæstri foliis admodum similia, magis tamen incana, ingrato odore, amaro & calido gustu, singulos nodos æquali, sed opposito inter se situ ambiunt: summi rami extremusq; caulis in molles atque incanas exiguum foliorum spicas desinunt, inter qua verticillatum compositi flores prodeunt candidi, exigui, Cattaria florum æmuli: semē deinde illi persimile, pusillum nigrum: radix crassa & succulenta raphano fere similis, foris aliquātulum fusca, in multos hinc inde ad latera quasi paruos nappos extuberat, aliisq; oblongis fibris donata est: perennis est & plures singulis annis caules profert. Floret Junio.

Cattaria minor Hispani-  
sem. nata.

EODEM tempore, Calamintha prima nomine, semen ex Hispaniis etiam missum, ex quo pulcherrimum Cattaria genus enatum est, cubitales habet caules, quadrangulos, geniculatos, multis alis concauos: oblonga folia, angusta, per oras crenata, incana, odore Cattaria vulgaris vehementiore, feruido gustu: flores spicatim in extremis ramis nascentes, candidos, vulgaris Cattaria floribus respondentes: deinde semen in calyculis nigrum, calamintha semini par: radicem duram, lignosam, fibrosam, perennem, & singulis annis novos caules proferentem. Floret Iunio & Julio.

PRIMUM, cognominavi Menthæstrum montanum: Alteri, tuberosa radice nomen addidi, quod radix in alias crassiusculas radices extuberet.

## DE MARRUBIO PANNONICO.

### CAP. XLIIII.

Marrubium  
vulgare.

RARIUS est Marrubium vulgare in Austria & Pannonia, certis que duntaxat iisque paucis locis sponte nascens inuenitur. At aliud quoddam genus est frequentissimum, quod à nemine adhuc descriptum memini.

Marrubium  
pann. alpestris.

MULTOS ex eadem radice caules profert cubitales in-



les interdum, quadrangulos, firmos, nodosos, in multas alas diuisos: folia ad singulos nodos bina, contrario situ nascentia, duas uncias longa, unam lata, in ambitu serrata, marrubio vulgari fere similia, sed angustiora, nec adeò orbiculata, & paulatim à pediculo in latitudinem excrescentia, sensimq; in mucronem desinentia, omnino incana, odore incundo, gustuq; amaro & calido: flores candidi marrubio similes in mollibus & incanis calyculis nascentes, verticillorum instar summum caule summusq; ramos ambiunt: radix vulgari similis, et singulis annis novos stolones eosque numerosiores proferens.

Adeò vulgare hoc genus est toto Viennensi agro, ut vinetorum agrorumq; margines, sicciq; & graminei campi eo abundant. Nullo tamen, quod sciam, apud illos in vsu est. Floret Iulio.

## DE GALEOPSI maxima Pannonica.

### CAP. XLV.

Galeopsis pā-  
non. maxima.

CVBITALI plerumque est caule, interdum etiam maiore, quadrangulo, crasso, secundum radicem rubente, frequentibus geniculis pradito, è quibus bina semper inter se opposita nascuntur folia, vertice foliis hand ab- similia, similiter per oras crenata, sed longè maiora, palmaremq; amplitudinem sapissime superantia, hirsuta quidē sed minimè mordacia: à medio caule sursum versus, ad singula genicula verticillatim seni, octoni, interdum deni nascuntur flores, non simul, sed successiuè sese explicātes, lamij floribus multo maiores, impense rubri, & veluti purpurei, galeati & hiantes, labro inferiore bifido, atque per oras laciniato, frequentibus ad latera barbulis pradito, interiore parte purpureis & candidis lineis depicto, staminibus quatuor cum stilo sub galea latentibus, odore graui, & ingrato, uti tota planta, si re-  
ratur,





ratur, atque ingrato & amaro gustu: laciniati calyculi deciduis floribus quaterna semina continent Molucca similia: radix crassa & fibrosa perennisque est, singulis annis augmentum sumens pluresq; stolones proferens.

Maxima copia nascitur in montibus illis siluosis arcu Grebén sapius memorata vicinis supra Warasdinum. Floret Maio.

## DE LAMIO PANNONICO.

## CAP. XLVI.

PEDALES & maiores interdū habet caules, quadratos, hirsutos, Lamij amulos, quibus, per intervalla, bina semper inter se opposita, veluti in urticarum genere, innascuntur folia, Melissophyllo fere similia, rugosa, sed atro virore nitentia, gustu aliquantulum calido: flores ex singulis alarū cauis terni aut quaterni prodeunt, antrorsum omnes spectantes & propendentes, oblongi, inodori, lamij florum amuli, sed maiores & nulla galea insigniti, inferiore labro propendente, reliquis foliis (quae aut candida omnino sunt, aut nonnihil interdum purpurascentia) maiore & purpureo: calyculi sine viriculi ex quibus flores prodeunt satis magni & capaces, ex viridi pallentes, semen magnum, nigricans, inaequale continent: radix crassiuscula & aliquantulum nodosa multas fibras agit, & novos singulis annis caules profert ut urtica, & quaedam alia congeneres planta.

Eius altera species observatur in eo solummodo differens, quod illius caules singulis annis frequentiores, at quodammodo infirmiores repullulent, illiusque folia paulo sint angustiora.

Copiosè in Leytenberg, in monte Badensibus thermis imminenti, alijsq; editis Austria & Pannonia locis, sed umbrosis & siluosis inuenitur. Floret Maio, semē maturum est Iunio.

Reperitur etiam flore omnino niveo, sed rarissimè. Apud Lausannam verò in Allobrogibus, nullum aliud quàm flore omnino albo videre memini, anno 1554. dum è Narbonensi Gallia per Heluetios in patriam redirem.

Melissophyl-  
lon Fuchij &  
Tragi.

FUCHSIVS & Tragus hanc plantam Melissophyllon appellarunt, cum tamen exigua odoris gratia prædita sit, & apes eius floribus non admodum delectentur: & haud scio an apta sit ad aluearia intus cõfricanda, uti vulgaris melissa est, qua omnium Doctõrum iudicio verum *μελισσόφυλλον* Melissophyllum censetur. Ego ad Lamiy genera potius referendam arbitror.

II.

Lamium ver-  
ticæ folio.

ALIUD est præterea Lamiy genus exoticũ, cui dũ primũ semine emergit subrotunda sunt folia, mollilanugine hirsuta, per ambitum serrata, urtica similima, oblongis pediculis innitẽtia, inter qua altero anno emergit caulis modò sexangulus, modò quadrangulus, molli lanugine pubescẽs, per quẽ ex intervallis aequaliter semper & aduerso situ sparsa sunt folia modò terna, modò bina, superioribus minora, & brevioribus pediculis hærentia, & quorum alis nunc bini, nunc terni pro foliorum numero exiliunt unciales pediculi, tenues, firmi, hirsuti, ternos vel quinos flores sustinentes, qui concavi sunt, anteriore parte nonnihil hiantes, exiguo labello prolabente, & tenui stilo cum staminulis emergente præditi, colore ex viridi pallecente: floribus succedunt capitula Lini, aut potius Scrophularia vulgaris, mucronata, tenui nigroque semine plena: radix urtica similis obliqua & multis fibris capillata.

Hanc stirpem primũ florentem observavi Vienna in meo hortulo ad parietẽ natam nescio quo semine anno 1578. subsequens hiems abstulit: sed deciduo semine prognata sunt subsequente anno aliquot planta, quæ de-

mm an-









*mum* anno 1580. flores protulêre.

*Floret Maio,*

*semen Iunio maturescit : deinde tota planta radicitus perit.*

III.

*Lamium pe-*  
*regin.*

*SED & ad lamium fortè referenda est elegans hac planta, quæ ex radice urtica vulgari simili, plures profert pedales cauliculos, teretes, quadrangulos, frequentibus nodis cinctos, ad quos alternatim bina contrario situ in oblongis pediculis æqualiter nascuntur folia, Lamio, siue urtica nõ mordaci vulgari & fœtida quæ purpureo flore est, similia, vel proximè ad Hedera terrestris siue Chamacissi vulgaris folia accedētia: inter quæ calyculi terni, quaterni, aut quini, continentes flores hedera terrestris floribus forma proximos, hiantes, nulla supernè galea eminente, sed latiusculo folio reflexo duntaxat, mixtis coloribus caruleo, albo, & purpurascente insignitos.*

*Nascentem nunquam videre cõtiguit: sed iconem suis coloribus diligentissimè expressam mihi dono dedit anno 1579, Ill. Dn. de Batthyán.*

## DE BETONICA.

### CAP. XLVII.

*Betonica pur.*  
*flo. duorum*  
*gener.*

*NULLI sunt in Pannonia, Austriaque, & vicinis provinciis montes herbosi, nulla silva, nullæve prata, in quibus non abundatissimè promeniat Betonica flore rubro siue purpureo: quæ duorum generum esse videtur. Alterum enim breviori spica maturiusque florente est: Alterum longiore, molliore, atriore, & serius florente. Solet etiam hoc postremum genus in maiorem altitudinem excrescere, licet in eodem loco sponte nascatur, vel eadem cum altero areola excolatur.*

*Betonica albo*  
*Bore.*

*SED Alia etiam Betonica mihi observata est multis foliis pradiata, rugosis, subhirsutis, per ambitum serratis,*

ratis, *Betonica vulgaris* foliorum omnino amulis, minimè tamen adeò atro virore nitentibus, sed dilutioribus: quadranguli caules geniculatique & subhirsuti in pedalem altitudinem excrescunt, subindèq. extrema parte in alas diuiduntur: folia in singulis geniculis caulem equali situ ambientia, superioribus minora, nulloque pediculo fulta, odorata quemadmodum illa, gustuq. amaricante: summi caules & rami in densam calyculorum spicam desinunt, è quibus flos emergit vulgari forma similis, sed colore omnino albo: semen deinde in vasculis vulgaris *Betonica* semini par, fuscum: radix non dissimilis, perennis, singulis annis aurescens, & plures caules proferens.

Crescit in ascensu montis *Neuberg*, in *Etshero* & aliis quibusdam editioribus locis: sed omnium copiosissimè supra *Zeehof*, magno ultra *Gamingam* miliari, qua iter est in *Herrenalben* & *Durrenstein*.

Floret istic Iulio.

Huius meminit diligentissimus peritissimisque *Cordus* lib. 2. *Historia Plantar.* cap. 159.

## DE SYDERITIDE PANNONICA.

### CAP. XLVIII.

*SYDERITIDIS* in hac Prouincia & vicinis locis nascentis tres species obseruantur; ab ea quam in *Hispanicis* obseruationibus exhibui, diuersa.

PRIOR caules habet quadrangulos, cubitales, hirsutos, geniculatos, folia ad singulos nodos bina, ex aduerso nascentia, rugosa, hirsuta, *Hispanica* foliis maiora, & per ambitum serrata, sapore amaricante & calidiusculo: ramuli ad singula genicula nascuntur minoribus foliis obfiti: flores summum caulè verticillatim ambientes in spicam desinunt, *Hispanica*q. floribus persi-

*Syderite* p.  
non. spicato  
flore.

miles sunt, maiusculi tamen, odorati, candidi, hiatumque, siue rictum sanguineis punctis conspersum habentes: semen in pentagonis calyculis inaequale, nigrum: radix inutilis est.

Passim siccioribus agrorum & silvarum caduarum marginibus obuia est, quemadmodum & plerisque aliis Germaniae locis.

II.

Syderitis pan-  
non. capitato  
flore.

ALTERA humilior est priore, neque pedalem excedit altitudinem, & in pauculos ramulos diuiditur: folia priori similia obtinet, molliora tamen: flores ampliores quam in superiore, albi, pallescente labro, & pauculis rubris punctis asperso, verticillatim in utriculis caulem supremosque ramulos ambientes, breuiorem quam in priore & obtusam spicam conficiunt, uti in Prunella.

Nusquam non occurrit in agris & inter segetes multis Pannonia & Austria locis. Floret Iulio.

III.

Syderitis pan-  
non. palles-  
cente flore.

TERTIA pedalem etiam non superat amplitudinem, caule quadrangulo, ab radice statim ramoso: foliis secundum radicem priori genere non breuioribus, similiterque venosis, sed mollioribus, minimeque in ambitu serratis, quae summum caulem & ramos ambiunt, breuiora sunt: flosculi statim à ramorum exortu ipsos & caulem in calyculis quinquepartito diuisis verticillatim ambiunt, superioribus longè minores, & è calyculis vix prominentes, forma tamen illis similes, fusci coloris, labello tamen interiore parte pallido: semen superiorum semine minus, nigricans: exiguorum foliorum pallescentis coloris coma extremos ramos caulemque occupat, totaque adeo planta molli incanaque lanugine praedita est: radix candidicans, lignosa, aliquot fibris hirsuta, sed non perennis, quippe quam maturo semine subsequens hiems tollere solet, uti & priores duas.

Frequentissima est in Pannonia Austriaque inferioris arvis



ris aruis & inter segetes macro & sterili solo: florétque  
Iunio & Iulio, semen subinde Iulio perficiens.

PRIMA & Tertia à rhiZotomis mulierculis  
Fuls peerkraut appellantur, siccataq; in vsum adser-  
uantur.

Earum etenim decocto pedes & alios artus defati-  
gatos, aut alioqui rigentes, utiliter foueri pradicant.  
Prima Ungaris Tiztös flu, id est, nobilis herba dicitur.

Sed etiam aduersus capitis dolorem, quem Styri  
Fuels peerk appellant (vnde & herba nomen) ipsum si-  
mili decocto lauari, abs nescio quo indocto empirico me-  
dico persuasi, utile consent.

## DE PARIETARIA filuestri quorundam.

### CAP. XLIX.

SVPERIORIBVS quodammodo cõgeneres sunt  
ha planta, quæ in tres species distingui queunt.

I. **QUADRANGVLO** Prior assurgit caule, pedali,  
Parietaria fil. subhirsuto, nodoso, in quo bina semper ex aduerso na-  
scarul coma. scuntur alternatim oblonga folia, secundum ped:culum  
lata, & sensim in mucronem desinentia, aliquantulum  
hirsuta: summus caulis & rami desinunt in foliorum,  
superioribus minorum, & ad pediculum laciniatorum,  
molliq; lanugine pubescentium, colorisq; purpurei, nunc  
dilutioris, nunc saturatioris elegantissimi & violacei  
comam; inter quæ bini semper inter se oppositi flores na-  
scuntur, oblongi, concavi, aliquantulum hiantes, supe-  
riore labro nõnihil reflexo et subhirsuto, inferiore latius-  
culo & deorsum propendente, calore luteo primum, de-  
inde omnino aureo, omnes tamen, licet alternatim &  
contrario situ nascentes, antrorsum spectantes & por-  
recti, quod pictor non obseruauit: radix candicans  
est, & inutilis.

ALTE-

ALTERA caulem etiam pedalem habet, rarò ampliore, quadrangulum, nonnihil purpurascens interdum, statim à radice in ramos divisum, qui alternatim aequali semper, attamen contrariò situ nascuntur: sub his expanduntur folia oblonga prioribus similia ferre, virentia, ingrato & nonnihil acris sapore: flores in summis ramis inter pinnata & angusta folia nascentes, ut in priore, minores, coloreq; luteo, qui tamen in marcescentibus exalbescit, rictu manente luteo: radix cum superiore convenit.

II.  
Parietaria fl.  
flo. luteo.

Crescunt in sepibus & silvarum marginibus, umbrosisq; locis Vngaria, Austria, Moravia, Bohemia, atque etiam Germania.

AD has referenda esse videtur quæ in omnibus fere Provinciis inter segetes nascitur. Etenim superioribus quodammodo similis est, licet angustiora habeat folia, & quæ comam cõficiunt tenuius etiam laciniata, totaq; rubra aut carnei coloris: flores etiam prioribus formæ similes, coloris tamen varij, nam labrum inferius cum galeola & extrema cauda purpurascunt, media pars quæ circa rictum turget, lutea est: succedunt in calyculis vascula fuscum semen continentia.

III.  
Parietaria fl.  
purpurascens  
se coma.

Sunt omnes annuæ, & semine maturo perire solent: florent autem Maio & Junio.

QVO nomine Latino hæc donari debeant, ignorare me fateor: sunt tamẽ qui priorem silvestrẽ Parietariam appellauerint: Alteram Cratægogonon, Tertiã triticum vaccinum, Melampyrum vocent, & Alopecurum Plinij esse putent. Plinij tamen Alopecuros, si quis diligenter perpēdat, à Theophrasti Alopecuro handquam differre comperietur, Atrebatenses etiam à coma colore rubram herbam cognominant.

Cratægogonon  
Melampyrum  
Alopecuros  
Theoph. &  
Plinij.

Nullum, quod sciam, in medicina usum obtinuerunt:  
sed







sed plerumque negligi solent. Posterioris autem semen in occidentali Flandria parte, ubi copiosissime inter segetes (rusticorum plerumq. negligentia, qui eam tempestive non euellunt) nascitur, panem vitare solet, & atriorem reddere: quinimo is qui eo vescitur, plerumque caput grauedine tentari solet, non secus atque si lolo victitassent.

## DE PRVNELLA ET BUGVLA.

## CAP. I.

LICET eadem Prunella & Bugula genera his inueniantur, quae aliis Prouinciis communia sunt: nonnulla tamen etiam nascuntur quae ab aliis minimè obseruata esse video, de quibus hoc capite agere instituimus.

I. HABET autem illarum Prior dodrantaem caulem, quadrangulum, hirsutum, geniculatum: folia in singulis geniculis bina, ex aduerso sita, subhirsuta, vulgaris Prunella foliis fere respondentia, gustu amaricante: capitula in summis caulibus crassiora quàm vulgaris; flores illius floribus forma quidè similes, sed longè maiores, nec ingrati odoris, ventre (quod pictor non obseruauit) laxiore, galea<sup>q</sup>, saturatius plerumque purpurascente, tametsi inueniantur nonnunquam dilutiores & quasi exalbidi, semina in singulis calyculis quaternis plerumque: radicem nigram, multis crassiusculis & candicantibus fibris praeitam, nouisq. propaginibus sese singulis annis augentem.

Inuenitur non modo in Pannonia, sed multis aliis Europa Prouinciis, editioribus & gramineis locis. Floret Iunio, Iulio, & Augusto, & subinde semen profert.

II. ALTERI dodrantaes similiter & quadranguli sunt cauliculi, hirsuti, ramosi, & singulis geniculis bina cōtrario semper inter se situ proferetes folia, non ut vulgaris subrotun-

Prunella maior.

Prunella la-  
cinia to folio.





subrotunda, sed longa, & in aliquot profundas lacinias diuisa, sapore quemadmodum vulgaris adstringente: flores summo caule summisq. ramis spicatum ut in vulgari nascentes, a quibus forma quidem non differant, sed color subinde variat: nā vel niveus est, vel cinereus, vel carnei coloris, vel purpureus est, qualē etiā Mompeluano agro post monasteriū Egremot ad siluula marginem olim colligere memini: semen item per simile: radix fibrosa est, ex qua prodeuntes singulis annis nouae virgæ fibras plerumque agere solent.

Prunellæ Bon-  
tum varietas.

Gaudet & hec herbida & gramineis locis, licet inter saxa locis à fluminibus nonnunquam inundatis inuenerim. Floret maturius superiore, nempe Maio, tamen etiam Iunio.

TERTIA minime differt ab ea quam vulgo Bugulam & Consolidam mediam vocat, seu forma seu viticulis summa tellure repentibus, quæque nunquam flore caeruleo, interdum cinereo, atque etiam omnino nullo inuitur: nisi quod illis mihi paulo tinerior videatur, florēsq. qui in illis sunt aut caerulei, ut dixi, aut nivi, in hac rubri diluti, siue carnei conficiuntur.

III.

Bugula carnei  
coloris Boie.

Florentē cum aliis Maio primū inueni anno 1577. non procul Zolonock in accliu nemorē si cuiusdam collis. deinde iterum anno subsequente quodam prato ad monasterium Maurpach aliquot eius plantas erui.

CETERVM quæ Bellis media à Matthiolo, maior autem à Lobelio nuncupatur, in observationibus, vulgōque ex Consolida minoris generibus censetur, frequentissima est in alpinis pratis, unde illam sapius in hortos transfulimus.

Bellis media.

## DE CHAMÆDRY.

## CAP. LI.

FREQVENTISSIMA etiam est his in Promontoriis Chamædrys legitima, nulli etenim agrorum paulo editiore loco sitorum, nulli vinearum margines sunt, quæ ea non abundant. sed & interdum secundum publicas vias gramineis locis nascitur.

Duorum porrò est generum.

I. VNA vegetior & vberior, longioribus, crassioribusque virgis, amplioribus & succulentioribus foliis, longiore florum coma, maioribusque & dilutioribus floribus.

II. ALTERA minor, gracilioribus virgis, minoribus foliis, brevioris florum coma, & minoribus saturatiusque rubentibus floribus.

2. Istam candido flore variantem apud monasterium Holtzkirche infra Wirzburgum anno 1579. mense Iulio observavi & erui.

Omnium autem radix latè serpit, lanugine pubescens virga quæ humi diffuse fibras plerumque agunt, & serrata sunt folia.

III. CETERVM elegans aliud genus inuenitur quæ dodrantalibus serpit ramulis, colore ex fusco rubentibus, duris, lignosis, foliis nulla serie eos ambientibus, Chamædrys legitima folia referentibus, sed paulo minoribus, & subtus incanis, gustu admodum adstringente & exsiccante: flores illi in oblongis pediculis singulares, tribo octo aut nouem foliis constantes, Cisti femina floris præmodum magnitudine, multis staminibus in medio præditi, inodori; quibus decidentibus villosum succedit fructus, quale fere Caryophyllata alpina flore aureo superius descripta. radix est dura, lignosa, in diuersa tendens & quibus-





quibusdam nigricantibus fibris prædita: quin & interdum humi procumbentes & sparsi rami fibras a humis, ut integri nonnunquam cæspites ea lecti conspiciuntur.

Frequens est in summis Austriacarum et Styriarum alpium iugis: floretque Iunio, nempe solitis nubibus, semen vero ad maturitatem peruenit Augusto, deinde pediculi omnino exarescunt. In hortos translata & umbroso loca tenuique solo reposita, aliquamdiu persistit, & maturius floret.

Herba cerui.

HANC Gesnerus libello De raris & admirandis herbis in descriptione Montis fracti, Herbam cerui ex quorundam sententia, ni foliorum, appellat: & Iosias Simlerus Commentario de alpinis, Hirtzwurtz & Chamaedryn alpina n.

## DE TEUCRIO.

### CAP. LII.

ALIQVOT stirpes per Pannoniam & vicina loca observasse mihi persuadeo, quæ plurimum ad Teucryla horum accedunt: quæ, quoniam à nemine descriptas video, operæ precium me facturum arbitratus sum, si earum descriptionem meis observationibus insererem.

#### I. CUBITALES vero atque etiam ampliores habet

Teucryum  
maius pannon.  
latifol.

Prior canes, frequentes admodum, ex una radice procedentes, quadrangulos, subhirsutos, nodis distinctos: filia Chamedry fere paria, aut illius foliis, quæ à nonnullis sacra herba existimata est (de qua ad huius caput calcem) similima, bina semper inter se opposita parvum serrata, gustu amaro: summi caules rari rarios diuiduntur, ferentes oblongam spicam florum caruleorum quatuor foliis constantium, quorum, quod superiorem partem obtinet, latiusculum semper est, verisimiliterque distinctum, duobus intus staminibus & stilo, qui marcescent-



marcescentes integri desinunt: siliquula deinde bifida, plane uti in veronica generibus, semine exiguo perennans: radix fibrosa admodum est & perennis, singulis annis novos caules producent, qui infima parte secundum matrem fibras etiam agunt, & sese propagant.

Crescit in omnibus collibus & montibus Pannonia et Austria, plerisque Bohemia, & nonnullis Germaniae, atq. etiam ultra Dravum periosis locis herbosis tamen & inter frutices.

2. Illius genus invenitur in herbosis collibus magis paulo humilioribus, foliisque angustioribus: alioqui in caeteris convenit. Floret utrumque genus Maio: Primum etiam Iunio & Julio.

Teucrium  
pannon. ma-  
ius angustif.

II.

Teucrium pan-  
non. minus.

MULTA statim à radice fundit Altera virgulae dodrantales, purpurascens, humi procumbentes, quae alternatim bina semper ex aduerso sita ampliatuntur folia, Chamedryos foliis forma & colore similia & similiter per oras serrata, minora tamen, gustu linguam exsiccante, deinde amarissimo: summa virgula in ramulos diuisa, numerosis flosculis: nuda sunt etiam nascentes gestant, quatuor foliis constantes, & ex quibus superiorem floris partem occupat reliquis semper maioribus & latiore, cui circa umbilicum duo staminula callosa, stylisque è medio umbilico protuberant, integri deinde flosculi, qui sunt aut cerulei coloris saturatissimi & elegantissimi, aut dilutius & quasi cinerei, sponte decedentes, ut in Priore, siliquulas relinquunt planas exili subruisso semine plenas: radix etiam admodum fibrosa & perennis, singulisque annis quemadmodum Aliam novas virgulas proferens: quae & nonnumquam ipsa virgulae secundum radicem fibras agunt.

Nascitur fere omnibus siccioribus agris incultis, herbosis, aggeribus & colliculis secundum viam publicam inferiorem.



inferioris Austria, praesertim Viennensi agro, & apud Neapolim loci natura munitissimam.

Floret Maio.

2.

Vnicam huius inueni plantam anno 1579. ad radicem montis pago Glasensfeld imminētis secundo a Neapoli iam memorata militari, quae florem ex carneo candidantem haberet, circa umbilicem carnis venis distinctum, carnei quae coloris stamina & stilum.

Teucrium  
minus flore  
candidante.

III.

AT in summo Etscheri iugo, nec usquam alibi, Teucrium quoddam genus observari: pumilum admodum, cor- drantalibus fere virgulis quadam lanugine pubescentibus, quas bina semper inter se opposita ambun- filia, minoris Chamaedryos foliis satis respondentia, inter quae summis virgulis oblongiusculi enascuntur e barbati calyculis flores, a superiorum forma diuersi, concavi, per extremas oras laciniati, latiores, colore caeruleo, e quibus duo staminula cum oblongo stilo exeunt: defluentibus integris flosculis succedunt crassiores et rariore filiquae, exiguo semine plena: radix etiam per summa pergit, tenuibusque fibris praedita est.

Teucrium  
etscherianū.

Floret July initio, Augusto semen maturum est.

NULLUM vulgare nomen istarum stirpium adhuc ediscere potui: nō incommode autē nico iudicio ad Teucri genera referentur.

VULGARE porro est tota Pannonia, Austria, Styria, Interamni, atque etiam Bohemia Teucrium illud quod passim in Hispaniis, Gallia, Germania, Belgicāque herbosis locis nasci conspicitur, foliis Chamaedryos fere, & eius nomine à vulgo interdum nuncupatum, C.V. Dodoneus aliquando Sacram herbam appellavit, flore caeruleo pulcherrimo.

Sacra herba.

DE V.









rami in spicas defcunt flosculorum ceruleorum ficut congestorum, quatuor foliis constantium, in quorum umbilico duo staminula cum exiguo stilo: semen in vasculis bifidis planis quidem, sed aliq. anulum turpenti- bus & pulmentis exile adhaerens & rufum.

2. Habet etiam Secundum genus alteram speciem, quae media habet inter utrumq. genus folia, hoc est isto par- to latiora et caules minus ramosi, delatiorumq. spicam spicant: sapor quidem adstringens & exsiccant, sed non adeo vehementer ut in prima specie.

Inuenitur utrumque genus cum suis speciebus in multis Pannoniae siluosis montibus gaudetque caeteris Styriacarum verò & Austriacarum alpinum radices omnes species alunt. Florent Iulio, interdum etiam Iunio, in hortis praesertim: semen Augusto & Septem- bri maturum est.

- III. TERTIUM pedalis est surculus, duris, lignosis, lentis & flexilibus, humi sparsis & diffusis, & veluti cinctus frequentibus nodis, unde ex aduerso semper utrumque ramuli enascuntur virescentes, in quibus bina semper inter se opposita foliola, tria, crassa, scin- da, splendens, oblongiuscula, & maculis crevis per- rata, gustu amaro: extremis ramulis sicut aut octonis in- sident flosculi, ex aliarum sinu produntes, quatuor ut plurimum, inter duos quinque foliis constantes, ceru- lei coloris eleuantur, pallente umbilico, & rubro cir- culo cum antheris. unde duo staminula prominent, & ex medio vultu vrbore stilius muscae proboscidi sitis so- mnis: semen in latioribus maioribusq. vulgari verru- ce vasculis & compressis exiguam planum, sulcatum: rarij in sa, & minus flor. si a ges: quoniam ipsi flos- culi praeter radice atq. etiam longius a radice (si pan- tulae etiam operantur) ad singulas aedes flosculi & tri- dices aequat.



*Prouenit in Sneberg & alpeſtribus Styriae in agro  
Iunio ſloret: at in hortis etiam Maio, ſemen Iunio ad  
maturitatem perducit.*

NON dubium eſt quin priora duo genera ad *Veronica*  
vulgo vocata claſſem præſectim qua rectè cogno-  
minatur, ſint referenda. Tertium ſi quis inter *Tentaculæ*  
potius recenſere malit, non magnopere refragabor. Nul-  
lum vero hætenus vulgare nomen intelligere poſſum.

*Veronica vul-  
garis.*

CETERVM *Veronica vulgaris* cum recta, tam  
ſi pinæ maxima in Pannonis & Austria inſula diu-  
ſum eſt copia: nec velle ſunt cadue filua, nulli arduis  
colliculi & aggeres, qui alterutrum non alant.

*Veronica re-  
ſta vulgaris  
duplex.*

Ilius vero qua rectè cognominatur, due ſpecies cog-  
ſe diſcrete inueniuntur. Nam altera maior eſt, latior-  
raq; habet folia, & longiorem ſorum ſpicam: altera mi-  
nor, graciliorem caulem, anguſtiora folia, breuior em-  
que ſpicam.

## DE CLINOPODIO Austriae.

### CAP. LIIII.

*Clinopodium  
austriacum.*

DODRANTALIBVS eſt cauliculus, ramuli-  
bus, quadratis, diſtis, geniculatis, quos ex internodiis ſi-  
mul ſemper ad ſingula genicula ambiunt folia contra-  
riis inter ſe pediculis diſpoſita, Serpico vulgo ſere ſi-  
mula: ſed magis ad *Clinopodium* nonnullorum ſine  
Fuchſij foliorum firmam accedentia, minora tamen, &  
raris crenulis ſerrata, viridia, non inuicem odorati  
aliquantulum acris ſapore, ſicut ſere iam dictum *clino-  
podium*: flores ſummis cauliculis ad ſingula genicula  
proſert *Clinopodium* ſimiles, ſed multo minores & colore  
purpureo intenſiore ſeu violaceo præditos (tam ſi non-



nunquam inueniantur albi) antrosum maxima ex parte propendentes & obuersos: quibus succedunt capituli quales in Clinopodio, ventricosi, in quibus terna aut quaterna semina nigra Calamuntha aut Clinopodi semina referentia: numerosas habet radices duras, & multis fibris capillatas.

Crescit in montibus Badensibus thermis immixtis & reliquis vicinis ad Danubium excurrentibus: variis præterea aliis locis. Floret Maio, semen Iunio maturascit.

Acinos Fuchij.

V V I G A R E & illud est, cuius modo memi, Clinopodium sine Acinos Fuchij per Pannonias locis aridis.

Clinopodium Matthioli.

CLINOPODIUM item Matthioli passim in caeduis siluis, aut inter fruticeta, & ad silvarum margines prouenit: cuius duo genera obseruantur.

1. Vnum enim elatius est, maioraq<sup>3</sup> folia & oblongiora capitula, eaque sæpè numero per multas & varias coronas disposita obtinet.
2. Alietum humilius, minoribus foliis & breuioribus capitulis prædum est. Folia, & quadranguli caules utrique incana lanugine pubescunt, flos purpureus, radix multis fibris capillata serpit. Virumque Iunio floret.

Calamentum inodor.

S V N T qui Calamentum inodorū appellant, tametsi non omnino inodorum censendum sit, quandoquidem interdum aliquo odore nec ingrato nares perfundat.

S E D quoniam in Acini mentionem incidimus, nunc nime præmittenda mihi videtur elegans quædam plantina, quam anno 1581. mense Iulio florentem in Anglia obseruauit, dum commodum nauigandi tem-

pus est.

pus expectans, ad Ill<sup>rem</sup> Dn. de Cobham Garterij ordinis equitem, & quinque Portuum Praefectum profisciscer: nullam etenim haecenus videre memini quae ad Anivou Acini Dioscoridis historiam meo iudicio magis accedat.

Paucos ea habet ramulos dodrantaes, tenues, siccos, Acini Ana  
glic. subrubentes, quadrangulares, frequentibus nodis cinctos, ad quos bina semper ex aduerso sita foliola nascuntur Fuchsj acino fere similia, sed minora, & succulentiora, neque in ambitu serrata, Clinopodij austriaci foliis plurimum accedentia, grati cuiusdam odoris & botrym quodammodo referentis, sed non adeo validi & grauis: summos ramulos exornant verticillatim dispositi utriculi, quales in acino Fuchsj, deinde similes prope modum flosculi, magis tamen ex caruleo purpurascetes.

## DE SERPILLO PANNONICO.

### CAP. LV.

NVLLI sunt nudi colles, gramineive campi, aut Serpillum  
vulgare. sicciora prata, viarumque, margines herbofi, qui vulgare Serpillum in his Provinciis non alant. Quod cum à plebisque descriptum sit, eius historiam minime retexendam duximus: tria tamen alia genera mixtum cum illo nascentia hoc capite describemus, quoniam ab aliis minime observata video.

PRIMUM admodum simile est vulgari quod in I.  
Serpillum citri  
odore. omnibus Europa provinciis occurrit: crassiora tamen & atriora habet folia, quae trita citri mali, vel melisso-phylli odorem referunt, & capitula paulo maiora, magisque purpurascencia similibus flosculis praedita: ramulos crassiores, quadrangulos, palmares, per terram fusos,







ad singula internodia fibras agentes: radicem verò lignosam, multifidam, fibrosamque, numerosos proferentem cauliculos summa tellure in orbem sese spargentes.

- II. **ANGUSTIORA** Secundo sunt folia pauloq; longiora, viridia, glabra, rarius per cauliculos sparsa, bina semper ex aduerso nascentia: cauliculi frequentes, tennes, oblongi, per terram fusi, & subinde ad nodos fibris sese firmantes, oblongaque, mollia, & veluti spicata in summo ferentes capitula flosculis vulgari similibus referta: radix dura est, lignosa, & multifida. Tota planta interdum nucis iuglandis foliorum odorem quodammodo refert, nonnunquam manifesto nullo odore pradiata deprehenditur.

Serpillum angustio-  
gusto glabro-  
que folio.

- III. **LATE** serpit Tertium genus, & magnos cespites interdum occupat. Nam licet duram & lignosam habeat radicem quemadmodum alia genera: tennes tamen, quos in circuitu spargit, cauliculi subinde fibras agunt, quæ temporis successu in non minus duras & lignosas radices euadunt quam primaria, funduntq; deinde alios in ambitu cauliculos foliis non minus quam præcedentis oblongis, sed adhuc angustioribus, pradiatos, incana mollique lanugine pubescentibus: oblonga in cauliculis capita superiori similia, & similibus flosculis plena sunt. Tota planta pineum quodammodo seu resinaceum odorem trita refert, & gustu calido est.

Serpillum  
angusto lanu-  
ginosoq; folio

Omnia hæc genera eodem tempore florent, mense videlicet Iunio, & iisdem quibus supra retuli locis nascuntur.

## DE POLIO PANNONICO.

### CAP. LVI.

Polium pan-  
nonic. maius.

MULTAS ex eadem radice promit virgulas Polio montano similes, sed breuiores, & fruticosiores, folia in his inter se semper opposita, libanotidis coronaria foliis similia, mi-



lescentē: alioqui latioribus et in ambitu crispis incanisq;  
foliis, & incana lanugine pubescentibus virgulis ma-  
trem referunt.

ILLUD etiam rei herbariæ studiosos obiter admoni-  
tos volui, omnis generis Poly. ramulos in terram um-  
broso loco depactos, facile radices agere, modò solum be-  
ne subactum & repurgatum sit.

## DE CHAMÆPITY AVSTRIACA.

### CAP. LVII.

ELEGANTISSIMUM est hoc *Aiuga* genus, nec  
à quoquam hætenus, quod sciam, observatum.

Numerosos, cū adolevit, profert caules pedales, non-  
nunquam etiam palmares dumtaxat, quadrægulos, fir-  
mos, subhirsutos, frequentibus nodis cinctos, ad quos  
utrinque nascuntur folia *Chamæpitys* vulgaris foliis  
similia, latiora tamen, & in quatuor aut plures inter-  
dum lacinias divisa, superne viridia & splendētia, sub-  
tus nervosa & nonnihil incana, odoris satis iucundi, gu-  
stusq; calidi, non ingrati tamen: ex singulis alis nascun-  
tur ramuli similiter quadranguli, frequentibus foliis  
*Aiuga* vulgari similibus septi, durioribus tamen, qui  
deinde alia oblonga in alis foliola, angusta, mucronata,  
*Libanotidis* coronaria senescentis fere amula gerunt:  
summas ramos verticillatim ambiunt calyculi, rigidius-  
culi, è quibus exeunt flores *Aiuga* tertia floribus forma  
similes, sed longè maiores & elegantissimi, colore satura  
purpurea & violaceo, inferiore tamen labro nonnihil  
candicante, & sanguineis guttis resperso: semina in sin-  
gulis calyculis plerumque quaterna, oblonga, angulosa,  
colore nigro & splendēte: radix nigra, dura, frequen-  
tibus fibris capillata, & singulis annis novos caules pro-  
ferens.

*Aiuga Aus-  
triaca.*



Nascitur tenui & nigro solo, in summo iugo pago Rad-  
dauu imminēti nō procul à Peterstorf, sesquimiliari ab  
vrbe Vienna satis frequenter : nec vsquam alibi obser-  
uare licuit. Floret sub finem Maij & Iunij initio, quo  
etiam mense semen maturum est.

VULGARIS porro *Aiuga* flore luteo, tota hac pro-  
uincia frequentissima est in agris, & gramineis campis: Chamæpitys  
vulgaris.  
sed & *Tertia* multifidis foliis & rubescente flore, quæ  
etiā Cl. viris Fuchsio & Dodonæo *tertia* est, multis  
harum prouinciarum locis inuenitur.

r s

CARO-

# CAROLI CLVSII

## RARIORVM STIRPIVM

PER PANNONIAS

obſeruatarum Hiſtoriæ

LIBER QVARTVS.



**L**ACTEO ſucco manantes plantas à ſuperioribus ſeiungere libuit; & ab iis Quartum noſtrarum obſervationum librum auſpicari: quibus aculeatas, reliquarúmque ſtirpium congeriem ſubiicere, & omnes quam commodiſſimè poterimus per ſuas claſſes diſtribuire conabimur.

DE SCORSONERA PANNONICA.

CAP. I.

Tragopogi &  
Scorſoneræ  
differentia.

**TRAGOPOGIS** adnumerandas eſſe eas plantas quas vulgo Scorſoneræ vocant, nemo eſt, vt arbitror, in re herbaria mediocriter verſatus qui dubitet, cùm tota facie illis reſpondeant. In eo ſolum differre videntur, quòd illorum radix minimè ſit viuax: ſed ſeminis partum ſubſequenti hieme perire ſoleat: Scorſonera verò perenni ſit radice, multòſque annos (licet ſingulis florem & ſemen proſerat) perdurare ſoleat.

Ad huius genera referendas eſſe nonnullas ſtirpes exiſtimo, quas in Pannonia & Aùſtria obſeruauit.

**I. PRIORI** anguſta ſunt folia, Hiſpanica anguſtiſolia, qua odorato flore eſt, proxima, ſine Bohemica adeò vicina, vt ab illa differre non putem: caulis, flores, radices la-

Scorſonera  
maior.



dices lacteo succo turgentes, foris nigro cortice tecta, intus candida admodum conveniunt.

Scorfonera  
humilis latifolia.

- II. LATIORA brenioraque habet Altera folia, Bupleuro latifolio, sine Elaphobosco Mompelliano haud multum absimilia, crassiora tamen & duriora, quinque nervis, seu venis per longitudinem excurrentibus distincta, casio quodammodo colore, aliquantulum amaro & fernido gustu: caulis inter hac assurgit gracilis, pedali altitudine, striatus, raris foliis septus, cui insidet flos superiori similis, luteus, magnus, ex quo semen oblongum, asperum, Tragopogo simile, sed minus: radix pollicari crassitudine: interdum maior, longa, nigro rugosq; cortice tecta, intus alba, qua confracta, lacteo succo manat, qui deinde flavescit: superiore capite hirsuta est, & in plura capita plerumque extubrat, unde folia prodeunt.

Scorfonera  
humilis angustifolia.

- III. TERTIA firmatur crassa radice, longa, nigro densq; & rugoso cortice praedita, lacteo succo plena, qua interdum superiore parte in plura capita, quemadmodum secunda protuberat, crassitudine minimi digiti (nonellarum plantarum instar) hirsuta: ex quibus multa exeunt folia Tragopogo similia, firmiora tamen, & brenniosa, alterius colore: inter ea excrescit humilis palmus vix excedens caulis aliquot foliolis brenibus septus, canus, florem in cacumine ferens luteum, alteri fere similem: & semen deinde in oblongis calyculis Scorfonera hispanica semini par, minus tamen quod per maturitatem leuissimo aura flatu excutitur, eiusque arbitrio fertur.

Scorfonera  
humilis fibrosa radice.

- IIII. ANGVSTIS etiam constat Quarta foliis, Tragopogo aut Scorfonera angustifolia proximis, carinatis, colore cinereo, digitali longitudine, lacteo succo plenis, amarifculis: ex quorum medio profilit tener canaliculus, dodran-





dodrantalís, per quem sparsa sunt rara folia aliis minorá, quíq. in aliquot ramulos finditur sustinentes capitula aliorum more squammata, quæ in luteos flosculos Tragopogo similes, sed minores explicantur, maturitate in pappos evanescentes: radix nigra est multis albis fibrís capillata, lateribus propagines præter aliarum morem agens.

- V. FREQUENTIA sunt Quinta folia, longa, Tragopogi foliis minora & angustiora, inter quæ cubitalis assurgit caulis, canus quidem & ille, sed firmus, durusque, viridis, aliquot oblongis foliis circumseptus, & suprema parte in binos aut plures ramulos diuisus, ferentes in oblongis calyculis florem Scorsónera angustifolia similem, paulo minorem, & colore ex caruleo purpurascente, incundi odoris & qui pastillorum è benzoino confectorum nidorem emulatur: sena deinde aut octona pluraue in singulis calyculis semina, scorsónera seminum amula, quæ matura cum suis pappis vëto excutuntur: radix minimi digiti crassitie, singularis, densò cortice forisque nigricante & rugosò obducta, atque suprema parte hirsuta & villosa, quæ confracta succum exstillat initio lacteum, deinde fuluescentem, gustu primum gummosò, deinde aliquantulum acri: perennis est ut aliarum, & vetustate crassior redditur, atque subinde in plura capita superiore parte extuberat.

2. Similis plane inuenitur in colle oppido Stamfem vicino, duobus ultra Posonium Vngaria celebrem urbem miliaribus: nisi quod Stamfiana folia angustiora sunt, calyculi breuiores, semenq. crassius & breuius Cnici fere semini respondens.

Primum autem genus duntaxat in Hamburgensi monte inueni, quodam loco admodum herbosò, & arboribus circumseptò. Alterum, in monte Badensibus thermis im-

Scorsónera  
maior angu-  
stifolia subce-  
ruleo flore.

Hæc varietas.



mis imminente, vicinisq; aliis. Tertium & Quintum, non modò in Hamburgensi monte qua parte glaber est & tenui duntaxat gramine tectus, quaque Austriam spectat, sed etiam in Prellenberg, Leytenberg, catena illa montium à Calenberg ad Alpes excurrentium, & plerisque Ungariae locis. Quartum in saxis ad Garmingam, ubi copiose nascitur & Iulio floret, solummodo offendi. Florent reliqua genera & Aprili & Maio: semē etiam Maio aut sub Iunii initium maturescit.

PORRO Secundum genus Scorsonera humilis latifolia appellari poterit: tertium humilis angustifolia: quartum, cum eius radix cum reliquarum Scorsonerarum siue Viperinarum radicibus non admodum conveniat, dubito an ad Hieracy genera potius referendum sit. Quintum verò, Scorsonera elatior angustifolia purpureo flore cognominari poterit.

An autem similibus facultatibus pradiæ sint hæ Scorsonera, quibus celebrem illam, & adeò decantatam Hispanicam pollere aiunt, neminem adhuc periculum fecisse arbitror.

## DE HIERACIO PANNONICO.

### CAP. II.

INSIGNIS etiam in Hieracio observatur varietas per Pannoniam & Austriam: nam præter ea genera quæ cum aliis Provinciis communia alunt, nonnulla observare memini, quæ nusquam alibi sese mihi obtulerunt.

- I. PRIMVM autem locum latifolio dabo, cui quina aut sena sunt folia, humi strata, lata, Intybo satiuo latifolio non multum dissimilia, per ambitum nonnihil sinuosa, interdum etiam laciniata, mollia, hirsuta, nigricantibus maculis sapissimè infecta, interdum minimè, lacteo succo turgent-



turgentia: è quorum medio caulis exi cubitalis, raris  
 raris foliis septus, in quo plerumque & nuncius, alter  
 alter & tertius flos ex crassiusculo calyce, nigra, lan-  
 uigine hirsuto emicat Hedipnoidis flos fucalis, sed pal-  
 lidior, plenus, aliquantulum odoratus. flos enim utrius-  
 culum, fuscum, papposa coma ut in Trapa, & peditu-  
 tum, quod maturum leuissimo flatu distrahitur, sed  
 illi minimi digiti crassitudine, nigro atque nigro ob-  
 obducta, lacte succi plena.

Inuenitur plerisq. Ungaria et Austria cū superius  
 tum inferioris motibus, gramineis et afric. luteo. piceo-  
 ribusq. pratis Floret Maio semen maturum est Iulio

II. CUBITALES atque etiam bicubitales interdu-

Hieracium  
 malus latifo-  
 lium.

sunt Alteri caules, firmi, rotundi, quadam locis in-  
 fiti, quos confusi oline multa ambiunt folia, aut  
 aut amplius longa, etiam lata, per ambitum dentata,  
 mollia, lacteo succo plena: summus caulis in aliquot re-  
 mulos finditur sustinentes imbricata capitula e quibus  
 flores prodeunt lutei, denis, duodenis, aut pluribus foli-  
 lis per extremum in eis constantes, medianas, quibus  
 multis luteis fibris: radix minimi digiti crassitudine  
 tenuibus fibris capitula frangit, non angustior, sed  
 latera novos, frequentiusque pro caule profrens.

2. Eius genus inuenitur angustioribus fibris, per firmi-  
 ciam latis, & graciliore caule, in reliquis conueniens.

III. TERTIO cubitales etiam assurgunt caules, quon-  
 di, superioribus ramis crassi. & frequentiore asperitate

Hieracium  
 malus angu-  
 stifolium.

que lanugine obsiti, quo folia iter ambiunt, et folia  
 ne multa folia superioribus angustioribus, brevibus  
 etiam duriora, nec minus lacte turgentia: summus cau-  
 lis diuiditur quoque in ramulos, in quibus constat  
 stinents, è quibus exoriuntur flores, superiores fixi, ma-  
 les: radix non adeo crassa quam superioribus

non fixi

et silvosa, non in nono pratis educatis minus fertilis.

Idem etiam genus alterum observavimus angustio- 2.  
rius foliis, et multo longioribus, licet non minus duris,  
quod aliogenera quodammodo facie ipsi respondet.

Magnam vero affinitatem hoc genus habet cum  
Hieracio grandiore apud Belgas secundum publicas  
vias inter frutices nascente.

Nascentur etiam in extremis siccioribus pratis in-  
ter vepres, et etiam ad caduaram silvarum margines.

PLANTARVM similitudo fit ut duobus postre-  
mis generibus Quartum subucium, non in Pannonia  
natum; sed in Britannia anno 1581. observatum.

Cubitale vero interdum habet caules striatos, digi- IIII.  
to gracilliores, ex viridi purpurascetes, quos nulla se- Hieracii bri-  
rie, sed confuso ordine ambiunt filia. Corolla maiori fere tannicum  
similia, sed non adeo parva, lata sed eadem aplecten-  
tia, in circuitu densata, et per extremitatem mucronata:  
caliculi summo caule ex filiorum alis emergente ob-  
longi pediculis insident, his sati, qui in lateor, flores, re-  
liqui Hieracii se similes sese explicant: us succedit  
semen oblongum, silium striatum, candidum, quod cum  
suis pappis una aura dispergitur, et in divergentibus  
plantis, radice est perenni, multis biunguis crassiuscu-  
lis, nigra, multumque fibra constante, quae singulis annis  
numerose in caulis in solatium procreat.

Impense avara est, et planta, non quae sponte nascens  
mihi conspexit, sed Londini contaxat in hortis de Juss.  
virovum Ioannis Richardi & Henrici Margari Phar-  
macopolarum, qui Cyparissia notomanum nuncupa-  
bant, ex borealibus Britanniae regionibus delatam.  
Floret Iunio & Iulio, semen Augusto maturitatem  
consequitur.

Hieracium  
autem hier-  
acii folio.

ALIQVOT Quinto sunt folia e radice prodeuntia, v.

f 2

uncialis







uncialis fere latitudinis, oblonga, molli ciliis, lani-  
ne admodum hirsuta, & quodammodo inermi, luteo  
succo pradita: è quærum in medio caulis pedalis pila  
emergit hirsuta, quæ per intervalla ambiunt folia su-  
perioribus breviora, at triplo latiora, & in interstitiis  
desinentia, non minus quàm illa hirsuta, at in tripli-  
co pregnantia: unicum in summo fert capitulum e-  
tiam hirsutum & inermi folioli compactum, non unguatum  
in lateribus alterum (& tertium) quod in floribus se ex-  
plicat hieracy floribus similem, multis suis luteo colore  
praditis constantem, qui deinde in pappos cum suo brevis  
& nigro semine evanescit: radix nigrescat, multis candi-  
cantibus fibris pradita est, & singulari anni ætate cal-  
les profert. Totâ planta admodum amara est.

Inuenitur in herbosis Alpium iugis, ubi Iulio, inter-  
dum etiam Augusto floret: at in hortis Alsatio, semen  
verò Iunio perficit.

## VI.

Hieracy in  
montan.

SEXTI radix digiti interdum crassitudine equali,  
longa, nigrescat, tenuibusq; fibris pradita, præterea  
plura aliquando capita extulerat, quæ summa seduce  
semitæ octona oblonga folia inermia, & non  
hinc incana prostrant & singulis capitibus prædant, inter  
folia singulares cauliculi, æri, radii, dodrantales aut  
palmares, unicum florent sustinent, & multo oblongior  
& per extremum in foliis lateq; colore præditi  
constantem, qui desente, semen oblongiusculum cum  
pappi suis a vento exentur.

In omnibus montibus a Calenberg Daubio in-  
muenti ad Alpes excurrentibus nascitur.

Floret M. 10.

## 2.

Eius varietas.

Aliud eius genus inuenitur, cuius folia nonnulla in  
lateribus laniata sunt quæ admodum L. nigræ  
in fructu filia, nonnulla incana, sed magis succo colore  
præditi.

tilis, alioqui per omnia simile. Vtriusque planta lacteo  
succo plena, & amariusculo gustu est.

Ex radice obliqua & rugosa, mummig, d. guti crassi-  
tie, & multis fibris donata, aliquot extuberant capita,  
unde sena aut plura enascuntur folia, unius, duarum,  
& trium uniuscuiusque longitudine. semunciam lata, cras-  
sioe nervo secundum longitudinem excurrente, mollia,  
brevis incanaq. lanugine praeputa, & in una parte ad-  
modum lacinata & angustiora, superiora vero latiora  
& dentata duntaxat, laticullosa succo virginita: è quorum  
mediobim aut terni emergunt calliculi palmares, eno-  
des, foris laeves, intus concavi sustinentes flores luteos  
Quinto generi similes, colore vero aliquantulum satu-  
ratiores, qui maturo semine tenui, longiusculo & nigri-  
cante in pappos abeunt.

Crescit in Leytenberg, florent. Iunio.

SUPERIORIBVS circumgenitum est pusillum VIII.  
illud Hieracygenus, cuius descriptionem & iconem etiam  
Londini communicavit 1581. V. C. Thomas Pennans  
his verbis.

Hieracium minimum planta dodrantalis aut paulo Hieracium  
minimum.  
altior, radice singulari, tenui, alba. paucis fibris vestita:  
folia ab radice quinque, sex, septem, quandoque plura,  
bellidis fere, sed paulo longiora & serrata: è quorum  
medio caulis exit unicus, quandoque duo, vel tres, folius  
omnino vidui fistulares, iuxta raditem rubentes, inter-  
dum versus summum ramos, ramus iuxta exortum ru-  
bentibus: caules omnes versus capitula, contra fere quàm  
in aliis plantis extuberant crassioribus, sunt singuli sin-  
gula capitula globosa sustinentes, ex quibus flores par-  
vi, lutei, ex apicibus constantes, & tandem papposcentes  
exoriuntur. Lactescit & amariuscula est.

Provenit inter segetes locis parum arenosis & terra





friabili: frequens in Anglia multis in locis, alijs nusquam nisi in agro Heidbergensi unico tantum loco, me vidisse memini. Iulio & Augusto floret.

## DE SONCHO.

## CAP. III.

HABD vulgaris aliquot Sonchi genera per Pannonias & Austriam nascuntur, quae silentio minime premenda existimaui.

I.

Sonchus le-  
vis caruleo  
flore.

CVBITALI, ut ampliore excrescit Primus caule, rotundo, striato, in surcoque, intus concavo: quem ambiunt multa folia, ampla, lacteo succo plena, aliquot profundis laciniis utrinque divisi, per extremum mucronata, & latiore pediculo caulem amplectentia, atq. nonnihil in ambitu dentata, subius aliquantulum & cana plurimos in summo caule flores profert purpurascensibus & hirsutis pediculis inbidentes, vixens folius constantes, Sonchus autem vulgaris floribus non dissimiles, sed colore caruleo elegantissimo, qui per maturitatem in pappos cum femine ex quo cinereo evanescent: radix pollicari crassitudine, & longa, non in profundum acta, sed obliqua, candicans, dura, & veluti internodiis distincta, multasq. circumquaque fibras & assas agens, vivax, & singulis annis non solum ex latere caulei prorens.

Copiose nascitur in Durenstam locus umbrosus, in Etschero, parlog, supra Gannagam, item in Sneberg & Snealben, apud Cariniam, & pumili pinnatrum. Floret isthic & Iulio & Augusto, quo mense etiam semen perficit. In hortos transactus, maturus multo, modo interdum mense Iulio denique floret.

II.

NON multo minus res profert Alter interdum caules, graciliores tamen, non striatos aut hirsutos, aut intus vacuos, sed plenos & firmos, satis tunc fractu con-

Sonchus le-  
vis purp.  
flore.









ces: hos ambiunt minora quā superioris folia, neq. adēa laciniata, angustiora præterea, in medio latiuscula, deinde sensim in mucrone dēiuncta, & in ambitu dentata, succo lacteo pragnātia, iustu amaro: in summis foliorum alis exeunt tenuis firmq. ramuli, quatuordecim aut quatuordecim ferentes in oblongis calyculis flores, quibus folia per extremum laciniatis constantes, colore purpureo, alius intus staminibus, qui deinde in pappos cum stilo firmi abeunt: radix fibrosa perennis, aliter minor, novem vel decem singulis annis proficiens.

Crescit cum superiore paulo supra Gaurum copiosissimè: crescit & alibi, sed minor, velut. in Pannonia & Hercynia silva. Floret perumque Iulio, aut paulo maturius interdum.

## III.

*Sonchus la-  
vis altissimus*

HUMANAM altitudinem superat Tertius, cande pollicari crassitie, firmo, striato, leni, nec ullis spinis asperro, quem frequentia folia quatuor aut binis interdum laciniis aequaliter respondentibus diuisa, lata basi & utrinque appendices habente ample videntur (de his loquor quæ in infimo & medio caule sunt, superiores enim nullas lacinas habent) omnia spinis in diuisa carentia, dura tamen & in ambitu creberrime & asperis denticulis serrata, sunt tria vel quatuor, inferne subterrea, lacteo succo plena: supremus cœulis hirsutus est, & in aliquot ramulos diuiditur, qui flores aequaliter & quasi umbellatim tritu nascentes sustinent, non magni quidem præ stirpis tanta amplitudine, sed Sonchi lenis flore ceruleo vel Hieracii floris pares, simili et e calyculo hirsuto prodantes, multis luteis & per ætatem incisis foliis desum sine orbem ambitibus constantibus, & numerosis in medio staminibus armis qui deinde maturi in candidam lanuginem resolvuntur, in qua latet semen primi generis semini simile, stilo autem eme-

tratum,

rem, quod cum sua lanugine à vento rapitur: radix crassa, candicans, fibris donata, singulis annis novos stolones proferens, & ad latera adnatis se propagans.

Inuenitur in paludibus salicetis & harundinetis iuxta piscinas, & stagnantes aquas, vcluti supra Badam Austriæ, vbi quæritur Neuwelch, & supra Triebs Winckelpagum. Floret Julio.

## DE CIRSIO PANNONICO.

## CAP. IIII.

NON minus varia inueniuntur Cirsij genera, quorum (quæ ab aliis minime descripta comperiemus) historiæ hoc capite pertexemus.

QVINA aut sena statim à radice promit folia circiter tres uncias longa, unam lata, sensim in mucronem desinentia, latiore vero basi, subhirsuta, et crebris spinulis per circumferentiam prædita, colore raso: ex eorum medio caulis emicat pedalis, aut cubitalis, tenuis, firmus, lanugine quadam obsitus per quem stant folia superioribus minora) unum in summo plerumque, nonnunquam alterum & tertium ferens caput multis squammulis imbricatum compactis, & nonnullis purpurascensibus atque acutis asperum, quod in stamineum florem expanditur reliquorum cirsiorum modo, colore purpureo: semen etiam illi simile: radix multis nigricantibus & duris fibris prædita est, eam quæ hirsutam veterum foliorum nervi & vestigia faciunt.

I.  
Cirsium pratense.

Nascitur inter arbores in desertis montium supra Sopronium Pannoniæ urbem, at montibus præterit quæ ad Danubium extenduntur malis abundantius. Innio floret, & subinde semen profert.

Non minus est elegans Cirsij genus, & haud dubiè proximè huic collocandum, cuius descriptionem & iconem



nem mihi anno 1581. Londini communicavit C.V.  
Thomas Pennaeus Londinensis medicus.

Planta est caule singulari, cubitali aut ampliore; fo-  
lia per caulem alterna, longa, in ambitu spinulas, mi-  
nimèque pungentes habentia, quorum supina partes vi-  
rent, prona albicant, & cana lanugine obducuntur: in  
summo caule capitulum unum carduorum modo, quasi  
ex squammis mucronatis compactum, florem sustinens  
satis magnum ex multis apicibus, colore ex rubro pur-  
purascente ac tandem in pappum abeuntem: radix est  
nigricans, fibrata, quandoque per magnas fibras sese  
propagans. Floret Iulio & Augusto.

Provenit in pratis ad radices montis Englebreu to-  
tius Anglia celsissimi in Comitatu Eboracensi.

MULTA etiam profert Tertium folia, oblonga,  
Centaurij maioris nō laciniatis foliis propemodum simi-  
lia, brassica colore & virore, satis carnosā, & in circui-  
tu crebris aculeis prædita: è quorum medio caulis dein-  
de emergit cubitalis aut amplior, striatus, quem alter-  
natim ambiunt folia superioribus minora, latā basi  
eum amplectentia, & membraneas quasdam alas, ad  
proxima folia secundum caulis, cui adnatae sunt, long-  
tudinem producētia, quæ causā est, ut caules quodam-  
modo alati videātur: summus caulis in hispidum, mul-  
tisque squammulis imbricatum caput desinunt, quod  
tandem in florem stamineum colorēq. purpureo ruben-  
tem explicatur, & nutat: in superioribus interdum alis  
nascuntur ramuli quadam lanugine obsiti, similes susti-  
nentes flores, qui deinde in papposā lanuginem resol-  
vuntur, & menque in ea reliquis simile occultant: radix  
minimi interdum digiti crassitudine aliquot fibris do-  
nata, perennis & singulis annis propagines è lateribus  
fundens.

11.

Cirsium bri-  
tannicum.

III.

Cirsium m-  
tanum.





Crescit in Pannonia quibusdam silvis, & aliis ad alpes tendentibus, ut supra Posonium, Nemethwywar, Badensésque thermas. Floret Iunio.

Eius meminit Dodonæus in Appendice ad Purgantium historiam.

## IIII.

VULGARE iisdem locis etiam est, quod in Belgica hortis ali memini, foliis aliquantulum laciniatis, & superiore paulo mollioribus, similibus fere floribus, caule striato, & perenni etiam radice.

## V.

AD Cirsij proculdubio genera referendum est id Cardui siue Spine molle genus, quod in bicubitalem & maiorem interdum altitudinem excrescit, pollicari caule, striato, incana tomentacea & lanugine obsito, foliaque habet superioribus maiora, carnosioraque, & succi plena, viridia, in ambitu dentata, mollibusque spinis obsita: capita in summo caule summisque ramis maiora iam descriptis, quæ in stamineos purpureo colore nitescentes flores expanduntur; iique deinde maturi in pappos resolvuntur: radix multis crassis fibris Asphodeli bulbis fere similibus & oblongis firmatur.

Nascitur in montanis pratis, atq. etiam ad piscinarum vdos margines, & inter salices amerinas et harundines. Floret Iulio.

Nardus montana Mompelliana.

Similem plantam, sed longè minorem in pratis agri Mompelliani olim eruiere memini, quam tum nonnulli pro montana Nardo nobis obtrudere volebant.

Κισσίου porro nomine Græcis, Cirsij Latinis commodè nuncupari meo iudicio hæc stirpes possunt.

An verò Cirsij veterum facultatibus respondeant, ignorare me fateor. Neque etiam Dioscorides suo Cirsio villas tribuit vires, nisi quas ex Andrea descripsit.

Non minus porro vulgaris agro Viennensi, multisque



isq;ue Pannonia locis est quàm in Zelandia, Flan-  
dria Hollandiaq; maritimis, Spina illa quam Clariss.  
Dodonaus inter Cirsij genera tertio loco recenset, ma-  
gno, nutantéque, & sp. noso admodum capite, quod in  
flore multis purpureis elegantissimisq; staminibus  
constantem explicatur: floretq; cum reliquis Cirsij ge-  
neribus Junio, quibus etiam persimile semen habet. Id  
flore variare aliquando memini.

Cirsium ter-  
tium Dode-  
nzi.

## DE CARDVO MOLLI.

## CAP. V.

CARDVI nomine has stirpes etiam appello, tamen si  
inter Acanacei generis plantas minimè recensenda vi-  
deantur, cum nullo spinarum vallo munita sint: propter  
similitudinem tamen quam cum mollioribus quibusdam  
vulgaris notitia carduis habent, in eorū classē reieci.

PRIMVS multa secundum radicem folia habet,  
cum humi iacentia, tum surrecta, infernè cana mollique  
lanugine obsita, supernè virentia, admodum laciniata,  
& ad medium usque neruum dissecta, Calcitrapa mol-  
lioribus & tenellis foliis ferme similia, nullis tamen spi-  
nis horrentia, gustu primū exsiccante, deinde ama-  
riusculo: è quorum medio caulis unus aut alter assur-  
git cubitalis aut amplior, teres, rotundus, striatus, pur-  
purascens, & molli quadam lanugine obsitus: inferiora  
folia per caulem sparsa, sunt etiam laciniata, licet aliis  
minora, quæ verò supremum caulem vestiunt, oblonga  
sunt & angusta, & nullis laciniis diuisa, sed mucrone  
plerumque purpurascēte: extremi caules in aliquot  
interdum ramos diuiduntur (magna tamen ex parte  
singulares sunt, unicūq; sustinent caput) quæ capitula  
sustinent ex multis tenuibus squammis imbricatis dis-  
positis compacta & molliter echinata, quorum mediam

1.  
Carduus mol-  
lis laciniato  
folio.



occupat flos stamineus & hirsutus coloris purpurei, elegantissimi; flore flaccido & evanido succedit semen angulosum; radix digiti crassitudinem nonnunquam aequat, subfusca, longa, aliquot fibris donata.

Invenitur tota illa catena montium, quae à Calenberg & Danubio ad Alpes usque extenditur, & deinde per Leytenberg, rursumque per Prellenbergh & Hamburgerberg ad Danubium duobus supra Posonium miliaribus reflectitur. Floret autem Maio, semen perficit Junio & Julio.

PEDALI assurgit alter caule, utcumque crasso, striato, & nonnihil lanuginoso: folia illi circa radicem maiora, Lapathe fere similia, aut illius plantae potius foliis quam vulgo Totam bonam siue Bonum henricum cognominant, quae pediculo adherent latiora & veluti angulosa, extrema vero parte mucronata, in ambitu nonnihil sinuosa, & mollibus veluti aculeis obsita, supina parte virentia, prona vero omnino incana, foliorum alba populi modo, & densa lanugine obsita, gustu primum exsiccante, deinde amarissimo, quae vero caulem amplectuntur, minora sunt & angustiora; ex quorum sinu circa summum caulem ramuli exeunt, terna, quaterna, aut plura sustinentes capitula squammata, Cyani aut Iaccæ capitulis respondentia, quae, dum expanduntur, florem promunt ex ceruleo purpurascens, & semen deinde continent lanugine involutum cyano fere simile, sed maius aliquantulum, candicans: radix nigra, aliquot tenuibus fibris donata, & dura, è lateribus propagines spargit.

II.

Carduus  
mollis  
lappula  
thifolius.

Hunc erui circa secundum Sneberg excelsi admodum montis iugum inter saxa nascentem cum Aaricula vrsi lutea, & deinde in Etschero. Floret Iulio, & in horto repositum semen protulit Augusto, deinde perit.



periit. Vbi tamen sponte nascitur, viuax est: nam superioris anni caules adhuc retinentem cum floreret deprehendi.


HVMILIOR hic est, neq. palmarum altitudinem III.  
exceedit, caule fere perinde crasso quemadmodum superior, multisq. oblongis & angustis foliis exornato, superne etiam virentibus, inferne vero incana lanugine vestitis (non tamen adeo veluti superioris) & quasdam molles spinas per oras obtinentibus, sapore etiam amaro et initio adstringente: summo cauli insidet singulare capitulum, superioribus maius, squammatum, ex quo flos multa lanugine ex caruleo purpurascens pubescens exilit: semen obseruare non potui: nam tamen si aliquot stirpes in horto magna diligentia excoluerim, ad frugem tamen non peruenerunt, sed paulatim flaccescentes omnino tandem contabuerunt & perierunt: radix nigra est, multisq. nigricantibus fibris pradiata, & subinde noua germina e lateribus producit.

Crescit in summis Snealben iugis cum Auricula quarta qua flore est coloris carnei: floretque Iulio & Augusto.

VIDETUR Prior notus fuisse Gesnero, atque Benedetto Aretio, ex relatione Simleri ad calicem Commentarij de Alpibus, qui eum sic describit.

Edeldistel, Carduus inter carduos speciosissimus, folia habet mollia, ab una radice, per caulem rara, qua referunt folia herba quam Mosabluemen nominamus: altitudine cubiti in altum assurgit caulis: capita in summo sunt singula, interdum bina, cerulea, quandoq. alba, interdum purpurea, color collucet mixtus viridi tum in capitibus, tum in supremis foliis. Mollis est tota, & etiam spinis quas amulatur, nam non pungunt. Radix subest longa & bifida.

Edeldistel  
Gesneri.



*7*stam florum varietatem in meo non observavi, sed toto illo quem dixi tractu, unius solummodo coloris fere florem, nempe purpureum elegantissimum.

CARDVI etiam mollis genus elegans, præaltum & radice serpente videre memini in cultissimo horto C. V. Ioachimi Camerarij Noribergensis medicij: cuius descriptionem cum plerisque aliis summa diligentia observatis in studioforum rei herbarie gratiam brevis in lucem emissurum speramus.

Cardus mollis, Camerarij.

MULTIS porro Pannonia locis, præsertim verò ad Neuberg in Styria, & similium Alpium radices nascitur Eriocephalus ille carduus, vulgo Herbariorum satis notus, quem flore variare observavi: nam licet plerumque purpureus sit, interdum tamen etiam albus conspicitur.

Carduus Eriocephalus.

Eius varietas.

Eum qui est flore purpureo, sed longè humiliorem aliquoties eruere memini agro Salmanticensi in Hispaniis, cuius semen amicis in Belgicam misi cum hac inscriptione, forè Corona fratrum, quoniam multis notis respondere conspiciebam ei plantæ quam monachi in Mesuem commentatores sibi in Hispaniis observatam, Coronam fratrum appellassent, quod rami equali altitudine nascentes, & suis capitibus eriophoris onusti, medium caput maiusculum summo cauli innatum, quodammodo in orbem cingerent, ut monachi suum abbatem aut priorem solent. Ex eo tempore Corona fratrum nomen apud Belgicos herbarios hac spina obtinuit.

Corona fratrum.

CRESCVNT & iisdem locis, & aliis plerisque Pannonia montibus Carlina sine Chameleonis vulgo nuncupati bina genera. Vnum flore amplo, albo: quod nonnunquam in pedalem caulem assurgit, interdum verò prorsus est ἀναλον. Alterum etiam sine caule, mino-

Carlina maior.

Carlina minor.

re ca-



668 CAROLI CLVSII PANN. STIRP.  
ve capite, purpurascence flore, & mollioribus magisque  
virentibus & angustioribus foliis.

DE ERYNGIO PANNONICO.

CAP. VI.

PECULIARE quoddam Eryngij genus alit Pan-  
nonia & Austria, prater vulgare singulis notum, &  
omnibus provinciis frequens.

Eryngium la-  
tisfolium.

ID autem bicubitalem aut ampliorem habet altitu-  
dinem, caulem firmum, striatum, medulla alba plenum,  
& veluti nodis distinctum, praesertim qua parte folia  
eum lata & membranacea sede amplectuntur, quae sunt  
tres uncias aut amplius longa, duas lata, viridia, ve-  
nosa, in ambitu serrata & aspera, subamaro calidius-  
culoque gustu: quae verò secundum radicem sunt folia,  
oblongis pediculis innituntur, longioraque & latiora  
sunt: summus caulis in aliquot alas divisus est, foliaque  
breviora habet, in profundas lacinias divisa, & mollibus  
spinis praedita: summa deinde ala in aliquot ramos desi-  
nunt ferentes echinata capitula sphaerica ferè rotundi-  
tatis, in quibus multi caerulei flosculi albicantibus sta-  
minibus praediti, & sub capitulis novem aut plura ob-  
longa & aculeata foliola stella modo expansa: ipsa verò  
capitula cum summis ramulis supremaque caulis par-  
te, interdum vetustate caeruleum omnino colorem con-  
trahunt: radix in novellis plantis digiti crassitiem & lon-  
gitudinem aequat, aliquot fibris donata, foris subsusca,  
intus alba, carnosae, satis dulci sapore est ut marini E-  
ryngij radix, quae vetustate multo amplior redditur, &  
in multas alias radices extuberat, singulis annis ex la-  
teribus plures caules proferens.

Invenitur frequens in pratis ad Danubium sitis cum

Aspa-





*Asparago, & in hortis repositum feliciter provenit.  
Floret Iunio & Iulio.*

Eryngium  
planum Mat-  
thioli.

*Simile planè in Silcsiacis montibus sponte provenire  
audio: nec huic fortè ab simile est, quod Pena & Lobe-  
lius in aduersariis describunt. Idem verò prorsus est  
cum eo quod Matthiolus plannin nuncupat, demonstrat-  
um illi primùm à C. V. Paulo Fabricio Medico &  
Cesaris mathematico.*

## DE TITHYMALO Characia Pannonico.

### CAP. VII.

Tithymalus  
characias  
pannonic.

*MULTOS ab una radice profert caules, pedales,  
interdum etiam cubitales, firmos, laeves, infima parte  
nonnihil purpureascentes, & foliorum quæ deciderunt  
vestigis notatos: hos deinde ambiunt confuso ordine dis-  
posita folia crassiuscula, lanua, duarum interdum un-  
ciarum longitudine, mucronata: summi caules in mul-  
tis virgulas inter folia emergentes diuiduntur, quæ bi-  
na subrotunda foliola, & quasi vasculum siue labellum  
imitantia sustinent, in quibus flores reliquorum Tithy-  
malorum floribus similes, qui cum suis virgulis & vascu-  
culis pallido subluteo colore præditi sunt: succedunt  
triangula capitula semine plena: radix longa digitalis  
crassitudinis, infima parte in aliquot fibras diuisa. Ma-  
turo semine caules singulis annis emoriuntur: nouo au-  
tem vere àlij è radice germinant, qui subsequente anno  
flores ferunt.*

*Nascitur plerisque Pannonia locis: sed agro Vien-  
nensi tanta copia in gramineis & siccioribus pascuis, ut  
Iunio mense (tum enim floret) omnino pallefcere videan-  
tur. Totæ planta lacteo succo turget, quemadmodum  
reliqua Tithymalorum genera.*

DE SYM-

## DE SYMPHITO TUBEROSO.

## CAP. VIII.

ANGVLOSVM & quodammodo pentagonum habet caulem, rarissime pedalem altitudinem superantem, succi plenum, per quem rariora quàm in Symphito maiore sparsa sunt folia, illisque minora, teneriora, & minus aspera, insipido fere gustu: flores in summis ramis pallidos, oblongos, Symphiti maioris floribus forma similes, concavos, extrema parte in quinque crenas divisos, quinque staminibus in medio flore veluti in umbonem tendentibus, protuberante in medio stilo, nullo odore: calyculos deinde maioris Symphiti modo, in quibus semina Echij semini non dispar: radicem longam, teneram, minimi digiti crassitudine, exiguas fibras capillatam, & multis locis extuberantem: pediculi, calyces, caules angulosi, & folia hirsuta sunt.

Symphitum  
tuberosa ra-  
dice.

Inuenitur in omnibus Pannonia & Austria silvis umbrato loco, praesertim verò sub fruticibus, atque etiam supra Drauum flumen in Greben saepius memorata arvis montanis. Primum innotuit Belgica incolis anno 1568. missa ab Alphonso Pancio Machliniam nobis planta.

Eius historiam & iconem minimè dedissem, nisi aut negligenter ab aliis descripta, aut non satis scitè expressa fuisset: tametsi & in hac exprimenda pictor oscitantia merito accusari possit.

Symphitum



## DE PVLMONARIA.

## CAP. IX.

PVLMONARIA vulgo nuncupata, cuius folia I.  
*candicantibus maculis insignita sunt, & flos niveo colo-* *Pulmonaria*  
*re interdum variat, copiose multis Pannonia & Au-* *maculis in-*  
*stria silvis sponte nascitur, tum inter Krumpach &* *signita.*  
*Gleissfeld, tum in Viennensis atque Leytani saltus va-*  
*riis locis. De ea, quandoquidem ab aliis descripta est,*  
*sermonem instituire non volo: sed de alijs duobus gene-*  
*ribus, quæ ante quàm in hanc prouinciã venirent, mi-*  
*hi conspecta non fuere.*

EXILIT unum primo vere, florúmque thyrsum fere II.  
*ante folia promit, quæ sunt angusta & hirsuta, Buglossi* *Pulmonaria*  
*siluestris, Echivæ aut Anchusæ foliis non absimilia,* *angustifolia*  
*molliora tamen, neq. tam aspera lanugine hirsuta, nullo* *caruleo flore.*  
*pediculo prædita, sed medium caulem amplectentia, qui*  
*paulatim succrescens, angulosus & hispidus, interdum*  
*nonnihil purpurascens, in pedalem tandem altitudinem*  
*excrescit: flores in pentagonis calyculis, & in quinque*  
*lacinias diuisis, purpurascensibusque & hirsutis, oblon-*  
*gi, concavi, floribus Buglossi hortensis, aut Pulmonariæ*  
*vulgaris forma similes, qui per oras in quinque orbicu-*  
*lares fere lacinias diuisi sunt, colore, ante quàm aperian-*  
*tur, ex purpura rubente, deinde quando explicati sunt,*  
*caruleo adeò eleganti, ut Gentianella verna floris ve-*  
*nustatem si non superare, attamen emulari videantur,*  
*odore nullo: & maturi decidunt integri, quemadmodum*  
*Buglossi hortensis & similium flores, atque calyculum*  
*inanem cum stilo & quatuor seminum rudimento relin-*  
*quunt, quod tandem maturum nigri coloris est, echij aut*  
*buglossi vulgaris semini respondens. Adnascuntur dein-*  
*de secundum caulis pedem alia hirsuta folia, angusta,*  
*v palmari*









paluari aut ampliore longitudine echij aut anchuse foliis latiora mollioraque, ex quorum medio (licet sicca sint) subsequente vere prodit caulis suis venustis floribus onustus: radix crassis carnosisque, fibris prædita est, uti Pulmonaria prima maculoso folio, initio candicantibus, & per vetustatem foris nigricantibus, sapore dulci.

Nascitur passim per Pannoniam & Austriam inferiorem in montanis & caduis silvis, atque diutissime floret.

INVENITUR & quibusdam Pannoniæ locis Alia III.  
superiori fere similis, nisi crassiore maioreque, caule, & latioribus foliis prædita esset, floresque haberet, non ut illa caruleas, sed pulcherrime rubentes: alioqui & radice & temperamento conveniunt. Pulmonaria rubro flore.

Huic omnino respondens cum forma tum amplitudine alia est, cuius flores primum rubent, ut in prioribus 2.  
Pulmonaria, deinde cerulei saturatiore coloris fiunt. Eius varietas.

Crescunt hæc ad caduarum silvarum margines, umbrosis locis, atque eodem cum secunda tempore florent.

## DE ANCHUSA FLORE EXALBIDO.

### CAP. X.

NUMEROSA sunt illi folia, palmari longitudine, angusta admodum, & pungente lanugine omnino hirsuta: e quorum medio caulis assurgit secundo anno pedalis, interdum etiam cubitalis, crassiusculus, firmus, hirsutus, multis alis brachiatus, in quibus breviora multo folia atque etiam hispida: extremis ramis è vaginulis hirsutis & asperis flores prodeunt Symphiti maioris floribus quodammodo similes, albi, aut ex albo nonnihil pallescentes, in angulos quinque divisi, quibus excussis semen in vaginulis conspicitur viperino capiti aut echij semini simile: radix minimi digiti crassitie, nigro Anchusa ex-  
albido flore  
v 3 - cortice



cortice obducta, quo sublato omnino rubet, & elegantissimo colore inficit: adeò autem carnosà est, ut radicum buglossi vulgaris modo condiri possit, dulcis tamen & insipida.

Arido & salebroso nascitur solo in monte Badensibus therimis imminente, & apud Carnuntum Pannonia olim amplissimam urbem, nunc vile oppidum Petronella vocatum, maxima copia, & plerisque aliis Pannonia & Austria siccis & aridis locis. Floret Maio, & semen Iunio profert: deinde perire arbitror ut echij genera.

## DE ECHIO.

## CAP. XI.

VARIA prater vulgare, quod florem subcæruleum fert, agro Viennensi & vicinis locis frequentissimum, & interdum etiam omnino album, sunt hic Echij & elegantia genera.

PRIMUM pedalem habet caulem, striatum, hirsutum, foliis echij aut buglossi silvestris, molli lanugine hirsutis, & inæqualiter eum ambientibus præditum, superiore parte in multas alas diuisum, quæ deinde in breues ramulos sese findentes, multis concavis flosculis extrema parte in quinque crenulas diuisis, coloreque ex atro purpurascete præditis onusta sunt, quæ vasculis molli etiam lanugine hirsutis, & inter folia latentibus prodeunt: semen ut in huiusmodi generis plantis, viperino capiti simile: radix oblonga, minimi digiti crassitudinem interdum æquat, foris fusca paucisque tenuibus fibris prædita est, capite, unde caulis prodit, extuberante, & præcedentis anni caulis vestigia seruante: præmansis foliis, nullum initio manifestum saporem deprehendas: sed postea nonnihil caloris habere videntur.

I.  
Echium pullo  
flore.





*Crescit multis locis Vienna vicinis, atque etiam tota inferiore Austria & Pannonia parte siccioribus pratis & gramineis locis ad collium radices, atq. etiam in ipsis collibus nudis & tenui duntaxat gramine obstitis.*

*Floret Maio.*

II.  
Echium ru-  
bro flore.

**OBLONGA** habet Alterum & angusta folia, hirsuta, humi strata, vulgaris echii foliis similia, paulo tamen latiora: caulē modò pedale, modò cubitale, firmum, striatum, hirsutū, maculisq. purpureis respersum, quem cōfuso ordine multa ambiunt folia superioribus breviora & angustiora, non minus tamen hirsuta: summum caulem exornant multi breues ramuli in se veluti conuoluti, atque Scorpiuri in modum inflexi, pleni florum vulgari echio similium, sed colore rubro eleganti, qui proximè caulem primum aperiri incipiunt: excusso flore, semen in calyculis nigrum, capiti viperino simile ut in aliis echiiis, sed minus: radix satis longa, dura & lignosa, nigro cortice tecta, summo capite multos interdum caules promens, sed plerumque unicum solummodo.

*Maxima copia siccis pratis supra & infra Sopronium Vngaria urbem, nec vsquam alibi hanc plantam obseruari Maio florentem, nunc intensiore nunc dilutiore colore pradam.*

## DE CYNOGLOSSO PYMILO.

### CAP. XII.

Cynoglossum  
pumilum.

**INTRA** pedalem plerumque consistit amplitudinem hac planta, tametsi nonnunquam eam superet, cauliculo singulari, tenui, firmo, rotundo, hirsuto, inferius purpurascente, supernè virente, per quem sparsa sunt inequali situ foliola uncialia, angusta, eminente dorso, molli lanugine hirsuta, colore cinereo fere, gustu calidiusculo: summi cauliculi in aliquot ramos diuiduntur,  
qui









qui Scorpiuri modo cōtorti flosculos ex foliolorū opposito proferūt buglosso aut cynoglosso vulgari similes, sed lōgè minores, colore ceryleis: quibus succediūt quaternis simul iuncta atque in umbonem protuberantia semina, cynoglossi vulgaris seminum instar, sed admodum exigua & echinata: radix oblonga, tenuis, raris fibris donata, quæ annum duntaxat superesse, & post semen perire solet.

Prouenit ad viarum & agrorum margines circa Viennam, in rudis & salebrosi iugis urbi vicinis, & plerisq. aridis Pannonia locis ad agrorum etiam margines. Floret Maio & Iunio.

Lithospermū  
repens.

FREQVENS etiā admodū est in siluula ad Lachn primo ab urbe Vienna miliari, & Viēensis saltus aliorumque montium urbi vicinorum radices inter frutices Lithospermum illud minus vulgo nuncupatum, cuius sarmenta humi fusa subinde fibras agunt, & mirè se propagant.

Lithospermū  
legitimum.

Nec minus frequens variis Pannonia & Austria locis aliud Lithospermi genus legitimum, semine candido, quo officina utuntur.

Rubia sativa.  
Asperula odorata  
Asperugo.  
Mollugo.

SED et in quibusdā Pannonia pratis, veluti inter Posonium & Tuben ultra Danubium sponte nascitur Rubia sativa & legitima: in siluis verò, Asperula flore odorato, & in caduis Asperugines & Mollugines, quarum una est quæ multis geniculis constat, foliaque habet ceteris molliora: hanc Rhizotoma à geniculorū non modo frequentia, sed à facultatibus etiam Gliedkraut cognominant: etenim eius decoctum ad fovendos & confirmandos artus admodum utile esse ferunt.

## De TRACHELIO siue Rapunculo alpino.

## CAP. XIII.

TRACHELII & Rapunculi varia his in regionibus nascuntur genera. Etenim nulla sunt silua montose, quæ Trachelium illud foliis urtica subcaruleo flore non alant: sublimiora iuga ut Sneberg & similia etiam id quod albo flore variat: aliud præterea genus mollioribus foliis, & oblonga minorum florum spica anteriore parte spectantium, cuius radix alioqui crassa & edulis tenuibus fibris mirè serpit, & subinde nouas plantas generat, cuius rei causa rei herbaria studiosis est exosa: illud item genus campanule quod Matthiolus Phyteuma esse credidit nunc caruleo nunc albo flore varium: & Rapunculos vulgares, & alios atopecuroïdes omnibus propè siluis familiares, spica vel alba aut violacea spectabiles, Herbariis satis notos. At hoc capite duntaxat eas stirpes describemus quæ ab aliis nondum prodita sunt.

Trachelij maxima varietas.

PRIOR dodrantalis est plantula, cauliculo striato, in plures ramulos diuiso, quorum singuli sustinent florem satis magnum, concanum, campanula modo effectum, in quinque angulos desinentem, quemadmodum in vulgari Trachelio aut Campanula vulgo dicta, cinereo colore praditum: quibus succedunt capitula satis magna, trigona, deorsum spectantia, quæ continent semen vulgari trachelio simile, sed minus & exalbidum: folia quæ per cauliculum sparsa sunt, latiuscula basi cum alis amplectuntur, & in oblongum mucronem desinunt: quæ verò summa tellure nascuntur, latiuscula sunt, & oblongiore pediculo pradita: radix pro planta exilitate satis magna, candicans, superiore parte in plura capita extuberans, & quibusdam fibris hirsuta. Tota planta lanugine pubescit, lacteoque succo abundat.

I.  
Trachelium pumilum alpinum.

Nascitur

*Nascitur in Sneberg & vicinarum alpinum iugis: florètque Iulio.*

II.

Trachelium  
Supra dñs.

*MVLTA* habet Altera folia angusta hirsutáque, Echij fere foliis similia: inter qua oritur pedalis caulis, firmus, minimi interdum digiti crassitie, striatus, & multis angustis, oblongis, hirsutis que foliis septus: à cuius medio ad summum thyrsus, seu potius florum inter foliola latentium crassa spica pulcerrimo ordine disposita nascitur, Trachelij aut Rapunculi similius, sed minorum & pallescente colore, qui cuanescentes in capitula transeunt, exile subflauumque semen continentia: radix crassa est, digiti amplitudine, rugosa, candicans, & aliquot crassioribus fibris donata. Tota planta lacteo succo turget.

*Oritur in Sneberg & aliis vicinis iugis: observant etiam in ascensu Nenberg ad sinulam qua in editiore tumulto est supra monasterium.*

*Floret Iunio Iulioque.*

III.

Campanula  
minor alpi-  
na.

*ALVNT* etiam summa illa iuga, praesertim in rupibus & praecipitiis Campanule vel Rapunculi genus, cuius radicales fibrae admodum serpunt & vicina loca occupant, subinde germinantes & novas stirpes procreantes: ea initio orbiculata fere habent folia, deinde statim alia angusta confertim nascentia, Caryophyllei secundo loco supra descripti foliis adeò similia, ut incautos plerumque fallat, qui interdum cum suo cespite eruunt, Caryophyllum collegisse existimantes. Emergit deinde ex horum medio gracilis cauliculus, in multos tennes ramulos diuisus, oblongioribus foliolis confuso ordine nascentibus septus, flosculos è singulis ramulis dependentes proferens campanula siue rapunculi vulgaris floribus forma similes nunc elegantiarum caruleo colore pradtos, nunc saturato purpureo colore

Plus varietas.

colore aut violaceo nitentes, modo dilutior & quasi cinereo praditos, interdum etiam omnino niveos: capitula deinde Rapunculo vulgari similia, aut potius illi quæcum in Belgica tum plerisque Germania locis ad agrorum sub fruticibus, aut silularum margines secundum profundiores vias in umbra provenit. Totum etiam lactescit. Floret Iulio, interdum etiam Augusto.

## DE VMBELLIFERIS.

MAGNVS etiam est in his Provinciis Umbellifarum stirpium proventus. Nam præter plerasq. quas cum aliis regionibus communes habet: peculiare quasdam collegi quas nusquam alibi cõspicere memini. Earum historiam proximè sequentibus aliquot capitibus quàm accuratissimè poterimus tradere conabimur, initium ab elegantissimo Sefeli facientes.

## DE SESELI MONTANO.

## CAP. XIII.

TRIA igitur hoc capite describemus Sefeli genera planè inter se differentia: quorum

PRIMUM ampla habet folia per terram sparsa, I. & in multas alas diuisa, Sefeli Peloponèsi fere similia, <sup>Sefeli alpina.</sup> superne virentia & splendentia, prona parte minimè, ferula odore, acri sapore & non admodum grato: caulem deinde sesquicubitale aut ampliorè, crassum, striatum, intus fungosum, nodosum, & multos ramos in circuitu ex singulis nodis siue geniculis ferentem, per quem sparsa sunt folia superioribus respondentia, sed minora: extremi rami in magnas umbellas desinunt flosculorum quinque foliolis candidis constantium odore fere sambuci: flori succedit semen gemellum, striatum, flavescent, aromatico & feruido gustu: radix crassa & foris nigra  
x est, quæ



est, quæ, ut in plerisque ferulaceis, postquam planta semen tulit, perit, nec nisi altero aut tertio à sativ anno flores producere solet.

Crescit in celsis Sneberg & aliarum vicinarum Alpium iugis, ubi latiora sunt pascua: floretq; sub Iunij finem aut Iulio, semen verò Augusto, & etiam serius interdum maturescit.

BRACHIALI interdum hoc nititur radice, præsertim si planta vetusta sit (recentiores & iuniores pollicarem habent), aliquot ramis inferiore parte donata, crasso, rugoso, nigroq; cortice septa, gummoso primò, acri deinde & salivam ciente: ea superiore parte in multa capita extuberat hirsuta & villosa, quemadmodum fere omnes ferulacci generis stirpes, unde exeunt magna & satis ampla foliorum ala, aliquot foliis per ambitum serratis & nonnihil incisus uni costâ inhaerentibus & inter se oppositis constantes, colore supina parte dilutius vi-  
rente & aliquantulum splendente, prona subcinereo præditis: inter quæ sesquicubitalis interdum emergit caulis striatus, pollicari nonnunquam crassitudine, geniculatus, in aliquot ramos divisus, quæ ambiunt per singula genicula minores foliorum ala, summum caulem atq; extremos ramos exornant umbellæ pallescentium flosculorum, quibus succedit semen Sileri montano simile.

II.

Seleri montanum latifolium.

Inuenitur fere in omnibus Pannonia & Austria inferioris montibus, solo aspero & petroso ventisq; perflato. Iulio & Augusto floret, & subinde semen profert. Simile aliquando legere memini ad Allobrogicarum alpium radices.

TERTIO multe sunt foliorum ala, Fœniculi fere modo in multa tenuia folia illius foliis non multo crassiora attamen breviora divisa, virides admodum, mucrone omnium foliorum candido & duro, gustu calido:

III.

Seleri montanum angustifolium.







inter quas nascuntur caules cubitales aut ampliores, minimi digiti crassitie, striati, geniculati, in aliquot ramos diuisi, quos secundū nodos alia minores amplectuntur foliorum ala: flores extremo caule & summis ramis umbellatim nascuntur albi: deinde semina gemina coniuncta, ut in omnibus umbelliferis, striata, Angelica semini haud multum absimilia, gustu feruido: radix multis crassis & oblongis fibris obliquè & latè sparsis constat, quæ singulis annis summo capite nouas propagines ad latera facit.

Nascitur in plerisque istarum Proninciæarum montanis pratis: atque Iulio floret.

INTER σισέλιως Seseli genera posse referri has stirpes omnino existimo. Prima quidem proximè accedere videtur ad illud quod Dioscorides Peloponense appellat & tertio loco describit. Altera plurimum habet similitudinis cum Libanotide altera Fuchsj, siue Dauco secundo Matthioli: D. Peters wurtzel quidam rustici vocant, tametsi aliam umbelliferam stirpem etiam hoc nomine & frequentius donēt. Tertiam (quæ Massiliensis Seseli picturam apud Matthiolum aliquantulum refert) nonnulli fortasse alteram Libanotidem Dioscoridis fructiferam potius esse contendant, à qua sanè non multum differre videtur. Ea, quemadmodum nec prima, nullum, quod equidē sciam, vulgare nomē obtinuit.

SESELI porro ethiopicum Matthiolo nuncupatum uberrimè nascitur per omnes Pannonia & Austria siluas, ubi folia in tantam amplitudinem interdum euadunt, ut palmum aquare possint: habent verò magna ex parte singula foliorum ala quina duntaxat folia, vno extremam alam occupante, per ambitum serrata, supernè, atronirentia, infernè subcinerei quodammodo

Seseli æthiopicum Matthioli.

coloris: caulis cubitalis est aut amplior, geniculis interceptus, & superiore parte in aliquot ramulos diuisus sustinentes exalbescantium flosculorum umbellas, qui in oblongiusculum & angulosum semen transeunt, cuminum aut Siler montanum odore & gustu referens: radix pollicari aut ampliore crassitudine, in aliquot crassiores fibras diuisa, crasso cortice tecta, gustu initio dulci, deinde amaricante, supremo capite hirsuta (veterum foliorum quæ perierunt fibris eam hirsutæ facientibus) perennis.

Seseli æthiopicum aliud.

Verum huius Seseli aliud præterea genus est, in his Provinciis satis vulgare: quod nusquam tamen abundantius inueniatur quàm in Calenberg. Maiores id habet foliorum alas, hoc est, in plura folia, nempe vicena bina plerumque superioribus magnitudine longè cedentia diuisas, quæ supernè splendētia minus virent, & prona parte cinerei planè coloris sunt, omnia in ambitu non modò ut superiora serrata, sed etiam laciniis dissecta: aequalē cum superiore habet etiam caulem, nodis similiter interceptum, florum umbellas similes, semen par, & radicem non dissimilem.

Hoc Germani Schwartz hirtzwurtz, hoc est nigram ceruariam, illud Wepss hirtzwurtz, id est, albam ceruariam appellant. Sunt qui inter Libanotidis genera recensent. Floret utrumq; Iunio interdum etiam ferius, semen maturum est Augusto.

Siler montanum.

FREQUENS etiam est in his montibus Siler: at nusquam abundantius crescere memini quàm in eo qui Badensibus thermis imminet. Vbi, & in aliis vicinis collibus, atque urbi Vienna proximis vulgare etiam est

Oreoselinum. Oreoselinum.

Archangelica.

ARCHANGELICA autem à nonnullis appellata, amplioribus quàm Angelica foliorū alis, et dum te-



nera adhuc sunt subpurpureis, caule humanam altitudinem superante, brachiali aut ampliore crassitie, frequentissima est in montibus Greb'en arcu ultra Drauum vicinis: solet ea quemadmodum & Angelica perducto ad maturitatem semine perire, atque illo in terram sponte recepto renasci.

## DE PEUCEDANO PANNONICO.

### CAP. XV.

Peucedanum  
pannonic.

**RADICEM** habet pollicari plerumque crassitie, interdum minorem, nonnunquam etiam maiorem, longam, crasso cortice modò candicante, modò nigricante tectam, sapore primùm Pastinacæ, deinde nōnihil acrimonia referente, transuersis & obliquis aliquot crassioribus fibris donatam, superiore parte hirsutam: ex qua quinque vel plura excunt folia Peucedano vulgari & legitimo fere similia, sed minora & breuiora; colore ex viridi ceruleo, non ut illa nigricante, subamaro sapore, & nihil singularis referente odore: inter ea caulis assurgit cubitalis, rotundus, gracilis, in multos ramos diuisus, in quibus umbellæ candidorum florum: semen Sclini fere, breue crassiusculumque, geminum ut in omnibus umbelliferis, colore cinereo, sapore aliquantulum amaro & acri.

Prouenit multis Vngariæ & Austriæ inferioris locis montium accliuibus petroso & salebroso solo, ubi Iunio floret: at in Alpibus (ubi etiam nascitur) Iulio & Augusto, & subinde semen profert.

NON multum differre videtur à Saxifraga secunda Matthioli.

DE SA-

## DE SAXIFRAGA PANNONICA.

## CAP. XVI.

MULTO minor superiore est Saxifraga, & bre- Saxifraga  
multifido  
folio.  
nioribus foliis fumaria foliorum fere amulis sapore & odore superiori quodammodo similibus, paulo tamen acrioribus: inter qua cauliculi exeunt pedales, graciles, gemculati, aliquot exiguis foliis exornati, suprema parte candidorum flosculorum umbellam sustinentes: radix eius superiori hand est absimilis, sed brevior, acrior, saluamque ciens, multa hirsuta capita superiore parte producens, unde caules & folia emergunt.

Inuenitur iisdem locis quibus superior, praesertim verò in aperto & glabro monte qui medium quasi spacium inter Hamburgum & Altenburgum Vngariae urbes occupat, etiam in mediis saxis plerumque erumpens. Inuenitur & colliculo iuxta Zimmerin itinere ad Phasianorum, iuxta Lachn, & plerisque locis circa Viennam. Floret Iulio.

CETERVM vulgaris admodum est per omnes has Saxifraga siue  
Pimpinella  
germanica.  
Prouincias Saxifraga vulgaris, à Germanis Pimpinella nuncupata, cum minor, tum maior, atque utriusque varia inueniuntur differentia foliorum forma inter se discrepantes praesertim in minore, qua interdum folia singula laciniata habet aut angustioribus & oblongis incisuris diuisa. In maiore autem tametsi magna ex parte Eius varietas  
foliorum forma non variet, nisi quòd vnum genus atroxirentia ea obtineat & splendentia (omnia enim in ambitu serrata sunt & per ulas ordine disposita) alia minime: inuenitur tamen cuius folia in lacinias sunt diuisa: praeterea in Etschero cuius flores eleganter ex purpura rubescunt, cum reliquorum sint candidi.







Pimpinella si-  
ue Sanguisor-  
ba.

NEC minus est frequens cum in pratis tum sic-  
cioribus harum Prouinciarum locis Pimpinella Italo-  
rum & Gallorum, quam Germani Sanguisorbam vo-  
cant, maior & minor.

Vimaria.

ALVNT etiam prata & torrentium ripa Ulma-  
riam foliis & temperamento Pimpinella maiori Italice  
quodammodo respondente, atq; etiam odore: & monia-  
na silua Barbam caprinam Fuchsj & Tragi, ab Ul-  
maria diuersam.

Barba capri-  
na.

## DE DAUCO MONTANO.

### CAP. XVII.

Daucus mon-  
tanus.

ELEGANS profecto est hoc Dauci genus in Al-  
pium huius Prouincia sublimibus pratis nascens, cui  
quina aut sena ex radice prodeunt tenuiorum foliorum  
ala Seseli pratensis (quod abunde in totius inferioris Au-  
striae pratis nascitur) alatis foliis fere similes, sed multo  
minores, neq. palmi amplitudinem excedentes, sed pro-  
ximè ad *Acus* pastoris vulgaris folia accedentes, ad-  
modum virides: inter quas prodeunt caulibus nudis,  
striatis, satis gracilis, qui in summo binas aut ternas  
sustinet paruas & bene confertas umbellas strobilorum  
ex rubro dilute purpurascentium, sine carnei coloris,  
quinque foliis constantium, quos excipiunt Selini horten-  
sis aequalia semina: radix digitalis longitudinis cor-  
sice foris nigricante, rugosa, & multis tenuibus fibris praedita.

Tota planta *Daucum* vulgarem quodammodo re-  
dolet, & illius saporem etiam refert.

Floret Iunio, in hortis etiam Maio.

Daucus creti-  
cus.

AT legitimus *Daucus* Creticus appellatus in Dur-  
renstain frequens: Et scherus tamen magis illo abundat:  
nascitur istic inter saxa tenui solo aspersa, ut difficulter  
eius in-



eius integra radix erui possit, cinerei coloris folio, et viribus cum eo quod in Creta insula provenit proculdubio conferendum.

VULGARIS autem Daucus passim in omnibus his Prouinciis crescit, & in officinarum usu est. Quemadmodum & Carum, quo praesertim sicciora Ungaria praeta abundant, & magnam seminis copiam in quotidianum usum singulis annis suppeditant.

Daucus vulgaris.

Carum.

Alpinum verò iuga Meum vulgare tenui folio alunt: sed nullibi gentium frequentius observare memini quam in Durrenstein.

Meum vulgare.

## De SELINO montano pumilo.

### CAP. XVII.

STATIM à radice aliquot spargit folia fœniculo aut peucedano similia, sed longè minora, & rarò pluribus quàm quindenis foliolis constantia, è quorum medio dodrantalè crassumq; fert caulem, multis tamen alis concavum, sub quibus alia foliorum ala minores, nouenisq; tantum foliolis constantes, lata basi caulem amplectuntur, pastinaca siue staphilini gustu & odore: singuli ramuli exiguum florum quinq. candidis foliolis constantium cum totidem staminulis & inodoratorum umbellulis sunt onusti: quibus succedit semen selini fere: radix superiore parte crassa, multisque villis (qui foliorum superioris anni fibrae sunt) hirsuta, brevis, quasiq; in orbem conuoluta, interius fungosa & candida, exterius nigricans & rugosa, inferiore parte plerumque bifida, & in raras fibras desinens.

Selinum montan. pumilum.

Inuenitur quibusdā sicciorū desertorumq; virētium tamē, agrorū marginibus, & in nudis gramineisq. montibus



*sibus inferioris Austria & Pannonia: florétque Maj initio. Biennalem esse existimo uti pleraq, umbellifera, statimque prolato semine perire.*

## DE CICYTARIA PANNONICA.

## CAP. XIX.

QVINA senâue aut plura promit à radice ramosa Cicutaria  
pannonica.  
folia uti Petroselinū vulgare, minora tamen & tenuius incisa, multum ad Bulbocastani vulgo vocati folia accedentia, sapore aliquantulū acri: caulis inter ea emergit pedalis ferme, interdum etiam cubitalis, circa nodos crassior, umbellam ferens candidorum flosculorum, & semen deinde oblongum Cheresfolij vulgaris fere modo: radix tuberosa Bulbocastani ferme amula, at Aristolochia rotunda albicante flore siue secunda instar rotunda & aliquantulum turbinata, intus candida, sapore & odore Pastinaca siue Elaphobosci propemodum, cortice nigro tecta, qua succrescente caule instar napi longior fit, & magis turbinata, flaccida, & rugosa euadit, atque tandem maturo semine perit, è semine tamen deciduo sponte singulis annis renascens.

Nono vere in hortis & herbidis locis Viennensis agri prodit, quo tempore eius radices qua firmiores sunt cum tenellis suis foliis in foro Viennensi venales reperiuntur, coquuntur enim & cum oleo, aceto, & sale primis mensis istis vulgo inferuntur, quàm salubri cibo, nescio. Floret Aprili & Maio, Iunio semen plenam maturitatem consequitur.

QVÔ nomine istam plantam donarem, magis proprium mea quidem opinione non succurrit quàm Cicutaria: vulgus peperlin appellat.

DE FI-



## DE FILICE PYMILA SAXATILI.

## CAP. XX.

FOLIORVM *quædam similitudo & diuisura facit ut elegans hoc Filicis genus Umbelliferis stirpibus subiungam: id autem in marem & feminam distinguemus, Theophrasti sententiam libr. 9. cap. 20. Hist. plant. sequentes.*

MAS igitur radice serpit nigra, tenui, oblonga, in I. obliquum sese spargente, raris fibris tenuibus & duris capillata; admodum adstringentis saporis: ex qua procedunt multi pedales cauliculi diuisi in aliquot alatorum foliorum ramos, filicis maris maioris siue femina vulgo Herbariorum credite modo, multo tamen minorum, tenuiusque incisorum & admodum tenellorum, præcipua parte multis plerumque nigris maculis quemadmodum in femina distinctorum.

Filix pumila mas.

FEMINA quinos aut senos habet cauliculos teretes, II. rectos, initio virides, deinde temporis successu omnino nigricantes, palmares, à medio unicam foliorum infectorum alam unico ad summum usque artu porrectam sustinentes, eadem qua in mare vulgari forma & facie, multo verò minorum tenuiorumque, sapore nonnihil adstringente, præcipua etiam parte multis nigris maculis (qua deinde efflorescere videntur) aspersorum: radix veluti in caput coacta, quemadmodum in mare vulgari, & multis nigris durisque fibris capillata est.

Filix pumila femina.

Prior copiosissime nascitur in saxis non modo ad Garmingam & Neuberg, sed ad omnium fere montium radices. Altera verò in montibus præruptis inter ipsa saxa inuenitur, sed non adeò frequenter.

FILICULÆ porro elegans illud genus quod à Do-

Lonchitis altera Matäthæ

Etiss.



*Etiss. Marantha Lonchitis altera nuncupatur, frequens admodum nascitur in Styriacarum alpium iugis. Sed qua vulgo Lonchitidis alterius nomen obtinuit, raro admodum in his iugis inuenitur, licet per uniuersam Germaniam sit frequentissima.*

Lonchitis altera Neotenic.

## DE ALECTOROLOPHO ALPINO.

## CAP. XXI.

HANC plantam filicibus subnectere volumus propter foliorum quandam similitudinem. Eius autē plura genera in Alpium iugis montanisque pratis inueniuntur.

VNUM etenim plures ab una radice promit cubitales caules minimi fere digiti interdum crassitie, *laues*, per quos sparsa sunt foliorum ala *Filipendula* foliis non admodum dissimiles: flores in summis caulibus copiosi, oblonga spica instar, quemadmodum in *Orchidibus* confertim nascentes, & illarum floribus persimiles è calyculis pentagonis inter minutiora folia prodeuntes colore exalbido; quibus succedunt mucronata capitula maturitate dehiscencia, semēq; ostendentia exiguum, inaequale, cinerei coloris: radix crassiuscula est, & perennis, in crassas fibras asphodelinis similes diuisa.

I.  
Alectorolophus alpinus maior.

INVENITUR & aliud genus per omnia illi fere simile, cuius flores modo pallidi, modo purpurei sunt: radix etiam crassior & fibras *Asparagi* radicibus similes agens.

II.  
Eius varietas

Utumque genus in summis alpibus *Durrenstein*, *Etscher*, aliisque celsis & herbosis iugis nascitur: posterius etiam in inferioribus uliginosisq; pratis. Memini & in *Flandria* pratis atque non procul *Gentilly Parisiensi* agro observare.

III.  
Alectorolophus alpinus minor.

TERTIUM in iisdem etiam iugis crescit longè humilius







milis, neque palmarem altitudinem superans, cuius cauliculi graciles, & raris minoribusq. foliis obsiti sunt, florum spica breuior & eleganti rubro purpurascente colore nitens, calyculi flores continentes laciniati, et veluti foliati: maiora capitula quam in superioribus, & veluti rostrata, quæ angulosum etiam & inaequale semen continent: radix minimi digiti crassitiem interdum æquat, fibrisq. candicantibus & satis crassis donata est.

2. Illius genus est tenerior alia planta cauliculis angulosis, & lanugine quemadmodum folia (quæ minora sunt), calyculique (qui breuiiores & minores) pubescentibus: flores simili purpura fere nitent, sed minores & humilioris galea præditi sunt: capitula vix ex calyculis emergunt: & radix non adeo fibrosa est.

*Fistularia.*

Eam in locis gramineis pratibusque siccioribus Germania superioris & inferioris sæpius obseruare memini florentem Maio, cum Iulio hic floreat: Sed & anno superiore, videlicet 1581. Aprili florentem, atque vel purpureo, vel carnei coloris, vel candido flore variantem collegi ad Groutz prædium C. V. Richardi Garth.

VULGO hæc vocatur à nonnullis *Fistularia*. Priorem describere videntur Pena & Lobelius in *Aduersariis Filipendula* nomine. Forsitan & illa erit cuius Iosias Simlerus ad calcem *Commentarii de Alpis* meminit his verbis:

Herba foliis *Aspleno* persimilis, cauliculis ab una radice quinque vel sex, duos fere palmos longis, & spicam florum sustentibus, ut orchis fere.

*Filipendula vulgaris.*

AT *Filipendula vulgaris* frequentissima est his in Prouinciis, cum in omnibus gramineis campis, tum caduarum siluarum marginibus.

*Inueniuntur.*

Inveniuntur etiam & varia *Oenanthes* genera Oenanthes  
varia genera.  
cum siccioribus gramineis locis, tum vdis pratis.

# De MYRIOPHYLLO aquatico minore.

## CAP. XXII.

VULGARE admodum est in Pannonia & Au- I.  
stria vicinarumq; Provinciarum minoribus fluviis qui Myriophyll.  
aquatic.  
versandarum molarum causa retinentur. *Millefolium*  
illud aquaticum à Neotericis descriptum, flore albo.

AT in lacunis secundum rivos sitis nec profundis I I.  
aliud elegans *Myriophylli* genus invenitur exiguum, Myriophyl-  
lum aquati-  
cum minus.  
late se fundentibus sarmentis præditum, quæ rotunda,  
viridia, frequentibusque nodis intercepta sunt, è quibus  
tenuia filamenta spargit quibus telluri inhaeret: supe-  
rior sarmentorum pars dodrantem aut palmum supra  
aquas eminet, quam ad singulos nodos quina tenuium  
parvisque foliolis præditorum foliorum ala ambiunt,  
vix unciam longa, virides admodum, quæ sensim circa  
sarmentorum summitatem minuuntur, sic ut in pyrami-  
dalem formam sarmenta desinant: summa sarmenta to-  
tidem flosculos quot foliorum alas in singulis nodis fe-  
runt, pusillos admodum, octonis candidis foliolis simul  
iunctis neque sese explicantibus præditos, qui deinde in  
quædam tubercula quatuor radiolos in capite habentia  
transseunt.

Flore & semine onusta hæc planta conspicitur  
mense Iunio.




## De TRIBULO aquatico minore.

## CAP. XXIII.

BICUBITALIA, tricubitaliâque aut longiora, pro <sup>Tribulus a-</sup> aqua altitudine ex radice profert sarmenta, tenuia, pu- <sup>quaticus mi-</sup> nican- <sup>nor.</sup> tia, plana, nodosa, & dum exsiccata sunt fractu contumacia, qua circa summum in plures diuiduntur ramos, alternatim ferentes in singulis nodis singularia folia, duarum interdum unciarum longitudine, & semunciali latitudine, tenuia & quasi transparentia, in ambitu adco crassa & sinuosa, ut laciniata videantur, colore ex viridi punicante: pediculi, qui exiguos candicantes flosculos unaq, in morem congestos sustinent, oblongi crassiusculique sunt & inter folia exoriantur, quæ bina semper inter se opposita cōtrario quàm reliqua inferiora modo nascuntur: singulis plerumque flosculis succedunt quaternæ aculeata grana simul coherentia paucam candidam medullam continentia: sarmenta infima parte in singulis nodis oblongas tenuesque & candicantes fibras agunt quibus firmatur. Tota planta aquis mergitur.

Primum in stagnis apud Nemethwywar maxima copia inter Tribulum aquaticum maiorem fructu eduli & Nymphaeam flore albo nascentem atque Iunii initio florentem & semine pregnantem observavi anno 1580. maturius tamen florere existimo, cum omnes ferme planta semine abundaret: deinde eodem mense in fossis urbis Viennensis ad portam quæ vulgo Stuebenthorn nuncupatur.

Similem fere plâtam eodem mense vidi apud Eber- <sup>2.</sup> storf Mag<sup>i</sup> Dn. Hieronymi Beck arcem in lacunis secundum rinos nascentem, sarmentis non planis sed rotundis, eodem tamen modo gemiculatis, bina semper in- <sup>Eius varietas.</sup> ter se





ter se opposita foliola ad singula genicula ferentem superioribus breuiora, mucronata, & minimè in ambitu crispata vel sinuosa: flosculos deinde ternos aut quaternos, pusillos, Muscatella Cordi flosculis persimiles, tenui breuig<sup>3</sup> pediculo insidentes: semen non obseruavi: serpit hæc, & ad ramulorum nodos & alas plerumque fibras agit.

## DE TYPHA MEDIA.

## CAP. XXIII.

Typha media.

COPIOSE nascitur palustri quadam fossa apud Tyburn sacellum, non procul ab eo loco in quo sepeliuntur quibus ob maleficia laqueo gula fracta est, primo ab urbe Londinensi lapide qua spectat occidentem, Typha quoddam genus medium multo angustioribus quam in Typha vulgari foliis, & graciliore claua, maiore tamen quam minima illa Typha quam D. Pennæus inter siccas stirpes ostendit, & Pena atque Lobelius in Aduersariis expresserunt: alioqui à maiore non differt pullo illo tomento in clauam compacto, & florum oblonga spica tenui flauo polline respersa supra clauam enascente. Floret Iunio.

## De GRAMINE montano spicato.


## CAP. XXV.

VARIA in harum Prouinciæ alpibus & montanis nascuntur graminis genera: sed de duobus duntaxat hoc capite agere constituimus.

1. MULTIS Primum capitibus ex radice digitali bisidaque interdum & trifida, multisq<sup>3</sup>, tenuibus fibris suprema parte hirsuta prodeuntibus constat, quorū singula proferunt sena aut plura oblonga, crassa & nonnihil carinata folia Caryophyllei illius quem vulgo Gramen ma-

Gramen montan. spicatum.







*menmarinum* maius cognominant foliis admodum similia, infima sede sese mutuò amplectentia, gustu amariusculo & calidiusculo: ex horum medio dodrantalis, nonnunquam & pedalis exit cauliculus, firmus, laevis, nudus & enodis, qui in summo multos slosculos spica instar congestos herbaceoq; colore praditos profert.

Inuenitur in montanis quibusdam pratis, duobus supra Badenses thermas miliaribus. Similem autem in Flandria maritimis frequenter legere memini, quam vulgus, ni memoria labitur, Suden appellabat.

ELEGANS verò est Alterum, nec antè mihi conspectum, cubitalibus culmis constans, tenuibus, geniculatis, qui palmaribus angustisq; foliis septi, summa sui parte desinunt in tenuem oblongamq; spicam, qua in lanuginosis glumis grana nuda auena similima fert: radix tenuis est, multisque fibris oblongis firmata, singulis annis antèrius serpens uti Spartum & Iunci.

II.  
Gramen mē.  
tan. auenæ  
semine.

Nascitur secundum vias in montanis umbrosisq; siluis Pannonia, Austria & Bohemia; & semen julio maturum est.

## DE SPARTO AVSTRIACO.

### CAP. XXVI.

PEDALIS longitudinis folia habet, gracilia, viridia, numerosa, qua tandem coeunt, & iunci modo lenia rotundaq; fiunt, quemadmodum Sparti Hispanici folia, quibus non multum absimilia sunt, sed minora & graciliora: inter ea culmi exeunt graciles, foliis hand longiores, qui spicam ferunt constantè tribus aut quatuor oblongis granis oblonga contortaq; cauda insignitis, qua tandem in dodrantalem atque pedalem interdum plumulam, tenuioribus alarum Mammocodiatae siue auis paradisi vulgo nuncupatae plumulis ferme respondentem

Spartum austriacum.



tem desinit: radix subest è multis capillamentis gramineis fibrisque composita, Hispanici sparti modo.

Abunde provenit in monte Badensibus thermis imminenti, totaq; illa catena montium qui inde ad Danubium usque excurrunt, ad siluulam praterea Lachen, aliisq; apertis & gramineis locis: sed omnium uberrimè in viuario illo Neapoli-austriaca urbi contiguo. Semen maturum Iunio à lenissimo vento excutitur, atque statim ubi decidit etià per gramina irrepit, & terra se condit.

## DE LEGVMINIBVS.

SVPEREST ut pro'nostrarum Observationum coronide, Legumina atque illis congeneres stirpes describamus.

### DE PHASEOLO.

#### CAP. XXVII.

PHASEOLI vulgo appellati multa inueniuntur genera, sarmentis lentis & obsequentibus, foliorumve forma, & reliquo nascendi modo non equidem inter se discrepantia: sed quorum flores, licet forma similes, & Pisi vulgaris florum æmuli, colore variant, quippe qui plerumque niuei, interdum flavescentes, nonnunquam etiam purpurascetes sine amethystini conspiciuntur. Ceterum in fructu, sine semine renum formam quodammodo exprimente, & oblongis siliquis sine lobis inclusis, longè maior coloris varietas deprehenditur. Etenim hoc anno 1582. nobis nati sunt aut niuei omnino, aut nigri, aut flauï, aut ex flauo obsoleti, aut purpurei, aut amethystini, aut cerulei, aut rubri, aut lateritij fere coloris, vel albi nigris venis & lituris distincti, atque etiam cinerei & carnei coloris similibus venis insignes.

Phaseoli insignis colorum varietas.

Attamen præter ea iam memorata genera, aliquot  
2 alia,





alia, dum Viēna vixi, obseruavi, semine ab amicis communicato mihi nata, nec antea mihi conspecta.

Phaseolus  
maior varius,  
sive Purkir-  
cherianus.

- I. **CAYLIS** in Priore statim à radice in aliquot sarmenta oblonga diuiditur, lenta, vicinos stipites & virgulta amplectentia reliquorum Phaseolorum modo: in singulis alis terna folia vulgari similia, attamen atriora ex eodem pediculo nascentia, extremo imparitatem, ut in vulgaribus, faciente: ex iisdem alis breues ramuli prodeunt, multis floribus vulgari haud absimilibus, minoribus tamen, albis, vna in modum congestis onusti, quibus succedunt siliqua oblonga, vulgaribus multo latiores, continentes ternos aut quaternos fructus planos communibus Phaseolis latiores, albos, & multis nigris maculis aut venis ab hilo in latitudinem ductis elegantissime depictos.

Serotina admodum fuit anno 1576. semine à C.V. D. Georgio Purkircherio Posoniensi Archiatro, p.m. mihi pro nostra amicitia communicato nata haec planta, ideoq, ad frugem peruenire non potuit. At ipsi Purkircherio, dum vixit, atque postea eius uxori (nempe ad pergulas aprico loco satas hic Phaseolus) singulis annis maturum fructum dedit. Sed etiam hoc anno eleganter mihi excreuerunt aliquot eius planta, quas ad maturitatem peruenire posse existimabam: sed ob Solis radiatum defectum, spe mea frustratus sum.

Phaseolus ni-  
ueus minor,  
sive de Guati-  
mela.

- II. **TOTA** forma & nascendi modo à vulgari haud differt alterum genus: etenim admodum ramosa habet sarmenta, quae vicinis perticis sese aduolunt easque scandunt, oblongos pediculos ex foliorum (quae semper terna, ut in vulgari, simul nascuntur) sinu prominentia, in quibus bini, quaterni, etiam seni nascuntur flores ex aduerso semper inter se oppositi, vulgaris Phaseoli floribus magnitudine & forma respondentes, initio &  
dum



*dum recens aperti sunt candidi, postmodum verò flavescentes: quos excipiunt oblonga & propendentes, ut in vulgari, siliqua, quina, septena & plura interdum candidissima & quasi ex ebore tornata semina continentes, minora & tumidiora quàm albi vulgaris.*

*Iulio floret, fructus Augusto, nonnunquam etiam Septembri maturescit.*

**HABET & Tertium** genus oblonga sarmenta, ex singulari caule statim ad radicem prodeuntia, & multis alis brachiata, lenta, obliquè se contorquentia, & humi procumbentia, nisi perticis aut pedamētis sustineantur, quibus sese circumvolvunt reliquorum Phaseolorum modo: purpurascunt ea iuxta alas, ad quas adnascuntur etiam terna folia superiore minora, & dilutiore colore virentia, longoq; pediculo inherentia, qui, ea parte qua folia sustinet, contrariāq; qua sarmentis inhaeret ex atro purpurascit: flores in oblongis pediculis plerumque bini, magni, Pisi forma, foris ex candido pallescentes, interiore verò parte ex purpura cerulei: his succedunt totidem praelonga siliqua, teretes, & quasi cylindrata, in quibus fructus reliquis Phaseolis minor, Anagrydis legitima fructui fere similis, colore rubescente.

*Semine ex Hispaniis misso natus etiam mihi est hic Phaseolus anno 1576. serius quidem, ut fructus maturitatem consequi non potuerit: sed proximo anno satus, maturius floruit, cuiusq; fructus ad frugem pervenit.*

**DISSIMILIS** est Quartus superioribus. Non enim habet oblonga sarmenta quemadmodum illi: sed brevis firmoq; caule constat, pedalem longitudinem non excedente, & brevissimas alas faciente, ad quas folia superiori quidem similia nascuntur terna numero, sed minora & breviori pediculo inherentia, qui non purpu-

III.

Lobi americani  
cani maiores.

IIII.

Lobi americani  
minores  
sive pumilio-  
nes.



## De TRIBULO aquatico minore.

## CAP. XXIII.

BICUBITALIA, tricubitaliâque aut longiora, <sup>Tribulus aquaticus minor.</sup> pro aqua altitudine ex radice profert surmenta, tenuia, pun-  
necantia, plana, nodosa, & dum exsiccata sunt fractu  
contumacia, quæ circa summum in plures diuiduntur  
ramos, alternatim ferentes in singulis nodis singularia  
folia, duarum interdum unciarum longitudine, & se-  
munciali latitudine, tenuia & quasi transparentia, in  
ambitu adco crispa & sinuosa, ut laciniata videantur,  
colore ex viridi punicante: pediculi, qui exiguos candi-  
cantes flosculos unaq; in morem congestos sustinent, ob-  
longi crassiusculique sunt & inter folia exoriuntur, quæ  
bina semper inter se opposita cōtrario quàm reliqua in-  
feriora modo nascuntur: singulis plerumque flosculis  
succedunt quaternæ aculeata grana simul coherentia  
paucam candidam medullam continentia: sarmenta in-  
fima parte in singulis nodis oblongas tennesque & can-  
dicantes fibras agunt quibus firmatur. Tota planta a-  
quis mergitur.

Primum in stagnis apud Nemethwywar maxi-  
ma copia inter Tribulum aquaticum maiorem fru-  
ctu eduli & Nymphaeam flore albo nascentem atque  
Iuny initio florentem & semine pregnantem observavi  
anno 1580 maturius tamen florere existimo, cum om-  
nes ferme planta semine abundaret: deinde eodem men-  
se in fossis urbis Viennensis ad portam quæ vulgo Stu-  
benthorn nuncupatur.

Similem fere plantam eodem mense vidi apud Eber-  
storf Mag<sup>i</sup> Dn. Hieronymi Beck arcem in lacunis se-  
cundum rivos nascentem, sarmentis non planis sed ro-  
tundis, eodem tamen modo gemclatis, bina semper in-  
ter se

2.

Eius varietas.





ter se opposita foliola ad singula genicula ferentem superioribus breuiora, mucronata, & minimè in ambitu crispata vel sinuosa: flosculos deinde ternos aut quaternos, pusillos, Muscatella Cordi flosculis persimiles, tenui breuiq; pediculo insidentes: semen non obseruavi: serpit hæc, & ad ramulorum nodos & alas plerumque fibras agit.

## DE TYPHA MEDIA.

## CAP. XXI III.

Typha media.

COPIOSE nascitur palustri quadam fossa apud Tyburn sacellum, non procul ab eo loco in quo sepeliuntur quibus ob maleficia laqueo gula fracta est, primo ab urbe Londinensi lapide qua spectat occidentem, Typha quoddam genus medium multo angustioribus quàm in Typha vulgari foliis, & graciliore claua, maiore tamen quàm minima illa Typha quam D. Pennæus inter siccas stirpes ostendit, & Penà atque Lobelius in *Aduersariis* expresserunt: alioqui à maiore non differt pullo illo tomento in clauam compacto, & florum oblonga spica tenui flauo polline respersa supra clauam enascente. Floret Iunio.


## De GRAMINE montano spicato.

## CAP. XXV.

VARIA in harum Prouinciæ alpebus & montanis nascuntur graminis genera: sed de duobus duntaxat hoc capite agere constituimus.

- I. MULTIS Primum capitibus ex radice digitali bifidaque interdum & trifida, multisq; tenuibus fibris suprema parte hirsuta prodeuntibus constat, quorū singula proferunt sena aut plura oblonga, crassa & nonnihil carinata folia Caryophyllei illius quem vulgo Gramen ma-

Gramen montan. spicatum.







men marinum maius cognominant foliis admodum similia, infima sede sese mutuò amplectentia, gustu amarinsculo & calidiusculo: ex horum medio dodrantalis, nonnunquam & pedalis exit cauliculus, firmus, laevis, nudus & enodis, qui in summo multos sfoculos spica instar congestos herbaceoq; colore praditos profert.

Inuenitur in montanis quibusdam pratis, duobus supra Badenses thermas miliaribus. Similem autem in Flandria maritimis frequenter legere memini, quam vulgus, ni memoria labitur, Suden appellabat.

ELEGANS verò est Alterum, nec antè mihi conspectum, cubitalibus culmis constans, tenuibus, geniculatis, qui palmaribus angustisq; foliis septi, summa sui parte desinunt in tenuem oblongamq; spicam, qua in lanuginosis glumis grana nuda aene similima fert: radix tenuis est, multisque fibris oblongis firmata, singulis annis antè serpens uti Spartum & Iunci.

Nascitur secundum vias in montanis umbrosisq; silvis Pannonia, Austria & Bohemia; & semen julio maturum est.

## DE SPARTO AVSTRIACO.

### CAP. XXVI.

PEDALIS longitudinis folia habet, gracilia, viridia, numerosa, qua tandem coeunt, & iunci modo lenie rotundaq; fiunt, quemadmodum Sparti Hispanici folia, quibus non multum absimilia sunt, sed minora & graciliora: inter ea culmi exeunt graciles, foliis hand longiores, qui spicam ferunt constante tribus aut quatuor oblongis granis oblonga contortaq; cauda insignitis, qua tandem in dodrantalem atque pedalem interdum plumulam, tenuioribus alarum Mamucodiatae siue auis paradisi vulgo nuncupatae plumulis ferme respondentem

II.  
Gramen mō.  
tan. aene  
semine.

Spartum austracum.



tem desinit: radix subest è multis capillamentis gramineis fibrisque composita, Hispanici sparti modo.

Abunde provenit in monte Badensibus thermis imminenti, totaq; illa catena montium qui inde ad Danubium usque excurrunt, ad siluulam praterea Lachen, aliisq; apertis & gramineis locis: sed omnium uberrimè in viuario illo Neapoli austriacæ urbi contiguo. Semen maturum Iunio à lenissimo vento excutitur, atque statim ubi decidit etiã per gramina irrepit, & terra se condit.

## DE LEGVMINIBVS.

SVPEREST vt pro'nostrarum Observationum coronide, Legumina atque illis congeneres stirpes describamus.

### DE PHASEOLO.

#### CAP. XXVII.

PHASEOLI vulgo appellati multa inveniuntur genera, sarmentis lentis & obsequentibus, foliorumve forma, & reliqua nascendi modo non equidem inter se discrepantia: sed quorum flores, licet forma similes, & Pisi vulgaris florum æmuli, colore variant, quippe qui plerumque niuei, interdum flavescentes, nonnunquam etiam purpurascens sine amethystini conspiciuntur. Ceterum in fructu, sine semine renam formam quodammodo exprimente, & oblongis siliquis sine lobis inclusis, longè maior coloris varietas deprehenditur. Etenim hoc anno 1582. nobis nati sunt aut niuei omnino, aut nigri, aut flauï, aut ex flauo obsoleci, aut purpurei, aut amethystini, aut carulei, aut rubri, aut lateritij fere coloris, vel albi nigris venis & lituris distincti, atque etiam cinerei & carnei coloris similibus venis insignes.

Phaseoli insignis colorum varietas.

Attamen præter ea iam memorata genera, aliquot  
 z alia,





dum recens aperti sunt candidi, postmodum verò flavescentes: quos excipiunt oblonga & propendentes, ut in vulgari, siliqua, quina, septena & plura interdum candidissima & quasi ex ebore tornata semina continentes, minora & tumidiora quàm albi vulgaris.

Iulio floret, fructus Augusto, nonnunquam etiam Septembri maturescit.

HABET & Tertium genus oblonga sarmenta, ex singulari caule statim ad radicem prodeuntia, & multis alis brachiata, lenta, oblique se contorquentia, & humi procumbentia, nisi perticis aut pedametis sustineantur, quibus sese circumvolunt reliquorum Phaseolorum modo: purpurascunt ea iuxta alas, ad quas adnascuntur etiam terna folia superiore minora, & dilutius colore virentia, longoque pediculo inhaerentia, qui, ea parte qua folia sustinet, contrariaque, qua sarmentis inhaeret ex atro purpurascit: flores in oblongis pediculis plerumque bini, magni, Pisi forma, foris ex candido pallescentes, interiore verò parte ex purpura carulei: his succedunt totidem praelonga siliqua, teretes, & quasi cylindrata, in quibus fructus reliquis Phaseolis minor, Anagyridis legitima fructui fere similis, colore rubescente.

Semine ex Hispaniis misso natus etiam mihi est hic Phaseolus anno 1576. serius quidem, ut fructus maturitatem consequi non potuerit: sed proximo anno satius, maturius floruit, cuiusque fructus ad frugem pervenit.

DISSIMILIS est Quartus superioribus. Non enim habet oblonga sarmenta quemadmodum illi: sed brevis firmoque, caule constat, pedalem longitudinem non excedente, & brevissimas alas faciente, ad quas folia superiori quidem similia nascuntur terna numero, sed minora & breviori pediculo inhaerentia, qui non purpu-

III.

Lobi americani  
maiores.Lobi americani  
minores  
sive punilio-  
nes.







rascit, ut in proximè descripto: pediculi ex alis prodeun-  
tes etiam binos flores magna ex parte sustinent, cum for-  
ma, tum colore proximè descripto simillimos, deinde bi-  
nas siliquas illius siliquis crassiores, in quibus fructus  
magnitudine & forma par, sed colore differens: nam  
niveus est, circa hilum nigra macula insignitus, & qui-  
busdam nigris punctis interdum in lateribus notatus.

Satis præcox hic est, nec ullis pedamentis eget, cum  
(ut dixi) brevis firmoq; sit caule. Crenit et hic mihi anno  
1576. donatus à C.V. D. Rēberto Dodoneo S. C. M<sup>in</sup>  
tum Medico, qui eius fructum anno 1575. dum Praga  
esset in Arcis horto observavit & collegit.

Idem fructus etiam ex Hispaniis anno 1577. missus  
fuit, cum tertio genere, in quo triplicem coloris varia-  
tatem tum temporis observavi: nam aut rubescebat, aut  
pallescebat, aut pulla nigredine nitebat.

V.

TEN VIA habet Quintum genus sarmenta, ex  
singulari caule statim proximè radicem enascentia,  
eaque admodum ramosa, ex viridi purpurascencia,  
que vicinis perticis & pedamentis sese conuolunt:  
folia ex eodem pediculo, ut in aliorum Phaseolorum  
genere semper terna, longè tamen minora & Trifo-  
lij mœnianthis (quod in umbrosis & ubere gleba na-  
scitur) perquam similia, atrouirentia, circa pedicu-  
lum purpurascencia: flores in spica modum congesti,  
magni, Pisi vulgaris forma & magnitudine fere, flavo  
colore, in oblongo crassoq; pediculo ad foliorum exortum  
prodeunte nascuntur: siliquas non observavi, sed breves  
angustasque esse intelligo, ternasque aut quaterna dun-  
taxat grana continere: ea sunt parva admodum La-  
burni fructu haud maiora, utroque tamen mucrone ple-  
rumque obtusiore, pulli, siue potius ex nigro subuirescen-  
tis coloris.

Phaseolus æ-  
gyptiacus.





PRIORIS fructum D. Purkircherius primus in Pannoniam intulit ex Neapolitano regno delatum, singulisque annis coluit, & cuius genus, ut dixi, conseruauit: quam ob causam apud rei herbaria illius regionis studiosos, Purkircheri cognomen inditum, & ut Phaseolus Purkircherianus nuncuparetur obtinuit. Ante multos verò annos similem planè mihi missum memini phaseoli Africani nomine: & ex Africa Italos primùm accepisse verisimile est. Alter ex Hispaniis anno 1581. missus frizoles blancas de Guatimela, hoc est, phaseoli albi ex Guatimela (qua noui Orbis prouincia est) nomine, mihiq; eodem anno communicatus, subsequente Vere satus egregiè creuit, & ad frugem quo dixi tempore peruenit. Proxima duo genera ex Hispaniis accepta cum hac inscriptione Alubias de Indias, id est, Lobi Indici. Quintus mihi Patanio missus à doctissimo viro Bernardo Paludano frifio ex Syria ex Egypto reduce, anno 1578. qui terra anno subsequente concreuit, creuit quidem, sed serò admodum, deinde perit. E seminibus conseruatis & hoc anno 1582. demum satis, aliquot plantæ egregiè prouenerunt, quarum una florem Septembri duntaxat mense tulit, ideoque caloris inopia ad frugem minimè peruenire potuit: ipsa tamen planta nunc etiam Calend. Nouembr. perbellè adhuc virente, ἀνώρουα à Paludano accepi: at hoc anno Egyptiaci phaseoli nomine ex Italia similem accepimus.

Phaseolus  
Purkircheria-  
nus vel asii-  
canus.

Frizoles de  
Guatimela.

Alubias de  
Indias.

Aegyptiacus  
phaseolus.

ALIVD porro Phaseoli siue Leguminis genus cum superiore idem Paludanus misit, cui Leplap nomen inscriptum erat: sed nec tum temporis, neque hoc anno terra commissum nasci voluit. Illius tamen cum suo semine siliquæ Lectoris oculis subiiciendam esse putavi. Brenis et lata est, quaternâq; grana oblongiuscula, nigra, hilo nihilominus albo admodum longo prædita cōtinuit.

Leplap.



Phaseolus Indicus.



Mates fructus Indicus.



SUPERIORIS verò anni Autumno, dum ex  
 Anglia huc redirem, elegans aliud Phaseoli genus Co-  
 lonia apud nobilem matronam C.V.D. Hoperi viduam  
 conspexi, angustis foliis, fructu vulgari Phaseolo minore  
 & planiore, subrubro colore, ex Hispaniis ab illa acce-  
 pto frizoles Guateli appellatione: quem cùm ad fru- Frizoles Gua-  
teli.  
 gem peruenisse existimem, quin C. V. Rembertus Do-  
 donaues eius descriptionem in suam novam Stirpium hi-  
 storiam (quam tum propediem in lucem dare sperabat)  
 intulerit, non dubito.

## DE PISO SILVESTRI.

## CAP. XXVIII.

NEC sarmentis, nec foliis à vulgari piso quod in a- Pisum sil-  
perenne.  
 gris feritur multum differt: multa enim & oblonga ex  
 eadem radice profert sarmenta angulosa, striata, fractu  
 contumacia: folia deinde uncialia, membranacea, viri-  
 diâque, bina semper modò hinc, modò illinc sarmenta  
 amplectentia, è quorum medio ala extenditur quatuor  
 aut sex foliorum contrario semper situ nascentium, que  
 in capreolos, quibus sese vicinis plantis implicat, desinit:  
 summa sarmenta in multos deinde ramos diuiduntur,  
 qui ex foliorum alis oblongos tenuésque pediculos pro-  
 munt, in quibus multi exigui, candicantesque flores spi-  
 catim congesti nascuntur, Ciceris sil. Matthioli (quod  
 passim in Pannonia & Austria inferioris pratis atquo  
 secundum sepes sponte nascitur) flosculis persimiles: qui-  
 bus excussis succedunt siliqua piso vulgari paulo graci-  
 liores, continentés grana Clymeni Matthioli sine La-  
 thyri Dodonei fructui paria, fusca, ingrati saporis, mea-  
 quidem palato, qui crudis pisces aut fabis minimè vesci  
 soleam: radix lignosa, nigricans, minimi digiti crassi-  
 tiem interdum aequat, & tenuibus fibris donata est,  
 perennis.



perennis, & singulis annis noua sarmenta longè sub terram ante quàm germinent sese occultentia proferens.

Primum m. hi conspecta est hæc planta ultra Drauum in Pannonia interamni (cuius pars nunc Windische land nuncupatur) iugis arcis Grebén vicinis anno 1579. copiosè inter saxa nascens: unde postea Ill. Dn. de Batthyán, qui me in eam prouinciã deduxerat, maturum fructum mihi adferri iussit, quem plerisque amicis cum in Belgica tum alibi communicavi. Subsequente deinde anno aliis locis Viennæ vicinioribus obseruari, uti in monte illo siluoso supra Gumpostkirchen, item supra Sopronium, & in Leytenberg. Floret Iunio, semen maturum est Iulio.

## DE OROBO PANNONICO.

## CAP. XXIX.

ERVI siue Orobi nomine à studiosis rei herbariæ appellantur aliquot plantæ per Pannonias, & Austriam, Styriamque nascentes, quas à nemine descriptas memini.

MULTOS habet Prior caules ab una radice prodeuntes, pedales aut ampliores, firmos, erectos, & angulosos, virides, in quibus hinc inde sparsa sunt oblonga & pennata folia, ex senis, octonis aut pluribus foliis mucronatis trineruiis, vni costæ adnatis, & sibi inuicem oppositis congesta: flores in surculis ex alarum sinu prodeuntibus spicati nascentes pisi aut vicia floris æmuli, colore purpureo elegantissimo, deinde ubi euanescere incipit, caruleo: quibus succedunt oblonga cylindrata siliquæ, nigra, in quibus rotundum semen interdum & exiguum, nonnunquam verò oblongiusculum, varium: radix viuax & perennis, longa, nigra, dura, per intervalla extuberans, fibrosa, & ex lateribus novos stolones singulis  
annis

I.  
Orob. pann.  
non. surp. 1.





annis producens. Tota planta calidiuscula est.

ALTERA tenuioribus et gracilioribus constat caulis, firmis tamen, cubitalibus, angulosisq; & in multas alas diuisis: folia alata sunt, hoc est, sena, octona, interdum dena uni costæ inherencia, superioribus longè minora, & Lenticula foliis haudquaquam maiora, tennella, viridiæque, gustu amaricante, calidiusculo: flores ex superioribus alis numerosi, oblongis pediculis inherentes, superioribus forma similes, minores tamē, purpurascente colore, qui vetustate in caruleum etiam commutatur: siliqua sunt oblongæ, nigrae, continentes oblongiora maioraque semina quàm superioris, & subfusca: radix dura, lignosa, fibrosa q; est, in diuersa tendens, viua, & singulis annis plures caules proferens.

Copiose nascuntur in silua montana Leytenberg supra Manderstorf, supra Medeling pariter, & omnibus illis montanis siluis serie quadam productis à Danubio ad alpes, variis item Pannonia locis.

Florent Aprili atque etiam Maio, semen autem proferunt Iunio.

GRACILES promit Tertia cauliculos, erectos, firmos, angulosos, pedales & cubitales: folia per intervalla uni costæ inherencia, quaterna plerumque sibi inuicem opposita, erecta, angusta, trium digitorum transuersorum longitudine, gustu aliquantulum acido, deinde amariusculo, nullis capreolis prædita, quod caules satis firmi, adminiculis non egeant: flores in longis pediculis spicatim coherentes, pisi aut vicia forma, colore candidos, senos aut octonos: deinde oblongas siliquas, nigricantes, priori similes, semine nigro, interdum etiam maculoso plenas, quæ per maturitatem cum strepitu dehiscentes semen abiciunt: radicibus nititur quinis aut senis minimi digiti longitudine, crassiusculis, Asphodeli aut

II.

Orobis pannon. purpurea. r. r. r.

III.

Orobis pannon. albus r. r. r. sive Asphodeli radice.





*Paonia* femina oblongis bulbis fere similibus; minoribus tamen, foris nigris, intus albis.

Inuenitur magna copia in pratis non procul *Walterstorf*, similiter in pratis *Maurpach*, *Medeling*, *Baden* vicinis, atq. etiam in nonnullis montosis ultra *Danubium* locis ad caduarum silvarum margines.

Floret cum superioribus, semenque perficit Iunio.

## IIII.

*Orobus* pan-  
non. albus II.

ALIQUOT *Quarta* ab una radice prodeunt caules cubitales, striati, recti, folia alternatim proferentes pennata, quaternis foliis satis amplis & mucronatis constantia, venis aliquot transversim à medio nervo excurrentibus, viridibus, gustu subacido quidem, sed postea acriusculo: flores ex alarum sinu brevi pediculo insidentes, quini aut seni antrorsum spectantes, vicia floribus similes, sed albo colore pradi, qui in binis foliolis sursum reflexis pallefcit, nullo odore: siliqua primo generi similes, in quibus semen nigricans, reliquis maius: radix minime vivax est, sed prolato fructu perire solet, ut in plerisque Leguminum generibus.

Rara est in *Austria*, nec nisi in alpidibus nascitur, unde delata & in hortum translata, altero anno flores protulit *Aprili* & *Mai*o, deinde semen. Anno vero 1579. mense *Mai*o maxima copia florentem inveni in ea *Pannonia* parte que ultra *Drauum* fl. est in monte quodam siluoso *Grebén* arcis vicino.

*Aphaca*:

PORRO Secundum genus in Belgicis hortis videre memini, & *Aphaca* nomine à rei herbaria studiosis nuncupari. Quartum ad phaseli silvestris aut vicia genus commodè referri posse existimo.

OROBII autem historia mihi in memoriam reuocat duas alias stirpes nobis cum in Belgica tum *Vienna* natas è femine hoc nomine primum *Venetis* misso, quoniam



quoniam à nemine adhuc descripta sunt, non incommo-  
dè hoc loco earum historiam subicere posse videor.

I.  
Orobis vene-  
tus purp. flor.

MVLTO ex eadem radice Prior fundit ramos pe-  
dales, angulosos, & ad singulas alas modò in hanc, nunc  
in alteram partem inflexos, humiliq; plerumque diffu-  
sos: folia in singulis alis quaterna aut sena unicastè in-  
herentia, bina semper ex aduersò sita, nullo extremo  
imparitatem faciente, Orobi pannonici primi foliis fere  
similia, sed minus atra: flores oblongis virgulis ex ala-  
rum cauis prodeuntibus inhaerentes, numerosos, in co-  
mam inflexos, pusillos, quatuor foliolis, uti reliquarum  
leguminacearum stirpium flores, constantes, hoc est su-  
periore latiore sursumq; reflexo & expanso, binis mino-  
ribus ad latera, quarto inferiore cauo & quodammodo  
carinato, colore purpureo: siliquas oblongas, mucrona-  
tas, vicia fere amulas, rotundiores, maturitate resces-  
centes, semen continentes orobaceum, oblongiusculum, aibi-  
cante colore: radicem duram, lignosam, multis fibris in  
diuersa tendentibus donatam, vinacem, & singulis an-  
nis numerosiores caules proferentem.

II. ALTERA solummodo differt foliorum & ramo-  
rum colore qui dilutius viret, & floribus qui toti sunt  
candidi.

Orobis vene-  
tus albo flore.

Florent mense Maio, cum eiusdè generis aliis plerisq;

CETERVM plurima alia stirpes ad Leguminum  
& similium classem pertinentes, sponte per Pannoniam,  
Austriam, & Styriam nascuntur, quarum licet ab  
aliis prodita sit historia, nomina tamen recensere non  
abs re visum est.

Crista Galli-  
nacea.  
Clymenum  
Matthioli.

Gramineis locis siccioribusq; pratis nascuntur Ono-  
brichis Dodonai, qua Brabatis vernacula lingua Cri-  
sta gallinacea cognominatur: Clymenum Matthioli, si-  
ne La-





Lathyrus  
Dod.  
Eruum Cordi  
Pseudoapios  
Dod.  
Anthillis le-  
guminosa.

ue Lathyrus Dodonai vel Eruum satiuū Cordi: Glan-  
des terrestres flore odorato purpureo, siue Pseudoapios  
Dodonai, alia ei congener flore luteo: atque Anthillis  
leguminosa Lobelij, cuius genus nobis aliquando Ferra-  
ria misit Alphonsus Pancius flore purpurascante.

Fœnum græc.  
fil. Tragi.  
Glycyrrhiza  
fil. Gesneri.  
Cicer fil.  
Matthioli.

In siluis, pratorum marginibus umbrosis, atq. etiam  
interdum in pratis apertis Fœnum græcum siluestre  
Tragi, siue Gesneri Glycyrrhiza siluestris: Cicer silue-  
stre Matthioli (quæadmodum superiore capite retuli)  
exiguo candicante flore, folliculis tumentibus, in quibus  
exiguum semen: & Galega vulgaris, quam nonnulli  
Rutam caprariam, Fracastorius Onobrichin appel-  
lant (quo etiam nomine eius semen nobis ex Hispaniis  
missum est, & nata planta) qua omnium copiosissime in-  
uenitur inter Muram & Drauum flumina, paulo su-  
pra eorum confluentes.

Galega.  
Ruta capraria.  
Onobrichis  
Fracast.

## DE VICIA SILVESTRI.

## CAP. XXX.

VARIA per Pannonias & Austriam inueniun-  
tur Vicia siluestris genera, aliis Provinciis etiam com-  
munia: duo tamen me obseruasse arbitror, qua alibi  
videre non memini.

- I. MULTOS ex eadem radice qua perennis est, pro-  
fert Primum ramos rotundos, striatos, pedales, & cubi-  
tales, quos ambiunt foliorum ala quemadmodum in Vi-  
cia vulgari satina & siluestri, sed magis hirsuta &  
& quasi incana, capreolis quibus se vicino gramini im-  
plicat extremam alam occupantibus: flores in superio-  
ribus foliorum alis terni plerumque, Vicia vulgaris flo-  
ribus persimiles, colore candido, superiore tamen folio ob-  
soleti coloris venis interius distincto, inferiore foliolo  
eiusdem coloris: siliquas planas (quantum videlicet ex  
illarum

Vicia fil. albo  
flore.



illarum rudimentis colligere licuit, nam Maio mense florentem anno 1579. duntaxat observavi) vicia vulgari similes: radix fibrosa est, tuberculisque, ut plerag, Leguminacearum stirpium, donata.

Nascitur in arvis desertis apud Chyztreg oppidum Mag<sup>i</sup> Dn. Bamfy in Pannonia situm, olim flores, nunc vero magna ex parte exustum, & ob continuas Turcorum in ea loca excursions omnino fere desertum, non procul à Kerka fluvio.

- II. CVBITALIBVS est Altera ramis, striatis, lentis, infirmis, & humi, nisi capreolis se sustinerent, procumbentibus, obliquè modò in hanc, modò in alteram partem secundum soliorum alas inflexis, è quibus frequentes plerumque ramuli enascuntur: foliorum ala oblonga, tennes, deorsum incurva, & in binos capreolos desinentes, duodenis, vicens, vicens senis, aut pluribus interdum oblongis angustisq, foliolis sursum erectis, & ex aduerso nunc aequaliter, nunc inaequaliter nascentibus præditæ: flosculi elegantes, superiori forma similes, minores, Onobrichidis quartæ flosculis propemodùm respondentes, coloris ex caruleo purpurascentis, vicem nonnunquam aut plures spicatim in oblongis nudis ramulis ex superiorum alarum sinu exeuntibus nascuntur: deinde uncialis longitudinis siliquula exiguum semen continentes: radix tenuis, latè serpens, & sub tellure se condēs, singulis annis novos frequentioresq, ramos proferēs.

Passim cum in agris, tum inter vepres illis se implicans crescit per Ungariam, Austriam, Moraviam, & Bohemiam: atque Maio floret.

VNGARI cum superiorem, tum hanc (quæ plurimum à Belgica vepribus se implicante differt) atq. denique omne silvestris vicia genus Waryw borso nuncupant, hoc est, cornicis pisum.

## DE SECURIDACA ALTERA.

## CAP. XXXI.

MULTOS atque oblongos ex eadem radice fundit  
 vimineos caules, humi diffusos, virides, striatos, intus  
 concavos, admodum ramosos: folia alata, è multis foliolis  
 coniugatum, & aequali, contrario tamen situ uni costæ  
 inhaerentibus constantia, solo extremo impari, Hedydari  
 legitimi folius perquam similia, sapore amaro: è singulis  
 superiorum foliorum alis oblongi pediculi prodeunt, co-  
 ronam leguminaceorum flosculorum alterius Hedydari  
 forma similia, graviterq; odoratorum sustinentes, co-  
 lore non luteo ut illi, sed vario: nam superiora folia car-  
 nei plerumque sunt coloris, laterum ala ninea, & cari-  
 na infima alba rostro est purpureo: siliqua non plana,  
 sed teretes, oblongæ, rostrata, internodiis distincte vel-  
 uti Polygala valentina siliqua, continentibus subrotundum  
 semen, oblongiusculum, sapore non minus amaro quam  
 alterius: radix non annua ut illius, sed maximè vivax  
 & fibrosa, longè lateq; sub terra se cõdens, & vicina loca  
 occupans, atque etiam tenuissimis fibris renascens.

Vulgatissima hæc est per universam Pannoniam,  
 Austriam, Styriam, Moraviam, atque Bohemiam,  
 cum in pratis, tum in agris, & secundum vias.

Floret Junio interdum etiam tota æstate, semen matu-  
 rum est Julio & Augusto.

Variat interdum floris colore, qui totus cãdidus est,  
 aut exalbescit, aut intensius purpurascit.

ALIQUANDO nobis in Belgicam missa fuit Ga-  
 lege alterius nomine, cum qua siliquarum duntaxat  
 affinitatem habet: mihi tota facie Hedyсарum referre  
 videtur, exceptis corniculis & semine, quæ, veluti dixi,  
 plana non sunt.

1.  
 Securidaca  
 altera panni.

Galega altera.





SED aptius forsitan *Hedysari* descriptioni conueniet ea planta cuius iconem & descriptionem cum aliis iam memoratis à C. V. Tho. Pennaeo accepi, quàmque *Securidacam* Dioscoridis esse censet.

11. **CVBITALIS**, inquit, planta est, aut altior, multos caules ramosos abs radice lignosa & perenni emittit: folia habet ciceris modo secundum oblongum neruum binatim disposita, vno impari extremitatem ipsius tenente, cicere minora: flores in summis caulibus glomeratim coherentes, ex candido rubentes: siliquas fuscis coloris, securis formam quam nos *bplhouch* vulgo appellamus probe referentes, vel cultri genus quo nostri & Belgici sutores uti solent: singula siliqua semen unicum eiusdem figura continet. [ex sicca tamen planta, quam etiam mihi communicauit, didici, siliquas nonnunquam longiores esse, & supra securim illam, alium articulum oblongiorem obtinere, qualem extremæ superioris siliquæ habent, quemadmodum in icone addi iussi.] Tota amara est, præsertim siliqua & semina.

Crescit in agro Genenensi non procul à Ponte tremulo, inter dumeta, nusquam alibi mihi inspecta.

ἡδύσαρον  
ἢ τελεχίως.

Ἠδύσαρον ἢ τελεχίως Græcis, *Hedysarum* & *Securidaca* Latinis dici possunt hæc planta. Nullius tamen semen aptius veterum securim meo iudicio refert, quàm eius quæ ab omnibus *Hedysarum* legitimum censetur: etenim in Hispanica mea peregrinatione secures infra Madritium videre memini, quæ huic semini essent simillima, nempe in medio quæ manubrium traicitur & adaptatur, crassiores, & utrinque in planam aciem desinentes.

DE ONO-

## DE ONOBRICHIDE.

## CAP. XXV.

AD Onobrichidis classem adduci posse existimo eas stirpes quas hoc capite describemus, quoniam illi quodammodo affines esse videntur.

CVBITALES plerumq. Prior habet caules, multos (si vetusta sit planta) rotundos, duros, humi procumbentes, in quibus frequentia folia lenti similia, angusta, hirsuta, quindena subinde, & totidem alia ex aduerso uni costâ adharêtia, uno impari extremam alam occupante. gustu amaro & ingrato: ex alarum cauis ramuli exoriuntur similibus foliis septi, ex quibus dodrantes pediculi exeunt, striati, ferentes multos flores trifolij amulos, oblongos, eleganti purpura nitentes, inodoros, confertos, & veluti spicam trium interdum uncularum longitudinem aquantem efficientes, interdum etiam longiorē, præsertim quando in semen abeunt, quod bifidis breuibz turgidiusculisq; siliquis cōtinetur exiguum, nigrum, durum, sapore ingrato ut alia legumina: radix illi magna, longa, dura, intransuersas nonnullas fibras sese spargens, & subinde ad cauliculorum exortus novas fibras agens, viuax & perennis.

I.

Onobrichia  
purp. flore.

Frequens nascitur ad Danubij ripas supra Posoniū arido solo, apud Petronellā ad viarum margines, & frequentissime toto itinere versus Badenses thermas, multisque aliis circa urbē Viennam locis tam citra Danubium, quàm ultra. Floret Maio, Iunio & Iulio, atque etiam Augusto interdum, quo tempore etiam semen profert.

MULTOS ex eadem radice profert Altera vimi-


II.

neos cauliculos, pedales, nonnunquam etiam longiores, striatos, humi filfos, crebris nodis distinctos, et in his alata flore.

ta fo-







BB

ta folia, hoc est, tredecim, quindecim, septem & decena angustis & oblongis foliolis uni costula inhaerentibus constantia, extremo semper imparem numerum faciente: prodeunt deinde ex alis tenues pediculi flosculos in spicam congestos ferentes Pisi aut Vicia florum forma, sed longè minores, colore dilutè caruleo aut ex caruleo purpurascēte: his succedunt exigua siliqua, quasi duplicata, continentes pusillū semen renis forma, nigro colore: radix minimi digiti crassitiem fere aequat, dura, lignosa, & contorta, alte sub terra se condens, rarisque fibris donata, quæ suprema parte in aliquot capita extuberat, è quibus singulis annis novos cauliculos fundit.

Rara est, nam paucas dūtaxat plantas inueni publica via secundum orbitas, inter Schwecket & Gotzestorf Junio florentes anno 1580. & anno 1579. non procul à Znaim Moravia oppido.

Floret etiam in hortos translata toto Iulio, & subinde semen profert.

## III.

Onobrichis  
pallido flore.

SESQVIBITALIBVS assurgit Tertia ramis, rectis, firmis, duris, viridibus; in quibus folia Lentis siue Vicia filuestris, oblonga, angusta, duodena aut quindena, & totidem ex aduerso, inter se opposita, unig, costæ adhaerentia, vno etiam quod extrema costæ insidet impari, hirsuta, gustu ingrato & amaro, deinde nonnihil acri: ramuli extremo caule ex alarum sinu prodeuntes, palmares, striati, in dodrantes spicas flosculorum trifolij amulorū, oblongiusculorum, pallidorum desinunt, quibus impressi sunt nigricātes quidam radij: his succedunt siliquæ prioris similes, mucronata, duobus valgulis constantes, in quibus semen scenograco fere simile, sed minus & nigrum: radix crassa, dura, lignosa, longa, aliquot fibris donata, candicans, perennis.

Rara etiam admodum hac est, & duobus locis dūtaxat

taxat mihi conspecta, videlicet ad Hamburgum urbem duobus supra 'Posonium miliaribus, & ad oppidum Fischmuntz nō procul Danubio publica via, unde singulas singulis locis plantas duntaxat erui florētes Maio mense 1574. & 1576. In hortū trāslata Maio etiam florent atque tota deinceps fere astate: Augusto semen, sed rarissimè profert, deciduis magna ex parte floribus, ante quā in siliquas efformentur, nimia, uti coniicio, soli pinguedine & humiditate luxuriante planta.

QUARTA multa folia promit ab eadem radice, Lenticula aut Tragacantha proxima, & uni similiter costae inherētia, molliora tamen, viridia quidem illa, sed lanugine quadam albicante pubescentia, lento primum gustu, deinde nonnihil amaricante, postremò linguam vellicante: nascuntur inter foliorum alas cauliculi fere dodrantes, supini, exiles, hirsuti, aliquot flosculis onusti, viciae silvestris aut lenticulae magnitudine, colore ex caruleo purpurascēte, quos excipiunt siliquae exiguae geminis cellulis cōstantes, semine (quod cum adhuc immaturum esset probè observare non potui) plena: multas ex eadem radice, quae longa crassiusculaque est, & obliquas fibras agit, propagines & ramulos dodrantes humi fusos in latera emittens.

Crescit in summo Sneberg iugo, atque in summi Erscheri scopulis, quibus duobus locis florentem & siliquas iam efformantem erui Augusto.

NEC minus forsitan rara erit, quā Britannica anni v. 1581. peregrinatione, Londini in doctiss. viri Ioannis Richai pharmacopœi regij horto nascentem vidi, ad descriptorum hoc capite stirpium classē proculdubio referenda, cum proximè ad quartum genus accedat.

Etenim similima habet folia, mollia, incana lanugine pubescentia, ut Tragacantha, & similiter uni costae in-

IIII.

Onobrichia  
montana.Onobrichia  
peregrina.





herentia, quindena & plura, interdum etiam vicena quina, vno extremam costam occupante: calliculi tamen in hac oblongiores sunt, fusco cortice tecti, lenti, fractu contumaces, humi fusi, & plerumque nudi, qui extrema parte frequentes ramulos suis alatis foliis onustos proferunt, & in unciali hirtog, pediculo multos flosculos in caput & globum congestos, tragacantha floribus proximos, candicantes, deinde membraneas siliquulas eruo minores, & Dorycnio vulgariter nuncupato siue Hispanico pares, singula semina fenograco similia continent. Florebat Julio & Augusti initio: semen deinde Londino mihi missum est, quod terra commissum nondum natum est.

A nemine haecenus descriptas existimo has stirpes: nec etiam nomen vulgare ullum, aut earum facultates à rusticis vel ab alio quopiam intelligere potui.

Si quis verò nō inter Onobrichides, sed inter Astragalos praesertim duo postrema genera, cum quibus magnam habent similitudinem, referre malit, Astragali sunt, prior alpinus, alter peregrinus.

## DE MEDICA LUTEO FLORE.

### CAP. XXXIII.

Medica luteo  
flore.

MULTOS ex eadem radice profert ramos cubitales, aut longiores, humi plerumque fufos, teretes, vimineos, multis alis brachiatos, folia terna vni pediculo inhaerentia, alterius Medica foliis respondentia, & dorso eminente, sed longè minorā: flores in extremis ramulis confertos, alterius floribus pares, luteo colore, non inodorous, cornicula deinde plana, contorta, angustiora quàm in satina & vera, grana illi similia continentia, sed paulo minora: radicem alteri parem, crassiusculam, lae sparsam, fibrosam, perennē, & singulis annis novos caules proferentem.

Nasci-





*Nascitur tota Pannonia, Austria, Moravia, & Bohemia, Norici, Franconiaq; quibusdam locis. Floret Junio & Julio.*

## DE TRIFOLIO MAIORE.

## CAP. XXXIIII.

TRIFOLII maioris tria genera, spica forma, & floris colore inter se differentia passim in Pannonia & vicinis prouinciis obseruantur.

Trifolium  
maius albo  
flore.

- I. PRIMVM ternis aut quaternis interdum assurgit cauliculis, pedalibus, firmis, rectis, teretibus, circa quos rara folia, oblonga, angusta, dura, nervosa, carinata, & dorso elatiore atque eminentiore, trina semper ab vno exortu prodeuntia vt in reliquis trifoliis, incana, & in ambitu veluti dentata, ab radice frequentiora & maiora: flores extremis ramulis, in quos cauliculi separantur, parui, frequentes, conferti, & spicam quodammodo efformantes, albo colore, aliquantulum odorati: radix viuax, minimi digiti crassitudine, nigricante & densa cortice tecta, longa, aliquot fibris donata.

Trifolium  
maius purp.  
flore.

- II. ILLI non multum dissimile est Alterum genus cum amplitudine tum forma: folia tamen paulo angustiora deprehenduntur, & crassior flosculorum qui confertim nascuntur spica, eaque summo cauli inhaerens sine pediculo, & quasi inter folia latens, cui plerumque adnascitur alia breuior, rarissime tertia: flosculi vero differunt colore, qui non albus est, sed ruber, nullo insuper odore praediti sunt: radix priori non dissimilis.

Trifolium  
maius purp.  
flore.

- III. MAIORE multo excrescit Tertium altitudine, quae plerumque cubitalis est, caules etiam habet crassiores, folia ex singulis geniculis alternatim prodeuntia, longa, striataque, & dorso eminentiore, laxa quadam veluti vagina in binas appendices desinente caulem amplectentia, de-





tia, deinde terna numero ex eodem pediculo nascentia, superioribus duplo longiora, illis tamen non minus dura & per oras denticulata, gustu nonnihil adstringente: huic spica multo oblongior, elegantissima, rubrorum flosculorum è calyculis hirsutis emergentium serie composita: radix superioribus similis, perennis & singulis annis plures caules proferens.

Inveniuntur non modò in Hamburgensi monte, sed aliis etiam Pannonia & Austria montibus alpestribusque pratis & silvis copiosè. Priora etiam duo genera scioribus pratis Vienna vicinis, tum pariter in Moravia & Bohemia. Florent Maio & Iunio.

TRAGVS Tertium genus Grosseer Geycklee / & Cytisus Trag.  
Cytisum appellavit, Lobelius alterum Lagopum nuncupasse videtur. Quem verò Lagopum maximum vocat, Belgica primum innotuit 1570. C. V. Alphonsi Lagopus max. Lobel.  
Pancij munere, qui eius semen nobis dum Machlinia videremus, misit. Annua verò duntaxat est ea planta, proinde singulis annis serenda. Vngari vulgare Trifolium Lo here appellant.

TRIFOLII porro genus illud teretibus viticulis humi sparsis, flore pisi pallido satis magno, foliis tribus uni pediculo inherentibus, & molli lanugine pubescentibus, & rarius per viticulas sparsis, quod à siliquarum magnitudine Mompelliani meo tempore Lotum pratensem siliquosum cognominabant, maximè frequens est in omnibus Pannonia & Austria pratis: sed Narbonensi paulo durius videtur. Lotus Gili- quosus luteo flore.

Illius genus mollius multo et tenerius vidi anno 1579. Noriberga in horto Oellingeri pharmacopœi & aromatarij, quod rubro flore erat: ipse pisum rubrum nuncupabat. Lotus sili- quosus rubro flore.

Crescebat etiam in eodem horto trifolium quoddam  
satis





*satis amplis foliis pro planta exiguitate, quod à magnis & membraneis vesiculis, quibus semen cum sua exigua siliqua continetur, vesicarium dixerunt etiam Mompellij ubi in collibus quibusdam nudis & petrosis cum Hyacintho autumnali aliquoties ertere memini.*

Trifolium  
vesicansum.

Trifolium  
nobile.  
Trifolium  
aureum.  
Hepatica trifolia.  
Eius varietas.

CETERVM, quoniam in Trifoliorũ historia versamur, obiter etiam hìc meminisse libuit Planta illius quam nonnulli Trifolium nobile, vel Trifolium aureum (Germanis enim Gulden klee dicitur) & Hepaticam trifoliam appellant.

Eam flore vel caruleo, vel ad violaceum tendente alunt Belgica horti: alunt & flore rubello & albo munere Alphonsi Pancij Ferrariensis medici, qui eam nobis primum misit Machliniam, atque etiam πολύανθον caruleo flore bis aut ter, sed qua nunquam comprehendere voluit.

Omnes autem prater polyanthon Viennensi agro inuenire licet. Nam Viennensis saltus & caruleam precocem, & eam que florem ad purpuram tendentem habet paulo serius florentem alit, tum etiam flore incarnato siue rubello & albo ubi aliquot eius plantas erui 1579. albam etiam prius apud Garmingam. Priores verò due non modò Viennensi agro, sed in omnibus Pannonia & Austria inferioris siluis abundanter proueniunt: que autem rubello est flore apud Nissam Silesie, & Ienam Thuringia etiam sponte nasci ab amicis accepi: at que albo est flore apud Sabaudos superato monte Senis iter in Galliam facientibus non procul à pago Lunenburg frequentissimam nasci mihi retulit D. Balthasar à Nerden Medicus.







# PAVCA QVÆDAM

CIRCA NONNVLLAS

PLANTAS AB IPSO AVCTORE OBSERVATA, dum eius Stirpium historia iam typis exprimeretur: quæ quoniam suis locis inferi non potuerunt, ad operis calcem reiecimus.

LIB. I.

ad finem cap. 1. pag. 5.

**C**VM *Laurocerasum* florentem, quando *Pannonicas* meas *Observationes* excudendas *Plantino* tradidi, nondum conspexissem: nulla *florum* mentio in eius historia facta est. At cum huius anni octogesi tertij supra millesimum & quingentesimum, mense Maio egregiè floruerit *D. Aicholtzio*, qui eius unicum fruticem in fictili alit; illius iconem atque descriptionem ad *Observationum* calcem adiicere, & *Lectoris* oculis spectandam proponere libuit.

*OBLONGAS* in summis vetustis ramis inter superioris anni folia fert hastulas digitalis longitudinis, crassiusculas, in quibus breui pediculo numerosi, & racemi in modum conferti, nascuntur flores, candidi, quinque foliolis constantes, multis in umbilici ambitu staminulis præditi, *Cerasianum* floribus non admodum dissimiles, odoris expertes, qui nullum fructus rudimentum præbuerunt, sed caduci admodum fuerunt. Supra hos deinde rami germinant, & nouella folia protrudunt.

*Laurocerasus*  
flor.

Ad finem historię *Euonymi*. 1. cap. 26. pag. 96.

**S**ED & hic *Euonymi* *pannonici* prioris iconem cum suo flore exhibere volumus: cuius, uti in eius historia

*Euonymi* fl.  
flor.

Laurocerasi flos.



Euonymus 1, siue laurofol. eum suo fructu.



Euonymi 1.  
fructus.

diximus, binas plantas adhuc alit D. Aicholzius. Harum etenim altera hoc anno 1583. mense Maio oblongos tenuésque inter infima folia pediculos protulit, è quibus aliquot dependebant flosculi, quatuor foliolis albicantibus, & ad carneum quodammodo colorem tendentibus, præditi, forma vulgaris Euonymi floribus persimiles: quibus successit fructus, ut in vulgari, quadrangulus, aut interdum quinque angulis constans, maior tamen, atque quodammodo alatus, maturitate dehiscens, & alba grana, aurea pulpa inclusa, Augusto mense continens.

## LIB. II.

ad calcem cap. 2. pag. 133.

CUM porro hac planta anno 1583. non modò egregiè floruerit Generosò Dn. Vlricho de Khunigspurg, qui superiore anno ingentem illius bulbum cum plerisque aliis elegantibus stirpibus acceperat: sed & semen ad frugem perduxerit, operæ precium duxi illius hoc loco meminisse.

Lilij fusiani  
semen.

Habet verò flores quales in ipsius historia descripsi, in quibus tamen nullum tetrum odorem deprehendi: deinde subsequuta sunt sexangula capita, Tusai capitibus fere similia, sed minora & breviora, semine Tusai etiam simili, paululum tamen breviora, plena.

Floret autem, atque illius semen maturitatem consequitur, eodem ferme quo Tusai tempore.

Cap. 3. pag. 136.

ante articulum Videtur autem &c.

Pictura etiam illa quam Rassinus donavit, viginti aut plures flores extimo caule prodeuntes expressos habet.

Sed

Sed & hoc anno 1583. Magnificus ac Generosus Dn. de Entzestorf bulbum inter reliquos habuit, qui extimo caule eoque unciam lato tredecim flores saturatius rubentes (etenim inter hos flores alij aliis dilutiores sunt) & aspectu elegantissimos protulit, cum precedente anno quinque duntaxat tulisset. Floribus autem succedunt capita, iis qua in Lilio siluestri sine montano nascuntur plurimum respondentia, atque eiusmodi semen paleaceum continentia, quod sero admodum maturefcit, videlicet sub Augusti finem.

Lil. robrum  
polyanthum.

Cap. 6. pag. 166. ante articulū Non omnes porro &c.

SILENTIO autem minimè premenda existimaui, qua plenius cum à me, tum ab aliis (dum nostra Stirpium historia exprimeretur) de hoc flore observata sunt. Annis enim septuagesimo quinto & septuagesimo sexto supra millesimum & quingentesimum, magnam seminum è Tulipis congeriem terra mandavi, qua triennio ante ipsa bruma Byzantio ad Jll. Dn. Augerium de Bousbeque cum plerisque bulbaceis stirpibus perlata fuere. ex his ingens Tuliparum numerus prognatus est, quarum nonnulla quinto, sexto, atque etiam sequentibus annis flores tulerunt insigni colorum varietate commendabiles. Nam & omnino flavos, & rubros, & nigeos, & purpureos, vel ex his coloribus inter se cōmixtis distinctos, hoc est L-V. R-V. A-V. P-V. nactus sum, eosque omnes pracoces. Sed inter illos etiam fuerunt, qui mihi diligentius observanti, potius ad Dubiarum vel Serotinarum Tuliparum classem referendi videntur, quàm Pracocium: etenim licet aequalicum Pracocibus magnitudine assurgant, eodem tamen tempore cum Dubiis sine Serotinis florere animadverti, tametsi Pracoci-

Tuliparum  
Constantin.  
sem. natarum  
in signis varie-  
tas.

bis interfuerim, *Praecoces*, ob colorum varietatem (quam in *Serotinis* nondum deprehenderam) esse existimans. Haftenus enim *Serotina*, cum quae rubri, tum quae flauis coloris flore praedita sunt, nullam mihi varietatem in satiatione pepererunt, nisi quod interdum ex rubrarum semine flaua, et contra ex flauarum semine rubra natae sint, unguibus saepenumero variantibus.

Tulipae serotinae veriores Constant. sem. natae.

1. Dubiae vero siue *Serotina* Constantinopolitano semine nata, aut colore albo exoleto, qui &  $\chi\rho\sigma\iota\epsilon\nu\alpha$  dici queat, sunt, qualem superire anno unicam habui, foliis nimirum ex albo pallescentibus, eorumque dorso flauescentes: illius autem interiora folia orbiculata sunt, ungues & stamina pallent. Eadem hoc anno 1583. longe ampliorem florem tulit, attamen colorem non immutauit.
2. Aut a-v. praecocis octavae flori omnino similes, vel usdem quidem coloribus praeditae, sed qui modo intensiores, modo dilutiores inter se commisceantur, eaque aut omnia folia mucronata, aut interiora nonnihil orbiculata habent, oris ipsorum candicantibus, & unguibus omnino exalbidis, qui nonnunquam etiam subcaerulea macula insignantur, staminibus vel exolete purpurascantibus, vel nigricantibus.
3. Aut Purpurei coloris, nunc dilutioris & magis floridi, nunc saturatoris, cui tamē quaedam albicantes venae intermixtae videantur, vel purpurearum uvarum iam maturiscentium colorem referunt.
4. Aut v-v, florum foliis dilutiore aut saturatiore purpureo colore praeditis, quorum vel omnium ora mucronata, vel interiorum duntaxat orbiculatae, exalbidae sunt, ungues vel nuci, vel subcaeruleo colore interdum infecti, staminibus nigricantibus.

T. f. versicolor. res R. V. semine natae.

Semine autem cuiusdam v-v, quae anno 1577. primū Bruxellae floruit, nactus est C. V. Ioannes Boissot, & quaedam nobiles Matronae etiam serotinas Tulipum mira

# APPENDIX.

pas mira colorum varietate ludentes. Nam & flavae,  
& pallentes, & ex albo pallescentes, & purpurascetes,  
& intensius vel remissius rubentes, vel later. cij coloris,  
atque alias aliis (ut ipse ad me scripsit) coloribus insi-  
gnitas habuerunt. Ego sanè, cui ex eodem semine anno  
1578. ab ipso communicato, atque hic Vienna sequente  
Autumno terra à me credito aliquot nata sunt, unicam  
hoc anno florentem habui, quae purpurei coloris exoleci  
fuit, foliorum oris albicantibus, & unguibus albis, non  
multum ab similem nonnullis P-V. quae Constantinopoli-  
tano semine superius memorato nata sunt.

ad calcem 8. cap. pag. 179.

EODEM porro Byzantio missi fuere anno 1582.  
Narcissi bulbi Zerincada catamer bianco nomine,  
quorum nonnulli hoc anno mense Maio binos aut tres  
protulerunt flores nuncos suauiter odoratos, extremo  
caule nudo, ut in aliis Narcissis, ex folliculo prodcentes  
sed minores, medio etiam calyce nuceo: folia cum iis quo-  
rum pallidus est flos conueniunt, atque polyphylli foliis  
angustiora sunt.

Narcissus By-  
zantin. totas  
niveas.

ad calcem cap. 15. pag. 197.

CETERVM, quod silentio minimè premendum dis-  
xi, Generosus Dn. de Entzestorf, semine à me communi-  
cato natus est Hyacinthi bulbis, qui Aprili mense an-  
nis 1582. & 1583. nuncos omnino flores protulit, alio-  
qui forma & odore aliis orientalibus similes.

Hyacinthus  
niveus.

ad cap. 55. calcem pag. 401.

DE Hachal Indi, siue Admirabilis Peruanae ra-  
dicibus superiore hieme periculum feci, & rem ita se ha-  
bere,

Admirabile  
radix peron-  
nia.



bere, ut Volmarinus admonuerat, deprehendi. Nam omnium trium radices hieme in æstuarium intuli, partim suis fictilibus in quibus sata fuerāt, adhuc inhaerentes, partim ex horto erutas, atque in uno aut altero fictili repositas & sicca terra obrutas, totāque hieme nullo humore aspersas conseruari. Sed cūm Februario mēse solidas eas inuenirem, atque nonnullas etiam germinas iam protrudentes conspicerem, leuiter interdum aqua conspersi, donec Aprilis initio in hortum transferrem.

Trium porro generum semina (nam bina postremi generis grana anno 1581. collecta, è superiore 82. adhuc reliqua habebam) ineunte vere seorsim terra mandauī: nataque sunt mihi planta suam speciem conseruantes. Verūm quæ ex radice repullularunt, multo citius adolenerunt, multoque ampliores facta, quàm quæ semine hoc anno nata sunt, & aliquanto etiam maturius flores protulerunt, minores tamen, quàm semine hoc anno nata, inter quas nonnulla flauos omnino, nec ullo alio colore conspersos habent: ea florum, qui in varia stirpe toti flauī fuerunt, semine nata haud dubiè sunt, ut secundum genus ex rubrorum purpurascensium semine. Itaque huius Admirabilis stirpis plura tandem genera nascitura credendum est.

Admirabilis  
flauo flore.

## LIB. III.

Cap. 13. pag. 478. ante articulum, Flores.

& frequentissimè ultra Posonium itinere Tirnaniensi.

# APPENDIX.

Cap. 21. pag. 502. secundus articulus immutandus, & tertius alius addendus, vti qui nunc tertius est, quartus sit, mutatis quibusdam vocabulis, hoc modo.

ALIVD autem genus observavi, quod licet foliis rotundaque fere reliqua facie cum vulgari conveniat: floribus tamen plurimum ab ea differt, quippe qui amplius admodum sint, *Alcea* floribus etiam maiores, colore tamen illi vel respondententes vel fere omnino candicantes, quibus semen vulgari simile calyculis inclusum succedit.

II.  
Althææ varietas.

TERTIUM genus est, ab illo forma minimè differens, nisi quod illius floribus minores flores hoc obtineat, & vulgari aliquantulum maiores.

III.

VERVM reperire est Quartum quoque genus &c. II II.

# MENDÆ NONNVLLÆ QVÆ

irreperunt, sic corrigendæ.

*Primus numerus paginam, alter verſum denotat.*

In Epistola ad Lectorem pag. 4.

verſ. 4. N V N C

verſ. 14. millesim. & quingentesim.

pag. 6. verſ. 6. CLVSI nō CLVSI.

pag. 5. margine Casta. equinæ.

23 22 vitu rad

28 è tuberculis

30 1. interdum

9. iuniperinis

65 marg. Chamæxistis

98 in titulo Cocconeia.

101 2. Hemdl

5. keto fix appellant.

107. in marg. Sp. inf altera.

136. 2. luto 23. flo.

142. 24. è Bel.

154. 21. odorus.

162. 32. exortum,

166. 20. palmæ m

174. in tit. Narcif. alter p. f.

181. 25. extremitates

188. 27. hortu

211. 31. humi P.

216. 3. retunda, can

223. 27. difficile est.

245. 1. iuriam peregrinationem

13. locum

245. 33. radices

255. 17. Augusto

262. in titulo Picudo Asphodelus

280. 1. nostru hortu p.

26. oblongas fibræ eiusd.

282. 26. miribus araneis

284. 17. aliquot oblongas l.

286. 17. pure

288. 2. himmelftengel

290. 9. nomine daf.

310. 17. frata

367. 27. sustinere

382. 5. oblongiori

391. 18. Quod si autem

395. 11. sex ta

397. 28. excidens

409. 15. autem Na.

428. figura sunt transposita

429.

432. 6. Sackturnja

30. addit

446. 7. alteroque

480. 31. COIV

516. 25. Sebizio

537. 9. rotundus,

540. in titulo Scabiosa V.

549. 15. ante A mulierum adde

Anno tamen 1582. sub Kiezey &

Hamburgensi monte, atque etiam

non procul Turnavia frequentissimam

obseruavi, eaque de causa, Panno-

nica cognominari etiam poterit.

553 hæc Absinthij figura esse debebat

pag. 556 sub eo qui istius est titulo.

559. poni debet figura qua est pag.

sequente cum titulo Absinthium

Austriac. c. nu: folium.

570. titulo V. n. legitimum.

582. Hormini 11. tertia species esse

debebat pag. 581.

596. expungenda figura.

612. 12. alterutram.

617. 13. Engleborob.

671. Pulmonarie 111. titulus &


figura expungenda.

709. in tit. Alektorolphi 111. al-

terum genus.

Conyza 111. Pannonica.

Pag. 519.  
addenda  
hæc figura.



Parthenium polyphylo flore.

Pag. 56r.  
hæc figura  
desidera-  
tur.



Pag. 371.  
hæc figura  
substituenda.





Pag. 738.  
in figura  
erratū est,  
pro qua  
hæc suffi-  
cienda.







# INDEX PRIOR

## STIRPIVM QVÆ

### IN HOC LIBRO

#### CONTINENTVR.



BLES cruciata

19. mascula ibi-

dē. femina ibid.

Abſinthium, &

eius species 552. & seq.

Acer 8.

Acinos Anglic. 625.

Fuchſij 624.

Aconiti Lycoſtoni varia ge-

nera 403. & seq.

Acorum 257.

Aculeata. 53.

Admirabilis peruana 395.

eius varia genera ibidem

& seq. cuiusdem facultates.

401.

Adonidis flos. 391.

Aegyptiacus Phaſcolus 731.

αἰγύλιος 10.

Aiuga Auſtriaca. 631.

Alchimilla 442.

Alectorolophus alpinus 707.

& eius varietas ibid. & seq.

Alisma Matthioli 525.

Allium 211.

Narciſſinis foliis 220.

Allium alpinum 225. angui-

nū ibid. vſinum ibidem

Alopecuros Theophr. &

Plinij 603.

Althæa Pannonica, & eius

ſpecies 502.

Alum Plinij 223.

Alyſum minimum 472.

Amarella Geſneri 314.

Amellus alpinus 534.

Anagallis flore luteo 492.

Anchuſa flore exalbido 677.

Androsace altera Matthioli

474.

Anemone ſilueſtr. 380. An.

montana Pulſatilla folio.

382. Anem. 3. Matthioli

384. Anemone vulgaris

varij generis 385. Byzan-

tina flore polyphylio &

pleno 385. eius varia ge-

nera. 388. & seq.

Anonis non ſpinola 53.

ἀνώνυμο prior 42. altera 57.

Anonymos lini folio 312.

Anthillis leguminola 744.

Aphaca 740.

Apiaria peregrina 70.

Archangelica 694.

Argenteus color 159.

ἀργυρόχρως 496.

Asa Theophrasti 8.

Armerius pleno flore 327.

Artemiſia tenuifolia, & eius

varia genera 539. & seq.

Asperugo 686.

Asperula odorata ibidem.

Aster Atticus Ital. 534.

DD

Aster

# INDEX.

After Pannon. & eius species	Cassa vrbs	169.
516. & seq.	Calamētum inodorum	614.
Aucuparia sorbus	Calceoli virginis	273.
Auellana pumila byzantina	Cameli collum siue caput	179.
121.		
Auium oculi	Cāpanula minor alpina	683.
Auricula vrſi	eius varietas	ibidem.
species	Canales ex larice miræ lon-	
	gitudinis	24.
B.	Cantabrica Plinij	316.
	Capraria arbor	97.
Bacca nodosa	Cardamine alpina	454. eius
Balsamum alpinum	varia genera	ibidē & seq.
Barbaprina	Carduus mollis & eius spe-	
Bellis cærulea	cies	661. & seq.
Bellis media	Carlina maior	667. minor
Berberis	ibidem.	
Betonica, & eius species	Carum	701.
& seq.	Caryophyllata montana, &	
Bilingua	eius species	433. & seq.
Bistorta minor	Caryophyllei	316. & seq.
Bistorta vulgaris	Castanea equina	5.
Bugula, & eius species	Cattaria minor Hiſp. semin.	
Bulbus filueſt. Fuchſij	nata	588.
Bulb. eriophorus	Cepa serpentina	197.
vomitarius	Ceraſus auium	93. laurea 5.
Bulbi varij à Francisco de	Macedonica	93. racemosa
Ho'beque in Belgium miſ-	ibid. Trapezuntina	5.
ſi	Cerrus	9. & 10.
Buphthalmū Dodonæi	Ceruaria alba	694. nigra ibid.
Buphth. vulgare	Chamæbatus	χαμῆβας 115.
Butyri radix	Chamæceraſus	χαμῆκῆραſος
		89. & 91.
C.	Chamæciſtus	59. & seq.
Cacalia, & eius species	Chamædryſ & eius variet	ſpec-
499. & seq.	cies	610. & seq.
Cacaliæ congener planta	Chamægeniſta	494.
501.	Chamaïridum	varia genera
Cæſar inter herbas aut Re-	250. & seq.	
gulus	Chamaelinum	306.
	Chamæmeſpilus Gefneri	83.
	Chamæ-	



E.

**E**Chium, & eius species 679. & seq.  
 ἐλάτη ἀρρίω 19.  
 ἐλάτη θήληα 21.  
 Elleborine vulgaris varij generis 274.  
 Elleborus albus duorum generum 277.  
 ἐρείκη 35.  
 Erica 28. & 35. & seq.  
 ἐριόφορος 200.  
 Eruum sativum Cordi 744.  
 Eryngium Pannon. & eius species 668. & seq.  
 Eryngium planum Matthioli 670.  
 εὐώνυμος 92.  
 Euonymus 94.  
 Euonymus vulgaris 97.

F.

**F**ilipendula vulgaris 710.  
 Filix pumila saxatilis, & eius varietas 705.  
 Fistularia 710.  
 Flammula Matthioli 296.  
 Flos Februarij candidus 185.  
 luteus ibid.  
 Flos tinctorius 53.  
 Flores Indici versicolores 401.  
 Fœnū Græc. sil. Tragi 744.  
 Fraxinella 54.  
 Fritillaria 169. & seq.

G.

**G**alega 744.  
 Galega altera 747.

Galeopsis maxim Pannon.

590.

Gazaria peninsula 169.  
 Genista sagittalis 51.  
 terrestris ibidem.  
 Genistella spinosa 51.  
 Gentiana, eiusque variaz species 277. & seq.  
 Gentiana punctata Pennzi 221.  
 Gentianæ fugaces siue annuæ 288.  
 Gentianella verna maior 284.  
 minor. 287.  
 S. Georgij flos. 226.  
 Geranium montanum, & eius varia genera. 415. & seq.  
 Geum aquaticum Gesneri 437.  
 Gladiolus. 226.  
 Globularia. 543.  
 Glycyrrhiza sil. Gesneri. 744.  
 Gnaphalium alpinum. 494.  
 americanum. 496.  
 Gramen marinum 327.  
 Gramen montanū spicatum & eius species 716. & seq.

H.

**H** Acha Indica 395. & 401.  
 Hedyсарum, ἡδύσαρος 750.  
 Hemerocallis Diosc. 127.  
 Hemerocallis Valentina Hispanis Amores mios. 194.  
 Hepatica trifolia, & eius varietas 765. & 766.  
 Herba cerui 613.  
 Herba paralyfis 339. & 343.  
 Herniaria. 182.

Hesperis

# INDEX.

Hesperis 333. cur sic nuncu- pata ibid. eius variæ species ibidem & seq.	Lagopus alter Lobelij, & max. eiusdem. 763
Hiemale viride. 35	Lamjum Paon. & eius spe- cies 593. & seq.
Hieracium Pannon. & eius species 640. & seq.	Lapathum rotundifolium. 480.
Hippoglossum Dioscoridis 270.	Larix. 21
Horminum silvestre, & eius variæ species 576. & seq.	Larix Plinij est πύκη Theop. 23.
Humirubus. 115	Larici folia hieme decidunt. 23.
Hyacinthus candidus. 188	ex Larice canales miræ longi- tudinis. 24
obsoletior Hispanicus. 193	Lathyrus Dodon. 744
orientalis Hisp. 194	Laurus Alexandrina Mar- thioli 269
Hyacinthus comosus Byzan- tinus 194. & 197.	Laurocerasus 1. & 4
Hyacinthus primus Mat- thioli. 196.	Leblab siue Leplap. 731
Hyac. botryodes 204.	& 732
comosus minor ibid.	Ledum Silesiacum. 68
Hyacinthus stellaris. 209	eius faculrates. 71
Hyosciris Plinij. 546	Ledum Alpinum. 73
Hyoscyamus peregrinus. 502	Legumina 721. & seq.
	Leporis caryophyllea herba 332.
<b>L.</b>	Leucâthemum alpinum. 563
<b>I</b> Acea Austriaca, & eius spe- cies 542. & seq.	Leucâthemum Plinij Angui- laræ ibid.
Iacobæa Pannon. & eius spe- cies 572. & seq.	Leucojum bulbosum Panno- nicum 179. & seq.
Iasminum Indicum siue Mexicanum. 41	Leuc. montanum 463
<b>Ilex</b> 12	Leucojum silvestre 337
Iridum varietas maxima. 242 & seq.	Liliaceæ quædam stirpes. 139
<b>J</b> uniperus alpinus. 26	Liliasphodelus luteus 143
	Lilionarcissus 145
	Lilium Alexandrinum 187
	Lilium convallium 226
<b>L.</b>	fatuum 138. Persicum. 123
<b>L</b> Actuca sil. 343	silvestre 143
S. Ladislai regis herba 282.	Sufianum 129
	variegatum. 172
	<b>DD</b> 1 Lilium

# INDEX.

Lilium rubrum siue miniatum Chalcedonicum.	133	& eius species	388. & seq.
polyanthon	136	Martagon Constantinopol.	136. & 137.
a quibusdam zuziniare appellarum	ibid.	Martagonis bulbiferi varia genera.	139
Limodorum λεμόδωγος	Austriacum.	Martagonis Matthioli duæ differentia.	143
Linaria alpina pumila.	307	Mates fructus Indicus.	732
Linaria Pannonica.	307	Medica luteo flore.	738
Linaria tertia Tragi.	312	Melampyrum	603
Linum Divæ Virginis	310	Melandryum Plinij	332
Linum silvestre.	298	Meleagris.	172
& sequent. &	310	Melissophyllum Fuchij & Tragi.	594
Lingulaca Plinij	362	Menthastrum, & eius species	584. & seq.
Lirium alterum Theophrasti	172	Merasus.	91
Lithospermum repens	684	Meum vulgare.	701
& 686. legitimum	686	Millebona herba.	273
Lithoxyla.	10	Millefolium alpinum.	562
Lobi Americani maiores & minores.	725	Mirabillas del Peru	400
Lobi Indici.	731	& 401.	
Lonchitis altera Maranthæ	705. neotericorum.	Missalis candela siue cereus.	242
Lotus siliquosus varij generis.	763	Mollugo	685. & 686
Lunaria arthritica	352	Moly montanum	111. & seq.
Lunaria Græca siue odorata	337.	Narcissinis foliis.	120
Lunaria minor ramosa.	510	Mons ferreus.	10
Lychnis silu. & eius species	328. & seq.	Muscari.	202
Lychnides sil. aliæ promiscuæ.	332	Myrica Pannonica.	26
Lycium.	107	Myriophyllum aquaticum minus.	711
Lyfimachia & eius species	475. & seq.	Myrtocistus Balearica	66
		Myrtocistus Pennæi.	ibid.
		Myrtomalis	83

N.

M. Ahaleb. 93.  
Marrubium Pannon.

N Apellus vulgaris 409  
Narcissus pleno flore 175.  
Narcissus serotinus montan. 176.  
Narcissus

# INDEX.

Narcissus Persicus	ibid.	Oxalis amplif. folio.	<u>480</u>
Narcissus flore cæruleo	<u>194.</u>		
uncifolius	ibid.	P.	
Nardus siue Spica equina			
352.			
Nardus montana	<u>514</u>	P	
Celtica seu alpina	ibid.	Aconia Byzantina rubro	
Valerianæ filu. genus est,		flore	401
ibid.		Palma Trapezuntina	5
Nardus montana Mompel-		Panis porcinus	<u>234</u>
liana.	<u>660</u>	Paralytica alpina	<u>352</u>
Nasturtium	<u>459</u>	Parietaria siluestris quorun-	
Natrix Plinij.	<u>54</u>	dam	<u>602.</u> & eius species
Νηλεία apud Theophrastum		<u>603.</u> & seq.	
significat Vnedonem.	<u>99</u>	Parthenium alpinum.	561.
Nerion alpinum.	<u>75</u>	polyphylo flore.	ibid.
Nobilis herba	601	πλεχίνθη	<u>750</u>
		Pentaphyllum & eius species	
		<u>423.</u> & seq.	
		Periclymenum rectum	<u>85.</u>
O.		& seq. non esse Chamæ-	
		ceras. Plinij.	<u>89</u>
O Enanthes varia genera		Petasites.	<u>502</u>
711.		Petromelis.	<u>83</u>
Onobrichis Fracastorij.	<u>744</u>	πίτυκη ἀργεία	<u>16</u>
Onobrichis, & eius species		Peucedanum Pannon.	696
<u>751.</u> & seq.		Phaseolus, & eius varietas	
Οφισκώρρα	<u>211</u>	<u>721.</u> & seq.	
Orchidum magna varietas		Phlomis Diosc.	<u>343</u>
<u>235.</u> & seq.		Picea.	<u>19</u>
Oreoselinum.	<u>694</u>	Picea pumila.	21
Ornithogalum Arabicū	<u>185.</u>	Pilosellæ minoris varietas	
Pannonicum	<u>188.</u> & seq.	496.	
vulgare.	191	Pimpinella Italic. & Gallica.	
Ornithogalum maius Aspho-		<u>700.</u>	
delus bulbosus	<u>Galeni. 191</u>	Pinafter pumilio.	14
Ornithogalum maius Mom-		Pinguiculi Gesneri.	<u>360</u>
pellian.	ibid.	Pinus siluestris	16
Orobanche.	<u>242.</u>	Pisum siluestre perenne.	<u>733</u>
Orob. Pannonicus, & eius		πίπτος.	<u>19</u>
species	<u>735.</u> & seq.	Plantula Cardamines ximu-	
Orob. Venetus	ibid.	la.	<u>458</u>
Osyris Austriaca	310.	Platanus.	8
		DD	<u>4</u>
			Polium



## INDEX.

Polium Pannon. & eius species	618. & seq.	Ranunculus montanus, & eius var. æ species	361. & seq.
Polygala vulgaris.	314	Ranunculus Byzantinus siue Asiaticus	373
περίγυλοι Dioscor.	ibid.	Ranunculus Thaliætri folio	378.
Polygonatum, & eius species variæ	263. & seq.	Rapum genistæ	242
Primula veris, & eius varia genera*	332. & seq.	Rapunculus alpinus	687
Primula odorata	352	Rhamnus solutius	105
Prunus Myrobalanus	93	Rhodia radix	434
Prunella, & eius species	606 & seq.	Ribes	119
Pseudoapios Dodon.	744	Robur	9
Pseudoasphodelus pumilus foliis iridis.	261	Rosa 109. sine spinis ibid. cinamomea pleno flore ib. campestris odora	112
Pseudodamaconium	271	pumila	113
Pseudoelleborum nigr. Matthioli	569	Rosa petræa	57
Pseudohermodactylus	232	Rosula petræa	352
Pseudolcontopodium Matthioli	494	Rosmarinum fil. Matthioli	71.
Prarmica Austriaca	547	Rosmarinus fil. ῥοσμο	173
Pulmonaria, & eius variæ species	673. & seq.	Rosmarinus fil.	630
Pulsatilla vulgaris, & eius varia genera	385. & seq.	Rubia sativa	686
Pyraister idæus	83	Rubus saxatilis alpinus	115
Pyrus ceruina	ibid.	Rubus Idæus Diosc.	117
petræa.	ibid.	Rupium flosculus	352
Pyrola vulgaris & eius differentia	505. & seq.	Rupicaprarum radix	525
		Ruta capraria	744

Q.

**Q** <sup>Vercus</sup> <sup>9</sup>  
Quinquifoliū & eius  
species 423. & seq.

R.

<b>R</b> Adix aurea	143
Radix caua	242

Sacra herba 616  
 Salix angustifolia Panno-  
 nica 100  
 Salix pumila latifolia 101  
 Salomonis sigillum 169  
 Sanguisorba Germanorum  
 700.

Sanicula mōtana, & eius spe-  
cies 439. & seq.  
Sanicula

# INDEX.

*Sanicula guttata* 441  
*Sanicula tri folia* 459  
*Saryrion erythron* 232  
*Saxifraga alba* 441  
     *aurea* ibid.  
*Saxifraga Pannon. & eius*  
     *varietas* 697  
*Scabiosa Pannonic. & eius*  
     *species* 535. & seq.  
*Scarlea* 577  
*Scoparium herba* 561  
*Scorodoprasum* 209  
*Scorfonera Pannon. & eius*  
     *differentiæ* 614. & seq.  
*Securidaca altera Pannon.*  
     747 & seq.  
*Sedum maius vulgare* 481  
*Sedum alpinum, & eius spe-*  
     *cies* 484 & seq.  
*Selinum montanum pumi-*  
     *lum* 701  
*Serincade* 179  
*Serpentis herba* 569  
*Serpillum Pann. & eius spe-*  
     *cies* 625. & seq.  
*Serratula Matthioli* 547  
*Seseli montanum & eius va-*  
     *riæ species* 689. & seq.  
*Seseli Aethiopicum Matthioli*  
     693. & seq.  
*Siler montanum* 694  
*Siluestris Caryophylleorum*  
     *herba* 332  
*Sinapi pumilum alpinum*  
     459  
*Slauonia pars Pannon. inter-*  
     *amnis* 94. & 735  
*Solanum odoriferum* 401  
*Soldanella alpina, & eius va-*  
     *ria genera* 353. & seq. cur  
     sic nuncupata; & quas fa-

    cultates habere creditur  
     355.  
*Sonchus, & eius species* 650  
     & seq.  
*Sorbus aucuparia* 8. tormi-  
     nalis ibid. legitima 9.  
*Spartum Austriacum* 719  
*Spina infectoria pumila* 105  
*Stœbe Gallica* 547  
*Sultan Zambach* 135, 137, &  
     138.  
*Sultanæ lilium.* 137  
*Syderitis & varia eius genera*  
     599. & seq.  
*Symphitum tuberosum* 671.

## T.

**T** *Anacetum inodorum &*  
     *eius species* 549. & seq.  
*Tarabolos catamer & Taro-*  
     *bolos catamer lalé* 347. &  
     377.  
*Teucrium & eius species* 612  
     & seq.  
*Thalietri varia genera* 380  
*Thlaspi montanum, & eius*  
     *variæ species* 465. & seq.  
*Thora Italica* 413.  
     *Valdensium* 372  
*Tibcadi* 204  
*Tithymalus characias Pann.*  
     670.  
*Tormalis Sorbus* 8  
*Trachelij maxima varietas*  
     687. & seq.  
*Tragopogi differentia* 634  
     & seq.  
*Tribulus aquaticus minor, &*  
     *eius varietas* 713  
*Trifolium foetidum* 53  
     DD 5 luteum

# INDEX.

Iuteum.	51	Veronica & eius species variae	617, & seq.
Trifol. maius, & eius species	760, & seq.	Veterum laurus Alexandrina	270
Trifol. aureum nobile	766	Vetonica	316
vesicarium	377	Vicia siluestr. & eius species	744, & seq.
Tripolitanus flos plenus	372	Victorialis longa	223
Trollius flos	128, & 145	rotunda	226
Tulipa	146, & seq.	Viennensis herba	517
Tulipæ præcociæ varia genera	166, serotina 162	Vinum barbarum	121
bulbifera	166	Viola palustris	135, alba ibid.
Tulip. flores alij alijs magis	166	Viola matronalis	333
caduci	166	latifolia	337
Tul. seritur varijs modis ibid.	194	Viola montanæ	356, & seq.
Tul. Hispanica	127	Viscum quercinum	12
Turfani & Turfanda	463	saligneum	100.
Turrita	122,	Vitis Idæa	76, & seq.
Tusai flos Persicus	124	Vlmaria	700
& 129. polyanthos	124	Vmbellifetæ stirpes	689,
Tussilago alpina, & eius spe-	496, & seq.	& seq.	
cies variæ	127	Vua minor marina	119
Tuyschiachi	716		
Typha media			

## V.

Valeriana alpina & saxa-	
tilis	512, & eius spe-
cies	ibidem & seq.
Venatorum herba	371
Veratrum nigr. alterum Do-	
donzi	372

## X.

X Yphion minus	226
----------------	-----

## Z.

Z Ambach idem cum	136
mino	138
Zarem cada & Zerem cade	79.

## ALTER

# ALTER INDEX

## S T I R P I V M P E R E -

## G R I N I S, P A N N O N I C I S,

## E T V V L G A R I B V S L I N G V I S

expressarum nomenclaturam continens.



Abriß	371
Ad castanefi, vel ar	
ceftanefi	7
Abasber	8
Alaga Sufame	236
Alaia Sufani	ibid.
Alpofen	75
Alubias de Indias	731
Anckenballen	274
Apro tengöri zölö	119
Afchritzn	9
Auffenblat	271

B.

Brenbluft	76
Barkocza fa	8
Beka flu	371
Belend	304
Bella donna	304
Berkinye fa	9
Berg neglin	326
Berg rofen	76
Befem kraut	361
Betz flu	317
Binizate & Binizade vel	
Binizante	393
Bitter wurtz	286
Bitz wurtz	385

Blau Baldrian	209
Blau Buchartzu	342
Boni	376
Butterwurtz	362
Bpdeerin	342

C.

Café lalé	189
Cauallá lalé	ibid.
Cerifier nain	91
Cerraighel	10
Chér fa	10
Con zambach	138
Craft kraut	352

D.

Dave bohini	179
Dizno repa	232

E.

Edel diftel Gefneri	665
Elexen oder Elyen	93
Erable	8
Erdepfrümmen	51
Erdt rofen und Heydrosen	115

Erb

# INDEX.

Erd weichsel  
Ezereth gyvv fu

21

273

F.

Fay gyöngy

12

Fenyő

24

Fenyő fa buk aleucley eg  
felöl

21

Festo veräg

53

Feuchten

19

Feyer hunyor

277

Feyer malua

502

Fieberkraut

371

Fliegenber

82

Flubirlin

82

Flublumle

352

Framboisier

117

Frizoles Guateli & de Gua-  
timela

733

Fuss peer &

Fuss peerkraut

602

G.

GAlipoli lalc

391

Gariolds studen

82

Gelb hönungs blumen

185

Gelb kassblumen

569

Gelbe klee

51

Gemswurtz

525

G. Georg wurzel

452

Geseheket Indianische blü-  
men

401

Giul vel Gulcatamer,

391

Giul catamer lalc

179

Gliedkraut

686

Gold kraut

576

Gold wurtz

183

Günwurtz

449

Gross Kiepnblumen

312

Grosse bitter wurtz

282

Grosser Gepsalce

763

Gul & Gul catamer

138

Gyewngy Wyrag

226

Gyroflees sauages.

ibid.

H.

Hepnisch binkraut

70

Hepl aller weit kraut

65

Himmelschlüssel

343

Himmel stengel

288, 289, 290

Hinber

117

Hirtz wurtz

612

Hundsber

87

Hunds knoblauch

204

Humerlaub

76

I.

I Auor fa

1

Iagerber

82

Iasmino rosso

392

Iegerkraut

371

Iglieze

91

Ihar fa

1

Illyan zwet

143

Iröm

354

Iröm barbara

121

Isten nyla

327

K.

K Acha & Kacha veräg

343

Kachchi

# INDEX.

Kachchi jezicach 569  
 Kechkerago fa 97  
 Keiber schis 290  
 Kemeni cher fa 9  
 Keröztös fenyö 19  
 Kephens 327  
 Kephserin 342  
 Kephne Entian 282  
 Knothberries 119  
 Kötö fiz 102  
 Kreutz blument 343  
 Kreutz wurtz 282  
 Kygio hägma 197

## L.

L Ale Turcis florē signifi-  
 cat 169  
 Lale benzedē 391  
 Lanlauch 225  
 Lean kewkewrchin 385  
 Leplap 731  
 Lerpaum 24  
 Lmkraut 312  
 Lo kewkewrchin 385

## M.

M Arien schuch 273  
 Mates 732  
 Mirabilas del Peru 400  
 Mife gyerthya 242  
 Modelger 182  
 Mosßblumen 665  
 Mosß bepl 185  
 Muscari 202  
 Muschoromi & Muscurimi  
 204  
 Mutter wurtz 525

## N.

NYwl zék fu 338

## O.

O Eillers 326  
 Okör zörn 569  
 Oruale 384

## P.

P Arragi rosa 115  
 Pennacio Perfiano 132  
 Pperlin 703  
 S. Peters wurtzel 693  
 Plane 8

## R.

R Ruch 76 & 82  
 Rechter widerthon 512  
 Reköttye fa 102  
 Ross speich 352  
 Rotte schluffel blumen 352

## S.

S Aâr.fiz 102  
 Salomon pöcheri 269  
 Sanicor 442  
 Salwizot 232  
 Sarga viola 337  
 Schakaick 402  
 Schluffel blumen 343  
 Schoss wurtz 232  
 Schwartz hirtz wurtz 694  
 Schwin

# INDEX.

Schwindelkraut	352	Vad megy	91
Septeu flu	559	Unser fralwen har	310
Serin cade	179	Unser fralwen rauch	557. &
Siben hainkopf	225.	561.	
Sieg wurtz	225	Unser fralwen schuch	273
Silber farb	159	Unser frauē schwarz rauch	
Snetropfen	185	561	
Spreich	514	Vogelber	9
Stainaichel	9	Vörös berkinye	9
Stainneglin	326	Vörös fenyő kibol terebin-	
Stain rosin	57, & 352	tina lezön	24
Stein wepzel	93	Waryw borso	746
Stichend pfrinnen	53	Wepse baldrian	226
Strubenthorn	713	Wepse hirtz wurtz	694
Susamgiule	133	Wepse hoynung blumen	
Swieczka	282	185	

## T.

T Arabolos catamer	347	Wepse Jacinthe	188
& 377.		Wepse rauch	557, & 561
Tartarsky	261	Wepse Sanikel	441, & 449
Téli zöd	35	Wepse vepl	185
Teuffel abbeis	371	Wepse wurtz	269
Thannen	21	Wild gelbe vepl	337
Tibcadi	204	Wild kuttien	83
Tiztös flu	602	Wild neglin	326
Töly fa	12	Wild Salben	58
Trabison curmasi	4	Wilde stosmarin	630
Triquemadame	484	Wilber Senff	452
Turfani & Turfanda	127	Windische land	94, & 735
Tusai	122. & seq.	Winter gruett	508
Tuyschiachi	127	Whpt root	362
		Wolfmechende Schluffel	
		blumen	352
		Wulblinnen	494

## V.

V Ad zék flu	332	Y Sopillo	316
Vadlen	310		

Zaremca-

# INDEX.

Z.

**Z** Aremcada persiano 179  
 Zedöry 117  
 Zék fiu 126  
 Zelnice fa 93

Zent György veraga 126  
 Zent-Ianos fiue 584  
 Zent Lazlo kyraly fiue 282  
 Zeöd liliom 145  
 Zodbet neglin 326  
 Zunbul arabi 187

FINIS.



